

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ



Что такое ПРОГРЕССИЯ

- Термин «прогрессия» имеет латинское происхождение (*progression*), что означает «движение вперед» и был введен римским автором Боэцием (VI в.).
- Этим термином в математике прежде именовали всякую последовательность чисел, построенную по такому закону, который позволяет неограниченно продолжать эту последовательность в одном направлении. В настоящее время термин «прогрессия» в первоначально широком смысле не употребляется.
- Два важных частных вида прогрессий – арифметическая и геометрическая – сохранили свои названия.

БОЭЦИЙ

- Аний Манлий Торкват Северин Боэций, в исторических документах Аний Манлий Северин (ок.480 — 524 (526)), один из наиболее авторитетных государственных деятелей своего времени, знаток и ценитель греческой и римской античности, философ-неоплатоник, теоретик музыки, христианский теолог.
- Помимо богословских трудов в трактатах по дисциплинам квадригия — арифметике («*De institutione arithmeticā*») и музыке («*De institutione musica*») — передал европейской цивилизации метод и базовые знания лучших греческих авторов (преимущественно пифагорейцев) в области «математических» наук.



Боэций (слева) на фреске Рафаэля
«Афинская школа»

Что общего в последовательностях?

- 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26
- 11, 8, 5, 2, -1, -4, -7
- 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
- Найдите для каждой последовательности следующие два члена.

Арифметическая прогрессия


- Арифметической прогрессией называется последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом.

(a_n) - арифметическая прогрессия,
если $a_{n+1} = a_n + d$,
где d -некоторое число.

Разность арифметической прогрессии

- Число d , показывающее, на сколько следующий член последовательности отличается от предыдущего, называется разностью прогрессии.

$$d = a_{n+1} - a_n$$



Свойства прогрессии

- 2, 6, 10, 14, 18, $d=4, \quad a_{n+1} > a_n$
- 11, 8, 5, 2, -1, $d=-3, \quad a_{n+1} < a_n$
- 5, 5, 5, 5, 5, $d=0, \quad a_{n+1} = a_n$

- Если в арифметической прогрессии разность положительна ($d>0$), то прогрессия является возрастающей.
- Если в арифметической прогрессии разность отрицательна ($d<0$), то прогрессия является убывающей.
- В случае , если разность равна нулю ($d=0$) и все члены прогрессии равны одному и тому же числу, последовательность называется стационарной.

Задача

- На складе 1 числа было 50 тонн угля. Каждый день в течение месяца на склад приходит машина с 3 тоннами угля. Сколько угля будет на складе 30 числа, если в течение этого времени уголь со склада не расходовался.

- $a_1 = 50, d = 3$
- 1 числа: 50 т
2 числа: +1 машина (+3 т)
3 числа: +2 машины(+3·2 т)
.....
30 числа: +29 машин(+3·29 т)
- $a_{30} = a_1 + 29d$
 $a_{30} = 137$



Формула n-ого члена

- a_1

$$a_2 = a_1 + d$$

$$a_3 = a_2 + d = a_1 + 2d$$

$$a_4 = a_3 + d = a_1 + 3d$$

.....

$$a_n = a_{n-1} + d = a_1 + (n-1)d$$

$$a_n = a_1 + d(n-1)$$

Пример 1.

- Последовательность (c_n) -арифметическая прогрессия.
Найдите c_{81} , если $c_1=20$ и $d=3$.
- Решение:
Воспользуемся формулой n-ого члена
 $c_{81}=c_1+d(81-1),$
 $c_{81}=20+3\cdot80,$
 $c_{81}=260.$
- Ответ: 260.

Задача.

- В арифметической прогрессии четные члены оказались затёрты: 3, ..., 7, ..., 13...

Можно ли восстановить утраченные числа?

- Заметим, что $a_3 = a_1 + 2d$, $a_5 = a_3 + 2d$, $a_7 = a_5 + 2d$ и т.д.
Тогда $d = (a_{n+2} - a_n) : 2$, то есть $d = 2$.
- Искомая последовательность
3, 5, 7, 9, 13, 15, ...
- Можно ли найти пропущенные члены последовательности, не вычисляя разности?

Характеристическое свойство арифметической прогрессии

- Пусть a_n – искомый член последовательности.
Воспользуемся тем, что разность между соседними членами последовательности постоянна:
- $a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n$,
 $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$,
 $a_n = (a_{n-1} + a_{n+1}) : 2$
- Числовая последовательность является арифметической прогрессией тогда и только тогда, когда любой член этой последовательности, начиная со второго, есть среднее арифметическое соседних с ним членов.

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$$

Задача

- Последовательность (c_n) - арифметическая прогрессия. Найдите c_{21} , если $c_1=5,8$ и $d=-1,5$.
- Решение:
Воспользуемся формулой n-ого члена
 $c_{21}=c_1+d(21-1),$
 $c_{21}=5,8+(-1,5)\cdot20,$
 $c_{21}=-24,2.$
- Ответ: -24,2.



Задача.

- Числовая последовательность задана формулой
 $a_n = 3 + 5n, n=1,2,3,\dots$
- Является ли эта последовательность арифметической прогрессией? Если да, то какова ее разность?
- Решение:

Поскольку $a_{n+1} = 3 + 5(n+1) = 3 + 5n + 5 = a_n + 5$, при всех значениях n , то последовательность является арифметической прогрессией по определению. Из полученной формулы $a_{n+1} = a_n + 5$ разность этой прогрессии равна 5.



Интересный факт

- Любая арифметическая прогрессия может быть задана формулой $a_n = kn + b$, где k и b – некоторые числа.

$$a_n = a_1 + d(n-1) = dn + (a_1 - d)$$

- Последовательность (a_n) , заданная формулой вида $a_n = kn + b$, где k и b – некоторые числа, является арифметической прогрессией.

$$a_{n+1} - a_n = k(n+1) + b - (kn + b) = kn + k + b + kn - b = k$$

Задача.


- Седьмой член арифметической прогрессии равен 1 и равен разности между четвертым и вторым членами. Найти первый член прогрессии.
- Дано: $a_7 = 1$, $a_7 = a_4 - a_2$.
- Найти: a_1 .
- Решение: По условию $a_7 = a_4 - a_2$, то есть $a_7 = 2d$,
но $a_7 = 1$, поэтому $d = 0,5$.
 $a_7 = a_1 + 6d$,
 $a_1 = a_7 - 6d$,
 $a_1 = 1 - 6 \cdot 0,5$,
 $a_1 = -2$



Домашнее задание:

- Пункты 24, 25, 26 прочитать
- Выпишите все формулы на карточку
- Решите задания №6 в ОГЭ по арифметической прогрессии (минимум 10 вариантов)
- Вопросы задавать в контакте или в ЭД
- Ответы и решения отсканировать или сфотографировать и прислать в ЭД или контакт или по адресу svsv83@yandex.ru
- Срок выполнения 05.02.2016





Основные формулы:

- Рекуррентный способ задания

арифметической прогрессии

$$a_{n+1} = a_n + d$$

- Разность прогрессии

$$d = a_{n+1} - a_n$$

- Формула n -ого члена

$$a_n = a_1 + d(n-1)$$

- Характеристическое свойство

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$$

$$s_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

- Сумма первых n членов

$$s_n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} n$$

