


Первообразная. Неопределенный
интеграл и его свойства. Таблица
основных интегралов


ЛЕКЦИЯ

Калабухова
Галина Валентиновна
кандидат социологических наук, доцент




Вопросы темы

- Понятие первообразной.
- Неопределенный интеграл и его свойства.
- Таблица основных интегралов.





ПОНЯТИЕ ПЕРВООБРАЗНОЙ




Определение

Функция $F(x)$ называется *первообразной* функцией для функции $f(x)$ на промежутке X , если в каждой точке этого промежутка


$$F'(x) = f(x)$$

Геометрический смысл первообразной



Геометрический смысл производной:
 $F'(x)$ – угловой коэффициент касательной к кривой $y=F(x)$ в точке x .
Геометрически найти первообразную для $f(x)$, значит, найти такую кривую $F(x)$, что угловой коэффициент касательной к ней в произвольной точке x равен значению $f(x)$ заданной функции в этой точке

Если найдена одна кривая $y=F(x)$, удовлетворяющая условию $F'(x)=\operatorname{tg}\alpha$, то сдвигая ее вдоль оси ординат, мы получим кривые, отвечающие указанному условию







Теорема

Если $F_1(x)$ и $F_2(x)$ – первообразные для функции $f(x)$ на промежутке X , то найдется такое число C , что будет справедливо равенство

$$F_2(x) = F_1(x) + C$$



НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ И ЕГО СВОЙСТВА



Определение

Совокупность всех первообразных для функции $f(x)$ на промежутке X , называется *неопределенным интегралом* от функции $f(x)$

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

$f(x)$ – подынтегральная функция

$f(x)dx$ – подынтегральное выражение

$F(x)$ – некоторая первообразная для $f(x)$

C – произвольная константа

Свойства неопределенного интеграла



Производная от неопределенного интеграла равна подынтегральной функции:

$$\left(\int f(x) dx \right)' = f(x)$$

Свойства неопределенного интеграла



Дифференциал неопределенного интеграла равен подынтегральному выражению:

$$d\int f(x)dx = f(x)dx$$


Свойства неопределенного интеграла



Неопределенный интеграл от дифференциала некоторой функции равен этой функции с точностью до постоянного слагаемого:

$$\int dF(x) = F(x) + C$$


Свойства неопределенного интеграла



Постоянный множитель можно выносить за знак интеграла:

$$\int \alpha f(x) dx = \alpha \int f(x) dx$$

Свойства неопределенного интеграла




Интеграл от алгебраической суммы двух функций равен такой же сумме интегралов от этих функций:


$$\int (f(x) \pm g(x))dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$



ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ИНТЕГРАЛОВ



$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad n \neq -1$	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c = -\arccos \frac{x}{a} + c$	$\int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right + c$
$\int \frac{dx}{x} = \ln x + c$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \quad \int e^x dx = e^x + c$	$\int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right + c$
$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + c$	$\int \sin x dx = -\cos x + c$	$\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + c$
$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + c$	$\int \cos x dx = \sin x + c$	$\int \operatorname{ch} x = \operatorname{sh} x + c$
$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right + c$	$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + c$	$\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + c$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}} = \ln x + \sqrt{x^2 + a} + c$	$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + c$	$\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + c$



НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛОВ




Если $\int f(x) dx = F(x) + C$

$$\int f(x+b) dx = F(x+b) + C$$


$$\int f(ax) dx = \frac{1}{a} F(ax) + C$$

$$\int f(b+ax) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$$



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛОВ

Интегрирование методом замены переменной (метод подстановки)



Пусть $\int f(x)dx = F(x) + C$

тогда: $\int f(t(x))t'(x)dx = F(t(x)) + C$


где $t(x)$ - дифференцируемая монотонная функция




Методы замены переменной

1. Если в подынтегральной функции удаётся сразу заметить оба сомножителя, и $f(t(x))$, и $t'(x)$, то замена переменной осуществляется подведением множителя $t'(x)$ под знак дифференциала:
 $t'(x)dx = dt$, и задача сводится к вычислению интеграла $\int f(t)dt$

Методы замены переменной



2. Замену переменной можно осуществлять формальным сведением подынтегрального выражения к новой переменной



Интегрирование по частям

Пусть $u(x)$ и $v(x)$ - функции, имеющие непрерывные частные производные.

Тогда по формуле дифференцирования произведения

$$d(uv) = u \cdot dv + v \cdot du \rightarrow u \cdot dv = d(uv) - v \cdot du.$$


Находим неопределённые интегралы для обеих частей этого равенства (при этом $\int d(uv) = uv + C$)

$$\int u \cdot dv = uv - \int v \cdot du$$

Или:


$$\int u \cdot v' dx = uv - \int v \cdot u' dx$$

Сведение интеграла «к самому себе»



С помощью интегрирования по частям (возможно, неоднократного) интеграл выражается через такой же интеграл; в результате получается уравнение относительно этого интеграла, решая которое, находим значение интеграла

Рекуррентные соотношения



Если подынтегральная функция зависит от некоторого параметра n , и получено соотношение, которое выражает интеграл через аналогичный интеграл с меньшим значением n , то это соотношение и называется рекуррентным соотношением



«Неберущиеся» интегралы

Производная элементарной функции также является элементарной функцией. При нахождении первообразной существуют функции, первообразные для которых элементарными функциями не являются.

Соответствующие интегралы называются *неберущимися в элементарных функциях*, в сами функции – *неинтегрируемыми в конечном виде*

$$\int e^{-x^2} dx$$

$$\int \sin x^2 dx$$

$$\int \cos x^2 dx$$

$$\int \frac{\sin x}{x} dx$$

$$\int \frac{\cos x}{x} dx$$

$$\int \frac{dx}{\ln x}$$