





## Тема лекций 10. Корреляционный анализ. Часть 11.



**Бисериальный, тетракорический и поликорический показатели связи.** Рассмотренные выше способы вычисления коэффициента корреляции употребляются в отношении признаков, сильно варьирующих и состояние которых можно измерить, взвесить и выразить в определенных цифровых показателях. Однако бывают случаи, касающиеся качественных признаков, когда требуется лишь констатировать наличие или отсутствие данного признака.

Поэтому многообразие связей между различными признаками, которые характеризуют генотипические, биохимические и физиологические особенности индивидуумов, приводит к необходимости установления силы связи между альтернативными ( $r_a$ ), качественными ( $r_p$ ) и между качественными и количественными ( $r_b$ ) признаками.



---

Отличительной особенностью вышеперечисленных коэффициентов связей от коэффициентов корреляций между количественными признаками является то, что знак для них не имеет смыслового значения.

Выявление связи между простыми качественными признаками, имеющие четкое наследование, и полезными количественными признаками, имеющие полигенный тип наследования имеет для эколого-аналитической работы огромное значение.


*Бисериальный показатель связи.* Бисериальный показатель связи ( $r_b$ ) применяют при изучении связи между количественными и качественными признаками. Формула для вычисления  $r_b$ :



$$r_b = \frac{\frac{\sum f_+ \cdot a}{n_+} - \frac{\sum f \cdot a}{n}}{\sqrt{\frac{C}{n_+} - \frac{C}{n}}} \quad (50)$$

$$C = \sum f a^2 - \frac{(\sum f a)^2}{n} \quad (51)$$

где  $C$ - дисперсия количественного признака, вычисляемая по формуле 51. Подстрочный символ  $+$  указывает на присутствие качественного признака.



---


*Тетрахорический показатель связи.* Коэффициент  $r_a$  применяют для определения связи между альтернативными признаками. При альтернативности признак имеет только два противоположных состояния. Поэтому признак называется альтернативным, когда он может проявиться лишь в двух состояниях (возможно двойное состояние: наличие той или иной окраски).

Для определения  $r_a$  необходимо произвести разnosку членов совокупности по клеткам четырехпольной корреляционной решетки (табл. 10.1). В такой решетке из-за возможного двойного состояния образуется только два класса.

Таблица 10.1

Четырехпольная корреляционная решетка для альтернативных признаков

Класс – у	х	Класс х		Итого
	у	1	2	
	1	$f_1$	$f_2$	$f_1 + f_2$
	2	$f_3$	$f_4$	$f_3 + f_4$
	Итого	$f_1 + f_3$	$f_2 + f_4$	$n = f_1 + f_2 + f_3 + f_4$



Формула для вычисления тетрафорического показателя связи:

$$r_a = \frac{f_1 f_4 - f_2 f_3}{\sqrt{(f_1 + f_2) \cdot (f_3 + f_4) \cdot (f_1 + f_3) \cdot (f_2 + f_4)}} \quad (52)$$

или

$$r_a = \frac{[f_1 f_4 - f_2 f_3]^{-0,5n}}{(f_1 + f_2) \cdot (f_3 + f_4) \cdot (f_1 + f_3) \cdot (f_2 + f_4)} \quad (53)$$

где  $f_1, f_2, f_3, f_4$  - число членов совокупности по клеткам корреляционной решетки.

Формула 53 дает поправку на приближенность значений классов альтернативного признака. Квадратные скобки в числителе указывают на то, что берется абсолютная разница.

*Полихорический показатель связи.* Полихорический показатель связи ( $r_p$ ) применяют при определении величины связи между двумя качественными признаками, имеющими несколько градаций.

Формула для вычисления  $r_p$ :

$$r_p = \frac{a-1}{\sqrt{(l_x-1) \cdot (l_y-1)}} \quad (54)$$


где  $a$ - коэффициент, который необходимо вычислить по следующей формуле:

$$a = \sum \left[ \frac{\sum (f_{xy}^2 : f_y)}{f_x} \right] - \frac{(l_x-1) \cdot (l_y-1)}{n} \quad (55)$$

$$a = \sum \left[ \frac{\sum (f_{xy}^2 : f_x)}{f_y} \right] - \frac{(l_x-1) \cdot (l_y-1)}{n} \quad (56)$$

где  $f_{xy}, f_{yx}$ -частоты в клетках корреляционной решетки.






---

**Множественная корреляция.** Наряду с анализом двумерных совокупностей в биологии широкое применение находит *статистический анализ многомерных корреляционных связей*. Простейшим случаем множественной корреляции является зависимость между тремя признаками:  $X$ ,  $Y$  и  $Z$ . Тесноту связи одного из них ( $X$ ) с двумя другими признаками ( $Y$  и  $Z$ ) измеряют с помощью *коэффициента множественной корреляции* (формула 62)


Коэффициент множественной корреляции принимает значения от нуля до единицы. Значимость этого совокупного показателя корреляции оценивают по величине критерия Стьюдента с числом степеней свободы –  $k=n-3$  и принятым уровнем значимости.



---


**Частная корреляция.** Если известна связь между признаками  $X$ ,  $Y$  и  $Z$ , можно определить *частные* или *парциальные коэффициенты корреляции*, показывающие корреляционную зависимость между двумя варьирующими признаками при постоянной величине третьего признака (формулы 57-62).

Рассмотренные коэффициенты множественной и частной корреляции применяют лишь для измерения линейных связей. Анализ множественных нелинейных связей описан в специальной литературе.



№ формулы	Показатель	Формула
1	2	3
57	Девятаты	$\sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2 / n$
		$\sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2 / n$
		$\sum (z_i - \bar{z})^2 = \sum z_i^2 - (\sum z_i)^2 / n$
58	Величины сопряженной вариации	$\sum (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x}) = \sum yx - \sum x \sum y / n$
		$\sum (y_i - \bar{y})(z_i - \bar{z}) = \sum yz - \sum y \sum z / n$
		$\sum (x_i - \bar{x})(z_i - \bar{z}) = \sum xz - \sum x \sum z / n$

1	2	3
59	Коэффициенты для сопряженной вариации*	$s_x = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$
		$s_y = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n}}$
		$s_z = \sqrt{\frac{\sum (z_i - \bar{z})^2}{n}}$
60	Парные коэффициенты корреляции	$r_{xy} = \frac{\sum (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x})}{ns_x s_y}$
		$r_{yz} = \frac{\sum (y_i - \bar{y})(z_i - \bar{z})}{ns_y s_z}$
		$r_{xz} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(z_i - \bar{z})}{ns_x s_z}$
61	Частные коэффициенты корреляций	$r_{xy(z)} = \frac{r_{xy} - r_{xz}r_{yz}}{\sqrt{(1 - r_{xz}^2)(1 - r_{yz}^2)}}$
		$r_{xz(y)} = \frac{r_{xz} - r_{xy}r_{yz}}{\sqrt{(1 - r_{xy}^2)(1 - r_{yz}^2)}}$
		$r_{yz(x)} = \frac{r_{yz} - r_{xy}r_{xz}}{\sqrt{(1 - r_{xy}^2)(1 - r_{xz}^2)}}$
62	Множественный коэффициент корреляции	$r_{x(yz)} = \sqrt{\frac{r_{xy}^2 + r_{xz}^2 - 2r_{xy}r_{xz}r_{yz}}{1 - r_{yz}^2}}$



---

*Литература:*

Основная – 1 [24-66]; 2 [т.1-82-99]; 3 [163-183].

Дополнительная – 2 [34-80]; 3 [28-46]; 5 [142-184].

*Контрольные вопросы:*

1. Коэффициент генетической корреляции в малочисленных выборках: методика и формулы вычисления.
2. Когда применяют бисериальный показатель связи?
3. Когда применяют тетракорический показатель связи?
4. Когда применяют поликорический показатель связи?
5. Частная корреляция

























