РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИИ





- 1. Сформулируйте правило раскрытия скобок перед которыми стоит знак «+».
- 2. Сформулируйте правило раскрытия скобок перед которыми стоит знак «-».
- 3. Какие слагаемые называются подобными?
- 4. Как привести подобные слагаемые?
- 5. Алгоритм решения уравнений.

І вариант

II вариант

Проверьте себя:

1)
$$8x - 6x = 2x$$
;

2)
$$2y + y - 4y = -y$$
;

3)
$$-10a - 5a + a = -14a$$
;

4)
$$7b - b - 6b = 0$$
;

5)
$$c - 8c + 10c = 3c$$
;

6)
$$-n + 2n - 4n = -3n$$
.

$$1) -13x + 9x = -4x;$$

2)
$$5y + 3y - y = 7y$$
;

3)
$$6a - a - 5a = 0$$
;

$$4) -9b - 4b + b = -12b;$$

$$5) -c + 3c - 6c = -4c;$$

6)
$$n - 7n + 9n = 3n$$
.

РЕШИТЕ УРАВНЕНИЯ УСТНО

a)
$$x + 9 = 27$$
;

6)
$$15 + y = 30$$
;

B)
$$b - 7 = 14$$
;

$$\Gamma$$
) y:20 = 3;

$$д) 60 - c = 18;$$

e)
$$10k = 15$$
;

ж)
$$5x = 65$$
;

3)
$$2x+3=15-x$$
.




ЦЕЛИ:

- Изучить новые правила решения уравнений;
- Составить алгоритм решения уравнения, когда неизвестная величина записана слева и справа от знака равно;
- Научить применять алгоритм при решении уравнений;
- Ввести определение линейного уравнения;



Уравнение — это равенство, которое выполняется лишь при некоторых значениях входящих в него букв



- <u>Решим уравнение</u> $4 \cdot (x + 5) = 12$.
- Решение. По правилу отыскивания неизвестного множителя

$$x + 5 = 12:4$$
 $4 \cdot (x + 5):4 = 12:4$ $4 \cdot (x + 5) \cdot \frac{1}{4} = 12 \cdot \frac{1}{4}$ $x + 5 = 3$ $x + 5 = 3$ $x + 5 = 3$

Это же уравнение можно получить, разделив обе части данного уравнения на 4 или умножив обе части на 1/4.

Теперь легко найти значение х.

$$x = 3 - 5$$
$$x = -2.$$

Корни уравнения не изменяются, если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же число, не равное нулю.

- Решим уравнение 2x + 5 = 17.
- Решение. По правилу отыскивания неизвестного слагаемого

$$2x = 17 - 5$$

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

$$2x = 17 + (-5)$$

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

□ Уравнение 2x = 17 -5 можно записать так: 2x = 17 + (-5).

Видим, что корень уравнения 2x + 5 = 17 не изменяется, если перенести слагаемое 5 из левой части уравнения в правую, изменив его знак на противоположный.

- Решение. 5x 2x = 2x 2x + 6

Ho
$$2x - 2x = 0$$

$$5x - 2x = 6$$
$$3x = 6$$
$$x = 2$$

Корни уравнения не изменяются, если какое-нибудь слагаемое перенести из одной части уравнения в другую, изменив при этом его знак.

Во всех рассмотренных примерах мы приводили данные уравнения к виду ax = b, $c\partial e$ $a \neq 0$.

Уравнение, которое можно привести к такому виду с помощью переноса слагаемых и приведения подобных слагаемых, называют *линейным* уравнением с одной переменной.

УРАВНЕНИЕ МОЖЕТ: ИМЕТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ КОРЕНЬ; БЕСКОНЕЧНО МНОГО КОРНЕЙ; НЕ ИМЕТЬ КОРНЕЙ.

ПРИМЕРЫ:	1. 2x-5=17,	2. 2(x-1)=2x-2,	3. 2x+5=2x+3,
1	2x=17+5,	2x-2 = 2x-2,	2x-2x=3-5,
2	2x=22,	2x-2x=-2+2,	0x=-2
3	x=22:2,	0x=0,	x=-2:0,
4	x=11.	х – любое число	корней нет,т.к.
	11 – корень уравнения, единственный	бесконечно много корней	делить на 0 нельзя.
5	OTBET: x=11	ОТВЕТ:бесконечно много корней	ОТВЕТ: корней нет

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ



ЗАКРЕПЛЕНИЕ

- □ **№ 1316** ($\mathbf{a} \mathbf{r}$) на доске и в тетрадях, проговаривая правило.
- □ № 1319 (а, б) с комментарием на месте



ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО

Уравнение -7y + 9 = -8y - 3 читают так:

сумма минус семи игрек и девяти равна сумме минус восьми игрек и минус трех. Корень этого уравнения – число минус двенадцать.

ИТОГ УРОКА

- Обе части уравнения умножили на число, не равное 0. Изменились ли корни уравнения?
- Сформулируйте правило переноса слагаемых из одной части уравнения в другую.

ДОМАШЕЕ ЗАДАНЕЕ

- □ Выучить правила
- □ **N**o





РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ

Умею применять.....

Понимаю.....

Знаю.....



