

# Функции нескольких переменных

- Определение функции  $n$  (двух) переменных.
- Геометрическая интерпретация определения.
- Линия уровня функции двух переменных. Множество уровня функции  $n$  переменных.
- Предел и непрерывность функции двух переменных.
- Частные производные функции двух переменных.
- Геометрический смысл частных производных.
- Дифференцируемость и полный дифференциал функции двух переменных.
- Производная сложной функции
- Производная функции по направлению
- Градиент функции
- Экстремум функции двух переменных

# Основные понятия

## Определение

Упорядоченный набор  $n$  действительных чисел  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  называется  $n$ -мерным вектором.

## Определение

Множество  $n$ -мерных векторов, в котором введены операции:

сложения векторов  $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$

умножения вектора на число  $\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$

называется  $n$ -мерным векторным пространством и

обозначается  $R^n$

# Основные понятия

## Определение функции n переменных

Рассмотрим  $X$ . Говорят, что на множестве  $X$

задана функция  $n$  переменных, обозначаемая  $f$ , если

задано правило, сопоставляющее каждому вектору  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in X$  одно вполне определенное число  $u = f(x)$ , называемое значением функции

в 
$$u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

точке  $x$ . При этом записывают

Множество  $X$  – область определения функции  $n$  переменных.

$x_1, x_2, \dots, x_n$  называются независимыми переменными;

$u$  – зависимая переменная

# Примеры функций нескольких переменных

1. функция двух переменных

$$u = x_1^2 + \operatorname{tg}(x_1 + x_2)$$

2. функция трех переменных

$$u = x^2 + 3yz - 4$$

3. функция  $n$  переменных

$$u = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \dots + nx_n$$

# Функция двух переменных

## Замечание

Теория излагается для функций двух переменных, при этом почти все понятия и теоремы переносятся на случай  $n > 2$

## Функция двух переменных

$$z = f(x, y)$$

$X$  – область определения функции

## Геометрическая интерпретация

Каждой точке  $M_0(x_0, y_0) \in X$  в системе координат  $OXYZ$  соответствует точка  $M(x_0, y_0, z_0)$ , где  $z_0 = f(x_0, y_0)$  – аппликата  $M$ .

Совокупность всех таких точек  $M$  представляет собой поверхность, которая геометрически изображает данную функцию

# Пример функции двух переменных


$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

Область определения:

$$1 - x^2 - y^2 \geq 0$$

$$x^2 + y^2 \leq 1$$

круг центр (0;0) и R=1



Данная функция геометрически изображается верхней полусферой радиуса 1.

# Линия уровня. Множество уровня.

## Определение

Линией уровня функции двух переменных  $f(x, y)$  называется множество точек на плоскости таких, что во всех этих точках значение функции одно и то же

$$f(x, y) = c, \text{ где } c = \text{const}$$

Число  $c$  называется уровнем.

В предыдущем примере линия уровня – окружность.

## Определение

Для функции  $n$  переменных  $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  множество точек, удовлетворяющих условию

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c, \text{ где } c = \text{const}$$

называется множеством уровня.

# Предел функции

Пусть функция  $z=f(x,y)$  определена в некоторой окрестности точки  $M_0(x_0, y_0)$ , кроме быть может самой точки

## Определение

$$\begin{aligned} & \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A \Leftrightarrow \\ \text{def} \quad & \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0) (\forall x \neq x_0 \wedge y \neq y_0 : \\ & \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta) \Rightarrow |f(x, y) - A| < \varepsilon \end{aligned}$$

Если предел существует, то он не зависит от пути (слева/справа)  $\rightarrow M_0$  которому



# Пример

$$z = \frac{\ln(1 - x^2 - y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{\lambda \rightarrow 0 \\ x \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{x_\lambda + \lambda_\lambda}}{\ln(1 - x_\lambda - \lambda_\lambda)} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \left| \begin{array}{l} x \rightarrow 0 \vee \lambda \rightarrow 0 \Rightarrow b \rightarrow 0 \\ 1 - x_\lambda - \lambda_\lambda = 1 - b_\lambda \\ \sqrt{x_\lambda + \lambda_\lambda} = b \end{array} \right| = \\ &= \lim_{b \rightarrow 0} \frac{b}{\ln(1 - b_\lambda)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \lim_{b \rightarrow 0} \frac{1 - b_\lambda}{-b} = 0 \end{aligned}$$

# Непрерывность функции

## Определение

Функция  $z=f(x,y)$  называется непрерывной в точке  $M_0(x_0,y_0)$ , если:

1. эта функция определена в точке  $M_0$  и ее окрестности ;

2. существует  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$

3.  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$

Предел (непрерывность) функции двух переменных

обладает аналогичными свойствами предела (непрерывности) функции одной переменной.

# Частные производные

$$z=f(x,y)$$

Частное приращение функции  $z$  по  $x$

$$\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y)$$

Частное приращение функции  $z$  по  $y$

$$\Delta_y z = f(x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

## Определение

Частной производной функции нескольких переменных по одной из этих переменных называется предел отношения соответствующего частного приращения функции к приращению соответствующего аргумента, когда приращение аргумента стремится к нулю.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_x(x, y) = z'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'_y(x, y) = z'_y = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y}$$

# Пример

При вычислении частной производной функции нескольких переменных по одной из этих переменных используют правило дифференцирования функции одной переменной, считая все остальные переменные постоянными.

$$z = x^2 + 7x^2y^3 + y + 4$$

$$z'_x = 2x + 14xy^3$$

$$z'_y = 21x^2y^2 + 1$$


$$z = e^{x^3 + y^2}$$

$$z'_x = e^{x^3 + y^2} \cdot 3x^2$$

$$z'_y = e^{x^3 + y^2} \cdot 2y$$

# Геометрический смысл частных производных

Графиком функции  $z=f(x,y)$  является поверхность  $P$



$P_x$  ( $P_y$ ) – линия пересечения поверхности  $P$  с плоскостью  $y=y_0$  ( $x=x_0$ )

$$f'_x(x_0, y_0) = \operatorname{tg} \alpha$$

$\alpha$  – угол наклона касательной к линии  $P_x$  относительно оси  $Ox$

$$f'_y(x_0, y_0) = \operatorname{tg} \beta$$

$\beta$  – угол наклона касательной к линии  $P_y$  относительно оси  $Oy$

Частная производная функции по некоторой переменной показывает скорость изменения функции в направлении соответствующей оси

# Частные производные второго порядка

$$z=f(x,y)$$

$$z''_{xx} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

$$z''_{xy} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

$$z''_{yy} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

$$z''_{yx} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

Частная производная второго и более  
высокого  
порядка, взятая по различным переменным  
называется смешанной частной производной

# Понятие дифференцируемой функции

Пусть функция  $z=f(x,y)$  определена в некоторой окрестности точки  $M(x,y)$ .

Полное приращение функции  $z=f(x,y)$  в точке  $M(x,y)$

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

## Определение

Функция  $z=f(x,y)$  называется дифференцируемой в точке  $M(x,y)$ , если ее полное приращение в этой точке

можно представить в виде

$$\Delta z = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \Delta y + \alpha \cdot \Delta x + \beta \cdot \Delta y$$

$$\alpha = \alpha(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0 \quad \beta = \beta(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0$$

$$\Delta x \rightarrow 0 \wedge \Delta y \rightarrow 0 \quad \Delta x \rightarrow 0 \wedge \Delta y \rightarrow 0$$

# Понятие дифференциала функции

## Определение

Дифференциалом функции  $z=f(x,y)$  называется главная, линейная относительно  $\Delta x$  и  $\Delta y$ , часть полного приращения функции, равная сумме произведений частных производных этой функции на приращения соответствующих независимых переменных

**Обозначение:** 
$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y$$

Рассмотрим функции  $f(x,y)=x$ ,  $g(x,y)=y$ . Вычислим их дифференциалы:

$$df = dx = \Delta x$$
$$dg = dy = \Delta y$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$



# Необходимое условие дифференцируемости функции

## Теорема

(необходимое условие дифференцируемости функции)

Если функция  $z=f(x,y)$  дифференцируема в некоторой

точке  $M(x,y)$ , то она непрерывна в этой точке и имеет в ней частные производные  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}$

Обратное не верно

Из непрерывности функции в точке или существования частных производных не следует дифференцируемость функции в точке

# Достаточное условие дифференцируемости функции

## Теорема

(достаточное условие дифференцируемости функции)

Если функция  $z=f(x,y)$  имеет непрерывные частные

производные  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}$  в точке  $M(x,y)$ , то она

дифференцируема в этой точке

# Сложная функция

Если  $z=f(x,y)$  – функция двух переменных  $x$  и  $y$ , каждая из которых является функцией независимой переменной  $t$ , то есть  $x=x(t)$ ,  $y=y(t)$ , то функция  $z=f(x(t),y(t))$  является сложной функцией одной переменной.

Пример:

$$z = x^2 \cdot y^3$$

$$x = \cos t \quad \Rightarrow \quad z(t) = \cos^2 t \cdot \sin^3 t$$

$$y = \sin t$$

# Производная сложной функции

## Теорема

(о производной сложной функции)

Если  $z=f(x,y)$  дифференцируемая в точке  $M(x,y)$  функция и  $x=x(t)$ ;  $y=y(t)$  дифференцируемые функции независимой переменной  $t$ , то производная сложной функции  $z(t)=f(x(t),y(t))$  вычисляется по формуле

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

# Найти производную сложной функции

$$z = x^2 \cdot y^3$$
$$x = \cos t \quad y = \sin t \quad z(t) = \cos^2 t \cdot \sin^3 t$$

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= z'(t) = 2xy^3 (\cos t)'_t + 3y^2 x^2 (\sin t)'_t = \\ &= 2xy^3 (-\sin t) + 3y^2 x^2 \cos t = \\ &= -2 \sin^4 t \cos t + 3 \cos^3 t \sin^2 t \end{aligned}$$


**Проверка:**

$$\begin{aligned} (\cos^2 t \cdot \sin^3 t)'_t &= 2 \cos t (-\sin t) \sin^3 t + \cos^2 t 3 \sin^2 t \cos t = \\ &= -2 \cos t \sin^4 t + 3 \cos^3 t \sin^2 t \end{aligned}$$

# Производная функции по направлению

Пусть функция  $z=f(x,y)$  определена в некоторой окрестности точки  $M(x,y)$ .

$l$  – направление, задаваемое единичным вектором  $e^{\Delta}(\cos \alpha, \cos \beta)$ , где  $\cos \alpha, \cos \beta$  - направляющие косинусы - косинусы углов, образуемых вектором  $e^{\Delta}$  с осями координат



Переместим точку  $M(x,y)$  в точку

$M_1(x + \Delta x, y + \Delta y)$  в направлении  $l$

В результате перемещения  $z=f(x,y)$  получит приращение

$$\Delta_l z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

$\Delta_l z$  - приращение функции  $z$  в направлении  $l$

Обозначим  $|MM_1| = h$ , тогда

$$\Delta x = h \cdot \cos \alpha \quad \Delta y = h \cdot \cos \beta$$

$$\Delta_l z = f(x + h \cos \alpha, y + h \cos \beta) - f(x, y)$$

$$z'_l = \frac{\partial f}{\partial l}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta_l z}{h}$$

# Производная функции по направлению

## Теорема

(о вычислении производной функции по направлению)

Если функция  $f(x, y)$  дифференцируема в точке  $(x^0, y^0)$ , то в этой

точке функция  $f(x, y)$  имеет производную по любому направлению, задаваемому направляющими косинусами  $\cos \alpha, \cos \beta$ , при этом  $z'_l = z'_x \cdot \cos \alpha + z'_y \cdot \cos \beta$

## Доказательство

$f(x^0 + h \cos \alpha, y^0 + h \cos \beta)$  - функция переменных  $x$  и  $y$ , каждая из которых является функцией одной переменной  $h$ :

$$x(h) = x^0 + h \cos \alpha \quad y(h) = y^0 + h \cos \beta$$

Если  $h=0$ , то  $x(0) = x^0, y(0) = y^0$

По правилу вычисления производной сложной функции:

$$\frac{df}{dh}(0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x^0, y^0) \cdot (x^0 + h \cos \alpha)'_h + \frac{\partial f}{\partial y}(x^0, y^0) \cdot (y^0 + h \cos \beta)'_h = \frac{\partial f}{\partial x}(x^0, y^0) \cdot \cos \alpha +$$

$$+ \frac{\partial f}{\partial y}(x^0, y^0) \cdot \cos \beta = z'_x \cos \alpha + z'_y \cos \beta \quad \longrightarrow \quad \boxed{z'_l = z'_x \cdot \cos \alpha + z'_y \cdot \cos \beta}$$

$$\frac{df}{dh}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x^0 + h \cos \alpha, y^0 + h \cos \beta) - f(x^0, y^0)}{h} = \frac{\partial f}{\partial l}(x^0, y^0) = z'_l$$

# Градиент функции

## Определение

Вектор с координатами  $(\frac{\partial f}{\partial x}(M_0), \frac{\partial f}{\partial y}(M_0))$  называется

градиентом функции  $f(x, y)$  в точке  $M_0$ .

**Обозначение:**  $\text{grad } f(M_0)$  или  $\nabla f(M_0)$

$\overset{\vee}{e}(\cos \alpha, \cos \beta)$  - единичный вектор

$$(\text{grad } f(M_0), \overset{\boxtimes}{e}) = \frac{\partial f}{\partial x}(M_0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(M_0) \cos \beta = \frac{\partial f}{\partial l}(M_0)$$

Производная по направлению есть скалярное произведение градиента функции и единичного вектора, задающего направление  $l$ .




# Градиент функции

Градиент функции в данной точке  $\text{grad}f(M_0)$  характеризует направление наибыстрейшего роста функции в этой точке

## Теорема

Пусть задана дифференцируемая функция  $z=f(x,y)$  и пусть  $\text{grad} f(M_0) \neq 0$ . Тогда градиент перпендикулярен линии уровня, проходящей через данную точку

Линии уровня можно построить следующим образом



1. строим  $\nabla z(x_0, y_0)$
2. задаем направление, перпендикулярное градиенту
3. строим  $\nabla z(x_1, y_1)$ , причем точка  $(x_1, y_1)$  достаточно близка к точке  $(x_0, y_0)$

# Точки максимума и минимума функции

## Определение

Точка  $M(x_0, y_0)$  называется точкой максимума (минимума) функции  $z=f(x,y)$ , если существует  $\delta$ -окрестность точки  $(x_0, y_0)$ , такая что для любой точки  $(x,y)$  из этой окрестности (за исключением точки  $(x_0, y_0)$ ) выполняется неравенство  $f(x, y) < f(x_0, y_0)$  ( $f(x, y) > f(x_0, y_0)$ )

Точки экстремума функции лежат внутри области определения функции

Максимум и минимум функции имеют локальный характер

# Необходимое условие экстремума функции

## Теорема

(необходимое условие экстремума функции)

Если в точке  $M(x_0, y_0)$  дифференцируемая функция  $z=f(x, y)$  имеет экстремум, то ее частные производные в этой точке равны нулю, то есть  $f'_x(x_0, y_0) = 0$  и  $f'_y(x_0, y_0) = 0$

## Доказательство:

Зафиксируем одну переменную, например  $y_0$ .

Получим  $f(x, y_0) = \varphi(x)$  - функцию одной переменной, которая имеет экстремум при  $x = x_0$

Согласно необходимому условию экстремума функции одной переменной  $\varphi'(x_0) = 0 \Rightarrow f'_x(x_0, y_0) = 0$

Аналогично  $f'_y(x_0, y_0) = 0$

# Стационарные и критические точки

## Определение

Точка  $(x_0, y_0)$ , в которой частные производные первого порядка функции  $z=f(x, y)$  равны нулю, то есть  $f'_x(x_0, y_0) = 0$   
 $f'_y(x_0, y_0) = 0$  называется **стационарной точкой** функции  $z=f(x, y)$

## Определение

Стационарные точки и точки, в которых хотя бы одна частная производная не существует, называются **критическими точками**

Равенство нулю частных производных является необходимым, но не достаточным условием существования экстремума.

# Достаточное условие экстремума функции

## Теорема (достаточное условие экстремума функции)

Пусть функция  $z=f(x,y)$  определена в некоторой окрестности стационарной точки  $(x_0, y_0)$ .

Пусть функция имеет в этой точке непрерывные частные производные второго порядка  $A = f''_{xx}(x_0, y_0)$ ,  $B = f''_{xy}(x_0, y_0)$ ,  $C = f''_{yy}(x_0, y_0)$ . Обозначим  $\Delta = AC - B^2$

Тогда:

- 1) если  $\Delta > 0$  , то функция  $f(x,y)$  в точке  $(x_0, y_0)$  имеет экстремум: максимум, если  $A < 0$ ; минимум, если  $A > 0$ ;
- 2) если  $\Delta < 0$  , то функция  $f(x,y)$  в точке  $(x_0, y_0)$  экстремума не имеет;
- 3) если  $\Delta = 0$  , то вопрос о наличии экстремума остается открытым

# Найти экстремум функции

$$z = 3x^2y - x^3 - y^4$$

$$z'_x = 6xy - 3x^2 \quad z'_y = 3x^2 - 4y^3$$

Найдем стационарные точки, решая систему уравнений:

$$\begin{cases} 6xy - 3x^2 = 0 \\ 3x^2 - 4y^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow M_1(6,3); M_2(0,0)$$

$$z''_{xx} = 6y - 6x \quad z''_{xy} = 6x \quad z''_{yy} = -12y^2$$

В точке  $M_1(6,3)$  имеем  $A=-18$ ,  $B=36$ ,  $C=-108 \Rightarrow \Delta = 648 > 0$

так как  $A < 0 \Rightarrow M_1$  - точка максимума;  $z_{\max} = z(6,3) = 27$

В точке  $M_2(0,0)$  имеем  $A=0$ ,  $B=0$ ,  $C=0 \Rightarrow \Delta = 0$

Дополнительные исследования:  $z(0,0)=0$

При  $x=0$ ,  $y \neq 0$   $z = -y^4 < 0$

При  $x \neq 0$ ,  $y=0$   $z = -x^3 \Rightarrow$  в точке  $M_2$  экстремума нет

## Найти экстремум функции

$$z = \frac{1}{2}xy + (47 - x - y)\left(\frac{x}{3} + \frac{y}{4}\right)$$

$$z'_x = -\frac{1}{12}y - \frac{2}{3}x + \frac{47}{3} \quad z'_y = -\frac{1}{2}y - \frac{1}{12}x + \frac{47}{4}$$

Найдем стационарные точки, решая систему уравнений:

$$\begin{cases} -\frac{1}{12}y - \frac{2}{3}x + \frac{47}{3} = 0 \\ -\frac{1}{2}y - \frac{1}{12}x + \frac{47}{4} = 0 \end{cases} \Rightarrow M(21,20) \quad M_2$$

$$A = z''_{xx} = -\frac{2}{3}, \quad B = z''_{xy} = -\frac{1}{12}, \quad C = z''_{yy} = -\frac{1}{2} \quad \Delta > 0$$

Так как  $A < 0 \Rightarrow M(21,20)$  - точка максимума  $z_{\max} = 282$