

*«Исследовательская работа  
по построению графиков функции,  
аналитическое выражение которых  
содержит знак абсолютной величины»*

Выполнила: Мухаматдинова Динара, ученик 10 класса  
Кучуковской средней общеобразовательной школы  
Агрызского муниципального района РТ  
Научный руководитель: Бурганиева А. Р., учитель  
математики высшей категории

■ **Цель и задачи работы:** изучить соответствующие теоретические материалы, выявить алгоритм построения графиков функции, аналитическое выражение которых содержит знак абсолютной величины.

■ **Объект исследования:** функции, содержащие знак абсолютной величины.  
**Предмет исследования:** закономерность графиков функции  $y = f|(\mathbf{x})|$ ,  $y = |f(\mathbf{x})|$ ,  $y = |f|(\mathbf{x})|$ .

■ **Методы исследования:** решение примеров на построения графиков, сравнение, анализ, обобщение.

# Содержание

1. Историческая справка
2. Геометрическая интерпретация понятия  $|a|$
3. График функции  $y = f|(x)|$
4. График функции  $y = |f(x)|$
5. График функции  $y = |f|(x)||$
6. Выводы.
7. Список литературы.

# Историческая справка

В первой половине XVII века начинает складываться представление о функции как о зависимости одной переменной величины от другой. Так, французские математики Пьер Ферма (1601-1665) и Рене Декарт (1596-1650) представляли себе функцию как зависимость ординаты точки кривой от её абсциссы. А английский ученый Исаак Ньютон (1643-1727) понимал функцию как изменяющуюся в зависимости от времени координату движущейся точки.

Термин "функция" (от латинского function – исполнение, совершение) впервые ввел немецкий математик Готфрид Лейбниц (1646-1716). У него функция связывалась с геометрическим образом (графиком функции).

В дальнейшем швейцарский математик Иоганн Бернулли (1667-1748) и член Петербургской Академии наук знаменитый математик XVIII века Леонард Эйлер (1707-1783) рассматривали функцию как аналитическое выражение. У Эйлера имеется и общее понимание функции как зависимости одной переменной величины от другой.

Слово «модуль» произошло от латинского слова «modulus», что в переводе означает «мера». Это многозначное слово(омоним), которое имеет множество значений и применяется не только в математике, но и в

архитектуре, физике, технике, программировании и других точных науках.

В архитектуре - это исходная единица измерения, устанавливаемая для данного архитектурного сооружения и служащая для выражения кратных соотношений его составных элементов.

В технике - это термин, применяемый в различных областях техники, не имеющий универсального значения и служащий для обозначения различных коэффициентов и величин, например модуль зацепления, модуль упругости и .т.п.

Модуль объемного сжатия( в физике)-отношение нормального напряжения в материале к относительному удлинению.

# Геометрическая интерпретация понятия модуля $|a|$

Каждому действительному числу можно поставить в соответствие точку числовой прямой, это точка будет геометрическим изображением данного действительного числа. Каждой точке числовой прямой соответствует её расстояние от начала отсчета, или длина отрезка, начало которого в точке начала отсчета, а конец – в данной точке. Длина отрезка всегда рассматривается как величина неотрицательная. Геометрической интерпретацией действительного числа служит вектор, выходящий из начала отсчета и имеющий конец в точке, изображающей данное число. Длина этого вектора будет геометрической интерпретацией модуля данного действительного числа.

**Определение.** Модуль числа  $a$  или абсолютная величина числа  $a$  равна  $a$ , если  $a$  больше или равно нулю и равна  $-a$ , если  $a$  меньше нуля:



$$|a| = \begin{cases} a, & \text{если } a \geq 0; \\ -a, & \text{если } a < 0. \end{cases}$$

$$|a| \geq 0.$$

# Исследование графиков функции:

1. График функции  $y = f|(x)|$
2. График функции  $y = |f(x)|$
3. График функции  $y = ||f|(x)||$

■ 1. Анализ изученной литературы,  
построение графиков функции

2. Выдвижение гипотезы

3. Проверка гипотезы


4. Доказательство

5. Выводы

## График функции $y = |x|$

а) Если  $x \geq 0$ , то  $|x| = x$  и наша функция  $y = x$ , т.е. график совпадает с биссектрисой первого координатного угла.

б) Если  $x < 0$ , то  $|x| = -x$  и  $y = -x$ . При отрицательных значениях аргумента  $x$  график данной функции – прямая  $y = -x$ , т.е. биссектриса второго координатного угла.



## Выдвижение гипотезы:

Из сопоставления двух графиков:

$y = x$  и  $y = -x$ , я выдвинул гипотезу, что график функции  $y = f(|x|)$  получается из графика  $y = f(x)$  при  $x \geq 0$  симметричным отображением относительно оси  $OY$ .

## *Проверка гипотезы*


Можно ли применять этот метод построения графиков для любой функции, содержащей абсолютную величину?

Для этого я рассмотрел несколько функций, и сделала для себя выводы.

# 1. Построить график функции $y=0,5x^2 - 2|x| - 2,5$

1) Поскольку  $|x| = x$  при  $x \geq 0$ , требуемый график совпадает с параболой  $y=0,5x^2 - 2x - 2,5$ . Если  $x < 0$ , то поскольку  $x^2 = |x|^2$ ,  $|x| = -x$  и требуемый график совпадает с параболой  $y=0,5x^2 + 2x - 2,5$ .


2) Если рассмотрим график  $y=0,5x^2 - 2x - 2,5$  при  $x \geq 0$  и отобразить его относительно оси  $OY$  мы получим тот же самый график.



## 2. Построить график функции $y=0,25x^2 - |x| - 3$ .

1) Поскольку  $|x| = x$  при  $x \geq 0$ , требуемый график совпадает с параболой  $y=0,25x^2 - x - 3$ . Если  $x < 0$ , то поскольку  $x^2 = |x|^2$ ,  $|x| = -x$  и требуемый график совпадает с параболой  $y=0,25x^2 + x - 3$ .

2) Если рассмотрим график  $y=0,25x^2 - x - 3$  при  $x \geq 0$  и отобразить его относительно оси  $OY$  мы получим тот же самый график.




## Доказательство гипотезы:

*Докажем, что график функции  $y = f(|x|)$  совпадает с графиком функции  $y = f(x)$  на множестве неотрицательных значений аргумента и симметричен ему относительно оси  $OY$  на множестве отрицательных значений аргумента.*

*Доказательство:* Если  $x \geq 0$ , то  $f(|x|) = f(x)$ , т.е. на множестве неотрицательных значений аргумента графики функции  $y = f(x)$  и  $y = f(|x|)$  совпадают. Так как  $y = f(|x|)$  - чётная функция, то её график симметричен относительно  $OY$ .

*Таким образом, график функции  $y = f(|x|)$  можно получить из графика функции  $y = f(x)$  следующим образом:*


- 1. построить график функции  $y = f(x)$  для  $x > 0$ ;*
- 2. Для  $x < 0$ , симметрично отразить построенную часть относительно оси  $OY$ .*



**Вывод:** Для построения графика функции  $y = f(|x|)$

1. построить график функции  $y = f(x)$  для  $x > 0$ ;
2. Для  $x < 0$ , симметрично отразить построенную часть относительно оси  $OY$ .

# График функции $y = f|(x)|$



*График функции*

$$y = |f(x)|$$

## *Построить график функции $y = |x^2 - 2x|$*


*Освободимся от знака модуля по определению*

*Если  $x^2 - 2x \geq 0$ , т.е. если  $x \leq 0$  и  $x \geq 2$ , то  $|x^2 - 2x| = x^2 - 2x$*

*Если  $x^2 - 2x < 0$ , т.е. если  $0 < x < 2$ , то  $|x^2 - 2x| = -x^2 + 2x$*

*Я вижу, что на множестве  $x \leq 0$  и  $x \geq 2$  графики функции  $y = x^2 - 2x$  и  $y = |x^2 - 2x|$  совпадают, а на множестве  $(0; 2)$  графики функции  $y = -x^2 + 2x$  и  $y = |x^2 - 2x|$  совпадают.*

*Построю их.*



## *Выдвижение гипотезы:*

*График функции  $y = |f(x)|$  состоит из части графика функции  $y = f(x)$  при  $y \geq 0$  и симметрично отражённой части  $y = f(x)$  при  $y < 0$  относительно оси  $Ox$ .*

# Проверка гипотезы

## 1. Построить график функции $y = |x^2 - x - 6|$

1) Если  $x^2 - x - 6 \geq 0$ , т.е. если  $x \leq -2$  и  $x \geq 3$ , то  $|x^2 - x - 6| = x^2 - x - 6$ .


Если  $x^2 - x - 6 < 0$ , т.е. если  $-2 < x < 3$ , то  $|x^2 - x - 6| = -x^2 + x + 6$ .

Построим их.

2) Построим  $y = x^2 - x - 6$ . Нижнюю часть графика симметрично отображаем относительно ОХ.

Сравнивая 1) и 2), видим что графики одинаковые.

$$y = |x^2 - x - 6|$$



Докажем, что график функции  $y = |f(x)|$  совпадает с графиком функции  $y = f(x)$  для  $f(x) > 0$  и симметрично отражённой частью  $y = f(x)$  при  $y < 0$  относительно оси  $Ox$ .


Действительно, по определению абсолютной величины, можно данную функцию рассмотреть как совокупность двух линий:

$$y = f(x), \text{ если } f(x) \geq 0; \quad y = -f(x), \text{ если } f(x) < 0$$

Для любой функции  $y = f(x)$ , если  $f(x) > 0$ , то  $|f(x)| = f(x)$ , значит в этой части график функции  $y = |f(x)|$  совпадает с графиком самой функции  $y = f(x)$ .

Если же  $f(x) < 0$ , то  $|f(x)| = -f(x)$ , т.е. точка  $(x; -f(x))$  симметрична точке  $(x; f(x))$  относительно оси  $Ox$ . Поэтому для получения требуемого графика отражаем симметрично относительно оси  $Ox$  «отрицательную» часть графика  $y = f(x)$ .

- Вывод:** Гипотеза верна, действительно для построения графика функции  $y = |f(x)|$  достаточно:
1. Построить график функции  $y = f(x)$  ;
  2. На участках, где график расположен в нижней полуплоскости, т.е., где  $f(x) < 0$ , симметрично отражаем относительно оси абсцисс.



# Проверка истинности гипотез для графика функции

$$y = |f(x)|$$

Применяя, определение абсолютной величины и ранее рассмотренные примеры построила графики функции:

$$y = |2|x| - 3|$$

$$y = |x^2 - 5|x||$$

$$y = ||x^3| - 2| \text{ и сделала выводы.}$$


*Для того чтобы построить график функции*

$$y = |f(x)| \text{ надо:}$$

- 1. Строим график функции  $y = f(x)$  для  $x > 0$ .*
- 2. Строим вторую часть графика, т. е. построенный график симметрично отражаем относительно ОУ, т.к. данная функция четная.*
- 3. Участки получившегося графика, расположенные в нижней полуплоскости, преобразовываем на верхнюю полуплоскость симметрично оси ОХ.*

Построить график функции  $y = |2|x| - 3|$

1. Строю  $y = 2|x| - 3$ , для  $2|x| - 3 > 0$ ,  $|x| > 1,5$  т.е.  $x < -1,5$  и  $x > 1,5$ 
  - а)  $y = 2x - 3$ , для  $x > 0$
  - б) для  $x < 0$ , симметрично отражаем построенную часть относительно оси ОУ.
2. Строю  $y = -2|x| + 3$ , для  $2|x| - 3 < 0$ . т.е.  $-1,5 < x < 1,5$ 
  - а)  $y = -2x + 3$ , для  $x > 0$
  - б) для  $x < 0$ , симметрично отражаем построенную часть относительно оси ОУ.




1.  $y = |2|x| - 3|$

1) Строю  $y = 2x - 3$ , для  $x > 0$ .

2) Строю прямую, симметричную построенной относительно оси ОУ.

3) Участки графика, расположенные в нижней полуплоскости, отображаю симметрично относительно оси ОХ.

Сравнивая оба графика, видим что они одинаковые.



$$y = |x^2 - 5|x||$$

1. Строю  $y = x^2 - 5|x|$ , для  $x^2 - 5|x| > 0$  т.е.  $x > 5$  и  $x < -5$


а)  $y = x^2 - 5x$ , для  $x > 0$

б) для  $x < 0$ , симметрично отражаем построенную часть относительно оси  $OY$ .

2. Строю  $y = -x^2 + 5|x|$ , для  $x^2 - 5|x| < 0$ . т.е.  $-5 \leq x \leq 5$

а)  $y = -x^2 + 5x$ , для  $x > 0$

б) для  $x < 0$ , симметрично отражаем построенную часть относительно оси  $OY$ .




$$2. y = |x^2 - 5|x||$$

а) Строю график функции  $y = x^2 - 5x$  для  $x > 0$ .

б) Строю часть графика, симметричную построенной относительно оси  $OY$

в) Часть графика, расположенные в нижней полуплоскости, преобразовываю на верхнюю полуплоскость симметрично оси  $OX$ .

**Сравнивая оба графика, видим что они одинаковые.**



### 3. $y = | |x|^3 - 2 |$

1). Строю  $y = |x|^3 - 2$ , для  $|x|^3 - 2 > 0$ ,  $x > \sqrt[3]{2}$  и  $x < -\sqrt[3]{2}$


а)  $y = x^3 - 2$ , для  $x > 0$

б) для  $x < 0$ , симметрично отражаю построенную часть относительно оси ОУ.

2). Строю  $y = -|x|^3 + 2$ , для  $|x|^3 - 2 < 0$ . т.е.  $-\sqrt[3]{2} < x < \sqrt[3]{2}$

а)  $y = -x^3 + 2$ , для  $x > 0$

б) для  $x < 0$ , симметрично отражаю построенную часть относительно оси ОУ.




$$3. y = ||x|^3 - 2|$$

а) Строю  $y = x^3 - 2$  для  $x > 0$ .

б) Строю часть графика, симметричную построенной относительно оси ОУ

в) Часть графика, расположенные в нижней полуплоскости, преобразовываю на верхнюю полуплоскость симметрично оси ОХ.

Сравнивая оба графика, видим что они одинаковые.



# Заключение

При выполнении исследовательской работы я сделал такие выводы:

- сформировал алгоритмы построения графиков функций, аналитическое выражение которых содержит знак абсолютной величины;

- приобрел опыт построения графиков таких функций, как:

$$y = f |(\mathbf{x})|; \quad y = |f(\mathbf{x})|; \quad y = |f |(\mathbf{x})||;$$

- научился работать с дополнительной литературой и материалами, производить отбор научных сведений; выдвигал гипотезы и доказала истинность гипотез, сделал выводы;

- приобрел опыт выполнения графических работ на компьютере.

# Выводы

- **Для построения графика функции  $y = f|(x)|$ :**
  1. Построить график функции  $y = f(x)$  для  $x > 0$ ;
  2. Построить для  $x < 0$  часть графика, симметричную построенной относительно оси ОУ.
- **Для построения графика функции  $y = |f(x)|$** 
  1. Построить график функции  $y = f(x)$  ;
  2. На участках, где график расположен в нижней полуплоскости, т.е., где  $f(x) < 0$ , строить кривые, симметричные построенным графикам относительно оси абсцисс.
- **Для построения графика функции  $y = |f|(x)|$** 
  1. Построить график функции  $y = f(x)$  для  $x > 0$ .
  2. Строим вторую часть графика, т. е. построенный график симметрично отражаем относительно ОУ
  3. Участки получившегося графика, расположенные в нижней полуплоскости, преобразовываем на верхнюю полуплоскость симметрично оси ОХ.

$$y = f(|x|)$$

$$y = f(x), \\ x > 0$$

Построить часть для  $x < 0$ ,  
симметричную  
относительно  
оси  $OY$

Выводы

$$y = |f(x)|$$

$$y = f(x)$$

Часть графика, расположенного  
в нижней полуплоскости  
симметрично отобразить  
относительно оси  $OX$

$$y = |f \\ |x||$$

$$y = f(x), x > 0$$

Построить для  $x < 0$  часть  
графика, симметричную  
построенной относительно  
оси  $OY$

# Список литературы:

- И. М.Гельфанд, Е.Г. Глаголева. **Функции и графики.** Издательство «Наука»
- Р.А. Калнин. **Алгебра и элементарные функции.** Издательство «Наука»
- М.К. Потапов, С.Н. Олехник. **Конкурсные задачи по математике,** Москва. «Наука»
- Ю. Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк. **Дополнительные главы к школьному учебнику.** Москва, «Просвещение».

