



# **Лекція 5**


**Тема: Електричні явища у  
м'язових волокнах**




**Рис. 1. Розподіл йонів у цитоплазмі м'язового волокна і у позаклітинному розчині.**



**Рис. 2. Робота натрієвих каналів**




Стан спокою



Стан активації

**Рис. 3. Робота калієвих каналів**




**Рис. 4. Канали клітинної мембрани**



# Потенціали спокою

- ✓ Потенціал спокою мембрани м'язового волокна становить  $-70$  мВ.
- ✓ У гладких м'язах він менший:  $-50$  мВ,
- ✓ У серцевому м'язі більший:  $-90$  мВ.
- ✓ ПС у тонічних м'язах є нижчим, ніж у фазних і становить  $-60$  мВ.

Знак “мінус” визначається знаком заряду всередині клітини.



**Рис. 5. Стан натрієвих і калієвих каналів мембрани у різні фази розвитку ПД:**

**а** – потенціал спокою; **б** – деполяризація; **в** – початок реполяризації; **г** – завершення реполяризації; **д** – повернення до потенціалу спокою




# Внесок йонів кальцію у створення ПД у фазних м'язових волокнах

- ✓ 1) є ефективним механізмом підвищення внутріклітинної концентрації вільного кальцію, що приймає участь у багатьох клітинних процесах;
- ✓ 2) йони кальцію регулюють проникність інших йонів, зокрема, калію. Так, кальцій, що входить у клітину під час ПД, активує повільні калієві канали. При цьому розвивається повільна гіперполяризація. Остання приймає участь у регуляції ритму імпульсації на порівняно низькій частоті.

# Шуми йонних каналів

- ✓ Хаотичне відкриття й закриття каналів, що зумовлює переміщення йонів, створює електричний шум.
- ✓ Зміна мембранного ПС для потенціалзалежних каналів є фактором, що різко збільшує ймовірність їх відкритого стану. Цим створюється ефект зростання йонної провідності.



**Рис. 6. Поширення ПД по м'язовому волокну**

**Дякую за увагу!**