

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ



проф. Целебровский Юрий Викторович,

И-415,

консультации – понедельник, 16⁰⁰-18⁰⁰



Электрическое и магнитное ПОЛЯ

Поля физические – особая форма материи; система с бесконечно большим числом *степеней свободы*.


Степени свободы – независимые возможные изменения ~~Концепция физической системы~~ в том, что участвующие во взаимодействии частицы (тела) создают в каждой точке окружающего их пространства особое состояние (поле сил), проявляющееся в силовом воздействии на другие частицы (тела), помещаемые в какую-либо точку этого пространства.

В макромире существенное значение имеют гравитационное и электромагнитное взаимодействия. Этим взаимодействиям соответствуют:

- *гравитационное поле;*
- *электромагнитное поле.*

Гравитационное поле;

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$



$G = 6,67259(85) \cdot 10^{-11} \text{ м}^3 \text{ кг}^{-1} \text{ с}^{-2}$
гравитационная постоянная

Электромагнитное поле.

Электромагнитное поле есть вид материи, определяющийся во всех точках двумя *векторными величинами*, которые характеризуют две его стороны «электрическое поле» и «магнитное поле».

Электромагнитное поле оказывает силовое воздействие на *заряженные частицы*, зависящее от скорости и значения их заряда.

Электромагнитное поле.

Электрическое поле

Электрическое поле создается зарядом.

Электрический **заряд** есть свойство частицы или тела, характеризующее их взаимосвязь с собственным электрическим полем и их взаимодействие с внешним электрическим полем.

Единица измерения электрического заряда – кулон (Кл)

Элементарный электрический заряд $|e| = 1,60217733(49) \times 10^{-19}$ Кл.

Элементарным электрическим зарядом обладают элементарные частицы:


Протон – положительный заряд $e_{\text{протона}} = + 1,60217733(49) \times 10^{-19}$ Кл.

Электрон – отрицательный заряд $e_{\text{электрона}} = - 1,60217733(49) \times 10^{-19}$ Кл.

Электромагнитное поле.

Электрическое поле

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$



$$\epsilon_0 = 8,854187817 \cdot 10^{-12} \text{ Ф} \cdot \text{м}^{-1}$$

электрическая постоянная

Сравнение сил гравитационного и электрического полей

Гравитационное поле

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Электрическое поле

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Взаимодействуют два ядра фермия (Fm), содержащие по 100 протонов

$$m = 1,673 \cdot 10^{-27} \times 100 \text{ кг}$$

$$r = 1 \text{ м}$$

$$G = 6,673 \cdot 10^{-11} \text{ м}^3 \text{ кг}^{-1} \text{ с}^{-2}$$

Сила притяжения

$$F_{\text{грав}} = 10^{-65} \text{ Н}$$

$$q = 1,602 \cdot 10^{-19} \times 100 \text{ Кл}$$

$$r = 1 \text{ м}$$

$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$$

Сила отталкивания

$$F_{\text{электр}} = 2,307 \cdot 10^{-20} \text{ Н}$$

Электрическое поле


Электрическим полем называется силовое поле, в котором действующие силы определяются законом

q


Кулона

Силовая линия – элемент изображения силового поля.

Силовой линией называется линия, касательные к которой в каждой точке совпадают с направлением силы в этой точке



Электрическое поле



$$Q = \sum q$$

Поток электрического смещения

Поток электрического смещения через замкнутую поверхность равен электрическому заряду, находящемуся в объёме, ограниченном этой поверхностью. (Закон Гаусса)

Каждая точка поля характеризуется векторной величиной - D , называемой «**плотность потока электрического смещения**»

$$D = \frac{\partial Q}{\partial S} \left[\frac{\text{Кл}}{\text{м}^2} \right]$$

Если электрический заряд находится в центре сферы с радиусом r , то

$$D = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

Электрическое поле

Напряжённость электрического поля

q

r

Напряжённостью электрического поля называется сила, действующая в электрическом поле на тело с точечным зарядом в 1 Кулон

$$F_{1 \text{ Кл}} = E = \frac{1 \cdot q}{4\pi r^2 \epsilon_0} \left[\frac{\text{Н}}{\text{Кл}} \right]$$

$q_{\text{пр}} = 1 \text{ Кл}$

$$D = \epsilon_0 E$$

Электрическое поле

Потенциалы электрического поля


Потенциал электрического поля – энергия, затраченная на перемещение единичного заряда из «бесконечности» в рассматриваемую точку поля

Единица измерения электрического потенциала:

$$\frac{\text{Дж}}{\text{Кл}} = \text{В (вольт)}$$


$$\varphi = \int_r^{\infty} E \cdot dl = \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l^2} dl = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\varphi_a > \varphi_b$$



Электрическое поле


Электрическое напряжение



Потенциалы электрического поля

Разность потенциалов:

$$\varphi_a - \varphi_b = U_{ab}$$



Напряжённость электрического поля


Разность потенциалов:

$$\varphi_b - \varphi_a = U_{ba}$$

Градиент потенциала:

$$\frac{U_{ab}}{l_{ab}} \Rightarrow \frac{\Delta U}{\Delta l} \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial l} \Rightarrow E \left[\frac{B}{M} \right]$$

Напряженность электрического поля



Работа и энергия

Механическая

$$A = F \times l$$

джоуль = ньютон×метр

Электрическая

$$U = E \times l$$


вольт = джоуль/кулон

E – сила, действующая на
единичный заряд

**Напряжённость – основная характеристика
электрического поля**

$$[\text{В/м}] = [\text{Н/Кл}]$$

Электрическое поле



$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Напряжённость

в
электрическог
о поля

$$E = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{q}{4\pi \cdot r^2}$$

D – плотность потока электрического смещения $D = \epsilon_0 E$; в веществе -

$D = \epsilon \epsilon_0 E$
Потенциал электрического поля

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Электрическое

напряжение

$$U_{AB} = E \cdot l_{AB} = \varphi_B - \varphi_A$$

Лекция окончена.

Прошу задавать вопросы.

Можно в письменном виде.