


# ВИЧ

- избирательно действует только на клетки содержащие на своей поверхности CD4-рецепторы: Т-хелперы, моноциты, дендритные антигенпрезентирующие клетки, клетки островков Лангерганса, микроглиальные клетки головного мозга





Антитела появляются в первые 3 месяца после заражения у 90-95% зараженных, через 6 месяцев – у 5-9%, в более поздние сроки – 0,5 -1%

# Уголовная ответственность (ст. 122 УК РФ):



- Заведомое подставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекции наказывается ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы до 1 года.
- Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией, лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, наказывается лишением свободы на срок 5 лет.


# Пути передачи




# Нахождение вируса в биологических жидкостях человека



<b>Высокая степень риска (большая концентрация вируса)</b>	<b>Низкая степень риска (минимальная концентрация вируса)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>кровь, плазма, сыворотка</b></li><li>■ <b>семенная жидкость</b></li><li>■ <b>вагинальный секрет</b></li><li>■ <b>любая биологическая жидкость, в которой видна кровь</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>слюна</b></li><li>■ <b>слезы</b></li><li>■ <b>моча</b></li><li>■ <b>потовая жидкость</b></li><li>■ <b>фекалии</b></li></ul>




Ч.  
И



# Как предупредить заражение ВИЧ половым путем?



- Отсрочить вступление в сексуальные отношения.
- Если человек принимает решение вступить в сексуальные отношения, то следует практиковать безопасный секс.
- Следует использовать презерватив при проникающих сексуальных контактах, помня правила качественной покупки, хранения и использования презерватива:




- покупать презервативы в аптеках и хороших супермаркетах, где соблюдаются правила хранения презервативов;
- покупать презервативы известных европейских, американских и российских фирм;
- обращать внимание на срок годности, указанный на упаковке, чтобы он не был просроченным;
- необходимо пользоваться смазками только на водной основе, так как смазки на жировой основе (вазелин, крем, губная помада и т.п.) разрушают латекс и нарушают надежность презерватива;
- от ВИЧ и других инфекций предохраняют только презервативы из **латекса или полиуретана**, что должно быть указано на упаковке






# Как предотвратить заражение через кровь, через инъекции?




- неповрежденная кожа - надежный барьер для вируса.
- Следует использовать одноразовые и/или стерильные инструменты для медицинских и косметических услуг
- Отказаться от любого употребления наркотических средств.



# **В каких случаях следует сдать анализ на ВИЧ?**

- **после полового контакта с новым партнером без презерватива**
- **после сексуального насилия**
- **если твой половой партнер вступал в половые контакты с кем-то еще**
- **если твой настоящий или прошлый половой партнер ВИЧ-инфицирован**
- **после использования одних и тех же игл или шприцев для введения наркотиков или других веществ, а также для татуировок и пирсинга**
- **после какого-либо контакта с кровью ВИЧ-инфицированного человека**
- **если твой партнер пользовался чужими иглами или подвергался какой-либо другой опасности инфицирования**
- **после обнаружения другой инфекции, передающейся половым путем**



**Спасибо за внимание!**

