




# *Инертные газы*

**Выполнил:** ученик 10 Б класса  
МБОУ СОШ №5  
г. Пыть –Ях  
Кисаков Денис

Свечение в разряде	$t_{пл}, ^\circ\text{C}$	$t_{кип}, ^\circ\text{C}$	Содержание в $1\text{ м}^3$ воздуха
<b>ГЕЛИЙ</b>	-272	<b>He</b> -269	<b>Ar</b> - 9,3 л
<b>КРИПТОН</b>	-249	<b>Ne</b> -246	<b>Ne</b> - 18 мл
<b>АРГОН</b>	-189	<b>Ar</b> -186	<b>He</b> - 4,6 мл
<b>НЕОН</b>	-157	<b>Kr</b> -153	<b>Kr</b> - 1,1 мл
<b>КСЕНОН</b>	-112	<b>Xe</b> -108	<b>Xe</b> - 0,086 мл
	-72	<b>Rn</b> -62	<b>Rn</b> - $6 \cdot 10^{-18}$ мл



СИНТЕЗИРОВАННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



ОЧИСТКА ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ



Инертные газы – химические элементы восьмой группы периодической системы: гелий He, неон Ne, аргон Ar, криптон Kr, ксенон Xe, радон Rn.

# История названия




Долгое время считалось, что благородные газы не образуют химических соединений. Тогда они были названы инертными, от слова инертность, что означает «бездеятельность, отсутствие активности». Позже учёными было доказано обратное, но название осталось прежним.

## Гéлий / Helium (He)

Атомный номер	2
Внешний вид простого вещества	Инертный газ без цвета, вкуса и запаха
<b>Свойства атома</b>	
Атомная масса	4,002602
Радиус атома	31
Электронная конфигурация	$1s^2$
<b>Химические свойства</b>	
Электроотрицательность	4,5
Электронный потенциал	0
Степень окисления	0


## Гелий

**Гéлий** возглавляет группу инертных газов в периодической таблице. Он является одним из наиболее распространённых элементов во Вселенной, занимает второе место. Также гелий является вторым по лёгкости химическим элементом.



*Схема атома гелия*





## Спектральные линии гелия



Символ элемента, выполненный из газоразрядных трубок, наполненных гелием. При пропускании тока через заполненную гелием трубку наблюдаются разряды различных цветов, зависящих главным образом от давления газа в трубке. Обычно видимый свет спектра гелия имеет жёлтую окраску. По мере уменьшения давления происходит смена цветов — розового, оранжевого, жёлтого, ярко-жёлтого, жёлто-зелёного и зелёного.

Гелий добывается из природного газа процессом низкотемпературного разделения – так называемой фракционной перегонкой

Поскольку гелий обладает низкой плотностью и негорюч, им заполняют метеорологические шары-зонды, аэростаты, дирижабли. Жидкий гелий используется для создания низких температур, близких к абсолютному нулю.

Гелий впервые был идентифицирован как химический элемент в 1868 П.Жансеном при изучении солнечного затмения в Индии. Новый элемент назвали гелием от греч. «гелиос», что означает солнце. В то время не знали, что гелий – инертный газ, и предполагали, что это металл.

## Неон / Neon (Ne)

Атомный номер	10
Внешний вид простого вещества	инертный газ без цвета, вкуса и запаха

### Свойства атома

Атомная масса	20,1797
Радиус атома	(38)[1] пм
Электронная конфигурация	[Ne] 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup>

### Химические свойства

Электроотрицательность	0,0
Электронный потенциал	0
Степень окисления	n/a

# Неон

**Неон** — Пятый по распространённости элемент во Вселенной.



**Схема атома  
неона**



Эмиссионный спектр неона (слева направо: от ультрафиолетовых до инфракрасных линий, показанных белым цветом)



Трубки, заполненные смесью неона и азота, при пропускании через них электрического разряда дают красно-оранжевое свечение, в связи с чем они широко используются в рекламе.

Газоразрядные лампы, заполняемые неоном, раньше применялись в рекламе, но в последнее время на смену им пришли люминесцентные лампы.





Неон получают совместно с гелием в качестве побочного продукта в процессе сжижения и разделения воздуха.

Жидкий неон используют в качестве охладителя в криогенных установках. Газоразрядные лампы, заполняемые неоном, раньше применялись в рекламе, но в последнее время на смену им пришли люминесцентные лампы.

Во время исследования в спектре обнаружили новые линии. В момент, когда Рамзай наблюдал спектр только что полученного газа, в лабораторию вошел его двенадцатилетний сын, успевший статью «болельщиком» отцовых работ. Увидев необычное свечение, он воскликнул: «new one!» Так возникло название газа «неон», по-древнегречески значит «новый».

## Аргон / Argon (Ar)

Атомный номер	18
Внешний вид простого вещества	Инертный газ без цвета, вкуса и запаха
<b>Свойства атома</b>	
Атомная масса	39,948
Радиус атома	71
Электронная конфигурация	$3s^2 3p^6$
<b>Химические свойства</b>	
Электроотрицательность	0,0
Электронный потенциал	0
Степень окисления	0

# Аргон

**Аргон** — Третий по распространённости элемент в земной атмосфере — 0,93 % по объёму.



**Схема атома аргона**

В промышленности аргон получают как побочный продукт при крупномасштабном разделении воздуха на кислород и азот. При температуре  $-185,9^{\circ}\text{C}$  аргон конденсируется, при  $-189,4^{\circ}\text{C}$  — кристаллизуется

Аргон служит для создания инертной атмосферы в металлургических процессах, в химическом производстве, при электросварке.


По предложению доктора Медана (председателя заседания, на котором был сделан доклад об открытии) Рэлей и Рамзай дали новому газу имя «аргон» (от греч. ἀργός — ленивый, медленный, неактивный). Это название подчеркивало важнейшее свойство элемента — его химическую неактивность.

## Крипто́н / Krypton (Kr)

Атомный номер	36
Внешний вид простого вещества	инертный газ без цвета, вкуса и запаха
<b>Свойства атома</b>	
Атомная масса	83,8
Радиус атома	88
Электронная конфигурация	$3d^{10} 4s^2 4p^6$
<b>Химические свойства</b>	
Электроотрицательность	3,0
Электронный потенциал	0
Степень окисления	2

## Криптон

**Крипто́н** находится в атмосферном воздухе. Образуется при ядерном делении, в том числе и в результате естественных процессов, происходящих в рудах радиоактивных металлов.



**Схема атома  
криптона**

Выделяют  
ректификацией  
из жидкого  
воздуха.

Фториды криптона предложены в качестве окислителей ракетного топлива и в качестве компоненты для накачки боевых лазеров. Используется в качестве заполнения пространства между стеклами в стеклопакете для придания стеклопакету повышенных теплофизических и звукоизоляционных свойств.

**В 1898 году английский учёный Рамзай выделил из жидкого воздуха (предварительно удалив кислород, азот и аргон) смесь, в которой спектральным методом был открыт криптон (От греч. крипто́с — скрытый, секретный).**



## Ксенон / Xenon (Xe)

Атомный номер	54
Внешний вид простого вещества	Инертный газ без вкуса, цвета и запаха
Свойства атома	
Атомная масса	131,29
Радиус атома	108
Электронная конфигурация	$4d^{10} 5s^2 5p^6$
Химические свойства	
Электроотрицательность	2,6
Электронный потенциал	0
Степень окисления	0, +1, +2, +4, +6, +8

## Ксенон

**Ксенон находится в земной атмосфере в крайне незначительных количествах,  $0.087 \pm 0.001$  миллионной доли.**





**Ксеноновая лампа-  
вспышка**



**Ксеноновая  
лампа**

**Прототип ионного  
двигателя на ксеноне.**

## **Физиологическое действие**

**Газ ксенон безвреден, но способен вызвать наркоз (по физическому механизму), а в больших концентрациях (более 80 %) вызывает асфиксию.**

**Фториды ксенона ядовиты, ПДК в воздухе 0,05 мг/м<sup>3</sup>.**

Ксенон получают как побочный продукт производства жидкого кислорода на металлургических предприятиях.

Ксенон используется для заполнения ламп накаливания и в производстве источников света высокой мощности. Ксенон является высокоэффективным рабочим телом для электрореактивных двигателей космических аппаратов. С конца XX века ксенон стал применяться как средство для общего наркоза

В 1898 году учёные У. Рамзай и У. Рэлей открыли новый газ (тем же способом, которым был обнаружен криптон) и назвали его ксенон, что в переводе с греческого значит «чужой»: в спектре он очень отличался по цвету от ксеноновой фракции воздуха.

## Радон / Radon (Rn)

Атомный номер	86
Внешний вид простого вещества	Бесцветный, слегка флюоресцирующий газ
<b>Свойства атома</b>	
Атомная масса	222,0176
Радиус атома	214
Электронная конфигурация	$4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^6$
<b>Химические свойства</b>	
Электроотрицательность	n/a
Электронный потенциал	—
Степень окисления	0

## Радон

**Простое вещество радон в нормальных условиях радиоактивен, может представлять опасность для здоровья и жизни. При комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов. Равновесное содержание в земной коре 7·10–16% по массе.**

**Концентрация радона в воздухе зависит в первую очередь от геологической обстановки**

Радон используют в медицине для приготовления радоновых ванн, в сельском хозяйстве для активации кормов домашних животных, также он используется в геологии, гидрологии и т.д.

Радон получают способом продувки воздуха через раствор любой соли радия, а затем из этого воздуха удаляют химически активные вещества. Остаток конденсируют

Э. Резерфорд в 1899 году отметил, что препараты тория испускают некое неизвестное ранее вещество. Это вещество он предложил назвать эманацией (от латинского emanatio — истечение) тория и дать ему символ Em. Первоначально эманацию тория называли торбóном, а эманацию радия — радбóном. Впервые её выделили в чистом виде Рамзай и Грей в 1908 году. В 1923 году газ получил окончательное название радон и символ Em был сменен на Rn.



# Список использованной литературы

- Петров М.М., Михилев Л.А., Кукушкин Ю.Н. “Неорганическая химия”
- Гузей Л.С. Лекции по общей химии”
- Ахметов Н.С. “Общая и неорганическая химия”
- Некрасов Б.В. “Учебник общей химии”
- Глинка Н.Л. “Общая химия
- Ходаков Ю.В. “Общая и неорганическая химия”