

Потенция



Статистика эректильной дисфункции


Возраст	% мужчин, страдающих ЭД*
после 21 года	более 10%
40–50 лет	40%
50–60 лет	48–57%
60 лет и более	70%

**В России на сегодняшний день
Более 66 миллионов мужчин страдают ЭД
Они являются потенциальными потребителями
препаратов для восстановления эректильной функции.**

*Данные Всемирной организации здравоохранения.

Как часто пациенты с эректильной дисфункцией получают врачебную помощь?

■ Никогда не обращаются ■ Обращаются




В РФ лечение мужчин, страдающих ЭД, является прерогативой врача-андролога (62% обращений).

Однако мужчины могут также обращаться к:

урологам (19%), сексопатологам (11%), реже к эндокринологам, диабетологам, неврологам и терапевтам (8%).

Статистика

По статистике **90%** российских
мужчин старше 35 лет
страдают от :



Тестостерон -основной мужской половой гормон

Эрекция и половое влечение являются взаимосвязанными процессами, которые могут существенно варьировать при недостатке тестостерона, и даже совсем исчезнуть в ряде случаев.



У 32–35 % мужчин с ЭД снижен уровень тестостерона



Дефицит тестостерона приводит к нарушению эректильной функции

Тестостерон



ТЕСТОСТЕРОН

- основной мужской половой гормон, который является ключом к сексуальным возможностям мужчины.

С 30 лет уровень гормона мужской силы начинает снижаться на 3% в год. Когда уровень тестостерона достигает нижней границы нормы (2-4.5 нмоль/л.)

- половая активность мужчины исчезает!

Потенциалекс

восстанавливают и поддерживают в норме **уровень тестостерона** в организме мужчины, высвобождая активный тестостерон.

Это абсолютно естественный эффективный контроль над мужской силой!

Эректильная дисфункция



Что такое эректильная дисфункция?

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ (ЭД)

1. Неспособность достигать и/или поддерживать ЭРЕКЦИЮ, достаточную для удовлетворения сексуальной активности.

и/или

2. Нарушение оргазма.

и/или


3. Ослабление либидо
– полового влечения.

Эректильная дисфункция и импотенция



ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

-
расстройство **ТОЛЬКО ЭРЕКЦИИ**,
возникающее периодически
и
различное
по степени проявления.



ИМПОТЕНЦИЯ

-
ПОЛНАЯ НЕСПОСОБНОСТЬ
мужчины совершать половой акт.

Причины эректильной дисфункции

КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИЧИНЫ

ОРГАНИЧЕСКАЯ

80%



ПСИХОГЕННАЯ

20%




Депрессия



Тревога



Стресс



Причины эректильной дисфункции

ШЕСТЬ ВРАГОВ ПОТЕНЦИИ


Нерегулярная половая жизнь



Болезни, передающиеся половым путём



Гиподинамия



Нерациональное питание (фастфуд)



Алкоголь



Курение

Эректильная дисфункция: СИМПТОМАТИКА



Слабая эрекция или смягчение во время полового акта



Продолжительность полового акта до 3 минут



Преждевременное семяизвержение (осечки)



Оргазм мало похож на феерию



Снижение частоты половых актов



Снижение полового влечения (либидо)

Последствия эректильной дисфункции

1 Импотенция

2 Бесплодие

3 Застойный простатит

4 Везикулит (воспаление в семенных пузырьках)

5 Орхит

6 Неврозы, психозы, депрессия



Лечение эректильной дисфункции



Уколы

Инъекции препаратов непосредственно в пенис



Психотерапия

Эффективна в случаях, когда эректильная дисфункция имеет психологические причины




Изменение образа жизни

Отказ от курения, нормализация веса, физические нагрузки



Пероральные препараты

Препараты первой линии при лечении эректильной дисфункции - это ингибиторы PDE5 (Виагра, Левитра, Сиалис и др.)



Вакуумные устройства

С их помощью достигается эрекция, для её длительного сохранения используются специальные кольца, которые препятствуют оттоку крови

Потенциалекс: паспорт оффера

- 1. Производитель:** ООО "ГудПрайс", 109387, г. Москва, ул. Люблинская, д. 40
- 2. Вес/Объем/Размер** 10 капсул по 500 мг
- 3. Состав:** мальтодекстрин, растительные экстракты: бутеа суперба, фадогии, брионии лациниоза, красного корня, эврикомы длиннолистной, горянки, эспарцета, семян шафрана, семян винограда, семян тыквы, плодов облепихи, семян кедра, амаранта, мордовника, яртышника, L-аргинин, L-карнитин.
- 4. Способ применения:** взрослым 1-2 капсулу 1 раз в день.
- 5. Показания к применению:** Эректильная дисфункция (неспособность достигать и сохранять эрекцию, необходимую для совершения полового акта).
- 6. Срок годности:** 2 года



Состав Потенциалекса



Экстракт Красного Корня

1. Обеспечивает мгновенный приток крови к половому члену
2. Обеспечивает стойкую эрекцию на несколько часов
3. Нормализует тонус мочевыводящих путей
4. Способствует нормализации мочеиспускания



Экстракт Фадогии

1. Природный афродизиак.
2. Повышает либидо
3. Продлевает эрекцию
4. Препятствует преждевременному семяизвержению



Бутеа Суперба

1. Природный аналог виагры
2. Увеличивает выработку своего природного тестостерона
3. В разы увеличивает сексуальное влечение
4. Увеличивает половую чувствительность
5. Усиливает оргазм

Состав Потенциалекса




Бриония лациниоза

1. Уменьшает усталость
2. Повышает тонус организма в целом
3. Делает ощущения во время секса более яркими



Семена Шафрана

1. Предупреждает застойные явления в области малого таза
2. Профилактика простатита
3. Улучшает качество спермы



L-аргинин (эль-аргинин)

1. Способствует выработке оксида азота, благодаря чему увеличивается приток крови к половому органу
2. Укрепляет эрекцию и увеличивает ее продолжительность
3. Формирует мышечную ткань и уменьшает жировую прослойку
4. Необходимая аминокислота для сердечно-сосудистой системы, а также служит профилактикой атеросклероза

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛЯ НЕГО

1. Стойкая продолжительная эрекция
2. Длительные и регулярные половые акты
3. Мощный оргазм
4. Обильное семяизвержение

ДЛЯ НЕЕ

1. Множественные оргазмы невероятной силы



Действие Потенциалекса

1. Укрепляет эрекцию
 2. Продлевает половой акт
 3. Усиливает оргазм и половую чувствительность
 4. Усиливает желание (либидо)
- А также:
5. Профилактика простатита
 6. Снимает умственную и физическую усталость
 7. Повышает работоспособность



Конкуренты и их минусы

1. Дороговизна

2. Длительный прием

3. Разовые стимуляторы

4. Химический состав

5. Большое количество побочных эффектов

6. Закрепление результатов до 3 мес.

7. Качество эрекции до 68%

8. Эрекция до 1,5 часов



Побочные эффекты конкурентов



1. Усталость и мышечная слабость
2. Головокружение, нарушение координации движений
3. Головная боль
4. Нарушение сердечно-сосудистой системы, включая ИНФАРКТЫ
5. Нарушения со стороны ЖКТ: тошнота, боли, диарея
6. Нарушения четкости зрения

Преимущества ПОТЕНЦИАЛЕКСА


1. Быстрая стойкая эрекция ТОЛЬКО при наличие объекта желания
2. Прошли все необходимые испытания на безопасность и качество
3. 100% натуральный состав:
не содержит гормональных компонентов и антибиотиков
4. Не токсичен
5. Не вызывает привыкания
6. Не вызывает побочных эффектов, характерных для синтетических препаратов
7. Совместим с умеренным количеством алкоголя и любыми лекарственными средствами
8. Закрепление результатов до 3 лет
9. Качество эрекции до 97%
10. Эрекция до 4 часов

ПРЕДСТАКАПС


СРЕДСТВО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН



Заболевания предстательной железы: статистика



- Согласно статистике, хронический простатит есть не меньше чем у 30% мужчин старше 25 лет.
- При этом до 40% урологических больных страдают простатитом в наиболее трудоспособном и социально активном возрасте (20-40 лет), что имеет огромное социальное значение.
- От этой болезни еще никто не умирал, но жизнь она может сильно испортить. Особенно личную.




Простатит и Аденома простаты

Нормальное состояние



Воспаление простаты

Мочевой пузырь


Моча




Воспаленные ткани сдвливают уретру, затрудняя или полностью блокируя отток мочи.



Причины простатита



Хронические инфекции, в том числе, передаваемые половым путем, ослабление иммунитета



Дефицит витаминов и микроэлементов



Частое использование прерванного полового акта в качестве контрацепции, длительное воздержание



Психические и физические перегрузки



Частые переохлаждения



Сидячий образ жизни

Простатит: симптоматика и осложнения

СИМПТОМЫ



бессимптомно

резкие болевые приступы в области промежности и поясницы



нарушение мочеиспускания



рези и боли



ОСЛОЖНЕНИЯ

везикулит



хронические боли



осложненное мочеиспускание



импотенция



бесплодие



Ведет к эректильной дисфункции и импотенции!


Простатит: методы терапии



**ЭЛЕКТРОФОРЕЗ,
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ**




УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ



ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧОМ



ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ



МАССАЖ ПРОСТАТЫ




**ГИРУДОТЕРАПИЯ
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЯВОК)**

А так же, малоэффективные лекарственные препараты!

Анатомия мочевого пузыря

Мочевой пузырь



Резервуар для мочи, форма и размеры которого изменяются по мере заполнения его мочой.

Емкость **250-500** мл

Детрузор – мышца верхушки и тела мочевого пузыря (изгнание мочи)

Сфинктер – мышца области дна мочевого пузыря (препятствует поступлению мочи в мочеиспускательный канал)

Когда мочевой пузырь наполняется мочой, его стенки растягиваются, повышается внутрипузырное давление. Нервные рецепторы подают сигнал в мозг, что надо опорожнить пузырь – возникает позыв к мочеиспусканию!

Почему происходит недержание мочи: патфизиология

Детрузор мочевого пузыря — мышечная оболочка, изгоняющую мочу. Её сокращение приводит к мочеиспусканию. Если с детрузером все в порядке, то человек способен сдерживать мочеиспускание.

Нарушения детрузора ведет к проблемам мочеиспускания и выделяют:

Гиперрефлекторное нарушение или гиперактивный мочевой пузырь:

Возбудимость мочевого пузыря увеличена, происходит непроизвольное сокращение или спазм детрузора. Для позыва достаточно и очень малого количества мочи. И за один раз выходит несколько капель.

Может возникнуть спонтанно или при кашле, чихании, подъеме тяжестей, несмотря на то, что человек пытается подавить эти сокращения волевым усилием. Когда в мочевом накапливается достаточное количество мочи, детрузор самостоятельно сокращается и случается непроизвольное испускание мочи.

Гипорефлекторное нарушение: гипотания (расслабление) детрузора и мочевой пузырь не способен опорожниться сам. Жидкость вытекает не полностью и слабым напором.



Недержание мочи или непроизвольное мочеиспускание: статистика


**2 из 3 женщин страдают
от недержания мочи**



По статистике Всемирной Организации Здравоохранения, более **90%** женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с недержанием мочи!

Недержание мочи: статистика обращений к врачу

■ Никогда не обращаются ■ Обращаются



Недержание мочи или непроизвольное мочеиспускание возникает при:

ЦИСТИТ - воспаление мочевого пузыря – наиболее частая причина учащенного мочеиспускания, которое также сопровождается болью и режками.

ПИЕЛОНЕФРИТ - заболевание почек воспалительной природы, одним из симптомов которого является учащенное мочеиспускание, а также повышение температуры, лихорадка, боли.

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО РАБОТЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ - для него специфично частое и выраженное желание сходить в туалет. в тяжелых случаях развивается недержание мочи. среди причин развития состояния: опухоли, расстройства нервной регуляции работы мочевого пузыря, болезнь Паркинсона, и др.

АТОНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ - стенки мочевого пузыря имеют ослабленный тонус, что и приводит к непроизвольному мочеиспусканию.

ГИПЕРАКТИВНЫЙ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ - состояние является осложнением других заболеваний мочевыделительной системы, при котором усиливается активность нервных рецепторов стенок мочевого пузыря, что и проявляется частыми позывами к мочеиспусканию



Недержание мочи или непроизвольное мочеиспускание: причины

Возраст: 30% женщин до 45 лет. 70% 45+, что связано с ослаблением работы мочевыделительной системы

Гормональная перестройка в менопаузу: эстроген отвечает за выработку специальных веществ, делающих ткани эластичными, а при его недостатке в менопаузу, эластичность утрачивается.

Диабет – вызывает дисфункцию нервных окончаний мочевыделительной системы

Избыточный вес: жировая ткань, расположенная внутри брюшной полости оказывает давление на мочевой пузырь

Травматические или частые роды: в результате неправильной тактики родовспоможения или рождения крупного ребёнка рвутся ткани промежности и влагалища, а также происходит излишнее растяжение тазовых мышц

Инфекции: цистит, уретрит


Переохлаждение

Черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника

Инсульты: провоцируют нарушения работы мозгового центра, отвечающего за позывы к мочеиспусканию

Слабость мышц малого таза

Заболевания передающиеся половым путем



Виды недержания мочи

Стрессовое - мочеиспускание происходит только тогда, когда на мочевой пузырь и брюшную стенку оказывается давление. Обычно такое случается при занятиях спортом, поднятии тяжестей, интенсивном сексе.

В тяжёлых случаях моча выделяется при сильном кашле и даже чихании.

Ургентное - женщина внезапно ощущает непреодолимое желание помочиться и зачастую не успевает дойти до уборной. Характерной особенностью ургентной разновидности является то, что мочевой пузырь при этом не бывает переполненным.

Смешанное - включает в себя черты как стрессового, так и ургентного недержания.



Симптомы недержания мочи



Внезапные позывы к мочеиспусканию, после которых сразу происходит неконтролируемое выделение мочи



Ощущения, что мочевой пузырь опорожняется не полностью



Постоянно возникающие позывы к мочеиспусканию



Недержание мочи при физических усилиях, кашле, чиханье



Постоянные ночные пробуждения из-за позывов к мочеиспусканию



Ощущения присутствия во влагалище инородного тела

Симптомы недержания мочи

- Боли и рези во время мочеиспускания
- Жжение
- Дискомфорт при половом акте
- Неприятный запах
- Температура, озноб и симптомы общего недомогания и интоксикации
- Боли в области поясницы



Осложнения недержания мочи

- Психологические: стрессы, депрессии, неврозы
- Кардинальное изменение привычного образа жизни
- У людей преклонного возраста ночное недержание мочи способствует падениям в темноте и травматизму
- Развитие инфекционных заболеваний в следствии задержки мочи



Методы лечения

1. Медикаментозная терапия

2. Народная медицина

3. Хирургическое лечение:

- миопластика,
- закрытие шейки мочевого пузыря
- искусственный сфинктер

4. Акупунктура

5. Лазерная терапия

6. Тренировка мышц тазового дна



Предстакапс: паспорт оффера

Производитель: ООО “Производственно-коммерческий центр”, Россия, 125057, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 77, корпус 1, помещение 8, офис 5.

Вес/объем/размер: 1 упаковка - 10 таблеток

Способ применения: 1 таблетку в день (утром или вечером независимо от приема пищи). Запить стаканом воды (200 мл).

Срок годности: 2 года



Предстакапс: состав



Грибы Шиитаки и Рейши

1. Оказывает противоопухолевое, антибактериальное и противогрибковое действие
2. Образует противовирусный барьер в организме и обеспечивает эффективную защиту против воспалительных процессов

Экстракт плодов пальмы Сабаль и коры сливы Пиджеум

1. Содержит фитостеролы (очищает сосуды), которые обладают выраженным противовоспалительным действием на предстательную железу
2. Уменьшает гиперплазию (аденому) предстательной железы и оказывает противовоспалительное и противоотёчное действие на её ткани, а также подавляет образование рубцовой ткани (спаек)
3. Уменьшает и устраняет функциональные нарушения мочеиспускания
4. Улучшает состав семенной жидкости
5. **Для женщин:**
 - снимает симптомы циститов и уретритов.
 - запускает мощный противовоспалительный процесс в мочевыводящей системе



Экстракт листьев Готу Кола

1. Улучшает микроциркуляцию крови в области малого таза
2. Оказывает противовоспалительное и диуретическое действие
3. Регенерирующее действие на слизистую мочеиспускательного канала
4. Нормализуют психоэмоциональную сферу
5. **Для женщин:** укрепляет гладкую мускулатуру внутреннего сфинктера

Предстакапс: состав

Экстракт семян тыквы



1. Устраняет болевой синдром
2. Улучшает мочеиспускание
3. Выводит токсины из организма
4. **Для женщин:**
 - природный источник эстрогена. Увеличивает его выработку, делая ткани мочевого пузыря эластичными
 - на 79% снижает общее и на 50% ночное недержание мочи
 - растворимая часть семян (не жиры), подавляет действие фермента ароматазы, который снижает тонус мышц тазового дна. Тем самым укрепляет их.
 - укрепляют стенки мочевого пузыря и снижая количество мочи, остающейся после мочеиспускания.

Ликопин



1. Останавливает развитие аденомы
2. Предотвращает перерождение клеток
3. Укрепляет стенки сосудов
4. **Для женщин:**
 - профилактика эрозий мочевого пузыря
 - профилактика эрозий шейки матки
 - мощнейший антиоксидант, предотвращающий старение
 - оказывает противовоспалительный эффект на всю мочеполовую систему
 - профилактика молочницы

Предстакапс: состав

Экстракт ягод клюквы




1. Уменьшает воспаление
2. Повышает потенцию
3. Уменьшает ночные позывы, как у мужчин, так и у женщин
4. **Для женщин:**
 - самое мощное противомикробное и противовоспалительное средство при цистите
 - обладает спазмолитическим действием, снимает спазм детрузора, тем самым устраняет первопричину недержания мочи
 - выводит опасные токсины из почек, мочевого пузыря и мочевой системы, позволяющей организму работать с максимальной эффективностью
 - восстанавливает влажность слизистых оболочек мочеполовой системы женщин



Медвежья желчь:

1. Увеличивает жизненный тонус
2. Стимулирует половую активность, как у мужчин, так и у женщин
3. Увеличивает либидо.

Действие Предстаканса



1. Предупреждает развитие опухолевых патологий клеток простаты и мочевыводящих путей.
2. Быстро избавляет от воспаления, боли
3. Эффективно и быстро устраняет инфекции и бактерии
4. Нормализует мочеиспускание
5. Нормализует работу простаты и все мочеполовой системы
6. Восстанавливает потенцию
7. Защищает от рецидивов при недержании мочи
8. Приносит полное облегчение при посещениях туалета
9. Воздействует на причину недержания мочи
10. Улучшает общее самочувствие

Конкуренты при простатите




**капсулы 30шт
800 руб.**



**капсулы 30шт
1200 руб.**




**капсулы 30шт
700 руб.**



**капсулы 30шт
450 руб.**

1. Длительный срок приема до 3 месяцев
2. Не возвращают естественные размеры предстательной железы
3. Не восстанавливают эректильную функцию
4. Ведут к аллергическим реакциям
5. Вызывают головокружения
6. Снижают внимание

Конкуренты при недержании мочи



1. Высокая цена от 1700р за упаковку, а нужно минимум на 3 мес.
2. Не являются универсальными, однонаправленное действие
3. Не отпускаются без рецепта
4. Имеют множество противопоказания
5. Побочные эффекты
6. Специальное белье ТОЛЬКО мера предосторожности!



Преимущества Предстакапса

- 1 Эффективен при любых формах простатита и недержания мочи
- 2 100% натуральный состав:
не содержит гормональных компонентов и антибиотиков
- 3 Усиливает эффективность любого лечения
- 4 Не вызывает привыкания
- 5 Воздействует на причины простатита и недержания мочи
- 6 Стойкий результат при отсутствии побочных эффектов
- 7 Совместим с умеренным количеством алкоголя и любыми лекарственными средствами
- 8 Восстанавливает выделительные процессы
- 9 Уменьшает частоту ложных позывов
- 10 Стойкий накопительный и закрепляющий эффект