

СТОМАТИТ



**ГБПОУВО «АМК» 34.02.01
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
СТУДЕНТ (КА): 2 КУРСА
ЛАЗАРЕВА ОЛЕСЯ
СЕРГЕЕВНА
РУКОВОДИТЕЛЬ:
БАРАНОВА М.С.**

КЛАССИФИКАЦИЯ

Стоматит – это острый воспалительный процесс, который возникает на слизистой оболочке ротовой полости. Различают следующие виды стоматита:

- Грибковый (характерен для детей до 1-го года);
- Вирусный (характерен для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет);
- Афтозный (появляется в возрасте от 7-ми до 15-ти лет);
- Симптоматический (характерен для детей от 1-го года до 3-х).
- Для детей любого возраста характерен бактериальный стоматит, возникающий вследствие термического, механического травмирования полости рта, нарушения правил личной гигиены, употребления немытых фруктов, приема пищи грязными руками.

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ СТОМАТИТА

У ребёнка могут возникать следующие симптомы стоматита:

- ❑ Малыш становится беспокойным, плачет;
- ❑ У ребёнка пропадает аппетит, он отказывается от еды (груднички могут бросить грудь);
- ❑ Повышается температура тела (некоторые виды стоматита проходят с увеличением температуры тела от 39 до 41 С);
- ❑ В некоторых случаях появляется понос и рвота.



КАНДИДОЗ ПОЛОСТИ РТА

- Возбудителем данного заболевания является дрожжеподобные грибы рода *Candida*. Основным источником этих грибов - родители. Локализуется молочница полости рта у детей чаще на внутренней поверхности губы, деснах, щеках или языке. Сначала образуется характерный белый налет, постепенно переходящий в пленочку.



ЛЕЧЕНИЕ ГРИБКОВОГО СТОМАТИТА

- При **грибковом стоматите** необходимо регулярно обрабатывать рот больного бинтом, смоченном в содовом растворе (раствор готовится из расчета 1 ч.л. соды на стакан кипячёной воды). Прodelывать эту процедуру следует сразу после того, как ребёнок поел. Бинт наматывается на чистый палец, макается в заранее подготовленный раствор и начинается процесс съёма белых творожистых отложений со слизистой больного.
- Обработка пораженных участков мазями Клотримазол, Нистатиновой, кремом Пимафуцин.
- При кандидозном стоматите исключаются кислые фрукты и напитки, жесткая, грубая пища, слишком горячая или холодная, сокращается в рационе количество углеводной пищи.

ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ


- особенно характерен для детей в возрасте от одного до четырех лет. Вирус может передаваться воздушно-капельным и контактным путем. Признаками герпетического стоматита является сыпь на губах, повышенная (до 38-39 градусов) температура, вялость, капризность ребенка, потеря у него аппетита. В некоторых случаях герпетический стоматит у ребенка сопровождается насморком и кашлем.



ЛЕЧЕНИЕ ГЕРПЕСНОГО СТОМАТИТА

- у детей проводится с применением мазей, подобных Ацикловиру, Зовираксу или Теброфену. Мазь наносят на язвочки 3 – 4 раза на протяжении суток. При тяжелой форме показано использование Ацикловира и Алпизарина в таблетированной форме.
- Противовирусные препараты, например, ректальные свечи «Виферон» и «Интерферон»
- В период заживления элементов сыпи необходимо назначение препаратов, которые будут помогать восстановиться поврежденной слизистой оболочке, это кератопластики. В эту группу можно отнести витамин А, облепиховое масло, масло шиповника.

АФТОЗНЫЙ СТОМАТИТ



Сначала язвочки напоминают язвы как при герпетическом стоматите, с тем же характерным покраснением, жжением, зудом, возможным повышением температуры. Однако, затем появляются не пузырьки, а афты — это болезненные белые язвы с ярким покраснением вокруг, они округлой формы с четкими ровными краями.

Затем афты покрываются мутной пленкой, и в случае занесения вторичной инфекции после ее прорыва, воспалительный процесс усугубляется, у ребенка может подняться температура, он становится сонливым, отказывается от еды.

ЛЕЧЕНИЕ АФТОЗНОГО СТОМАТИТА У ДЕТЕЙ

- Если устанавливается аллергическая природа возникновения афтозного стоматита, то исключается контакт с аллергеном, назначаются антигистаминные препараты — Супрастин, [Цитрин в сиропе](#) (детям старше 2 лет).
- Для обработки афт используются также растворы соды, борной кислоты, отвары трав, Синька.
- Подбор антисептической, противомикробных средств зачастую осуществляется методом проб и ошибок, поскольку протекание любого воспалительного процесса индивидуально, кому то помогают [спрей Люголь](#), спрей Гексорал, или [полоскание Иодиолом](#), кому то очень помогает Винилин или метиленовый синий краситель — Синька.
- Если обнаруживаются нарушения ЖКТ, то проводится соответствующее лечение сопутствующего заболевания.
- Назначаются витамины С, В1, В2, В12.
- Из противовирусных препаратов может быть назначен Вифирон.
- При хроническом течении стоматита для коррекции иммунитета иммунолог может назначить Декарис, Пирогенал.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!