

*Вычисление интегралов
различными методами.
Применение определенного
интеграла к вычислению площади
плоской фигуры*


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функция $F(x)$ называется **первообразной** для функции $f(x)$ на интервале $X=(a,b)$ (конечном или бесконечном), если в каждой точке этого интервала $f(x)$ является производной для $F(x)$, т.е.


$$F'(x) = f(x)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ


Фигура, ограниченная графиком функции $y = f(x)$ прямыми $x = a$, $x = b$ и осью абсцисс, называется **криволинейной трапецией**, $ABCD$ -это криволинейная трапеция.




1.




2.



3.



4.



ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ - это предел, к которому стремится интегральная сумма

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty$$

Обозначают:

$$\int_a^b f(x) dx$$

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА

Если $f(x)$ на отрезке $[a; b]$ неотрицательна, то
определенный интеграл $\int_a^b f(x)dx$ равен
площади

криволинейной трапеции, ограниченной графиком
функции $f(x)$, осью абсцисс и прямыми $x = a$, $x = b$,
т.е.

$$S = \int_a^b f(x)dx$$

ФОРМУЛА НЬЮТОНА- ЛЕЙБНИЦА

Если $f(x)$ – непрерывная и неотрицательная на отрезке $[a; b]$ функция, а $F(x)$ – ее первообразная на этом отрезке, то площадь S соответствующей криволинейной трапеции равна приращению первообразной на отрезке $[a; b]$, т.е.

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

$$S = \int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

СВОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА

1. $\int_a^a f(x)dx = 0 ;$

2. $\int_a^b dx = b - a ;$

3. $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx ;$

4. $\int_a^b [f_1(x) + f_2(x)]dx = \int_a^b f_1(x)dx + \int_a^b f_2(x)dx ;$

СВОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА

$$5. \int_a^b Kf(x)dx = K \int_a^b f(x)dx ;$$

$$6. \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx ;$$

$$7. \int_a^b f(x)dx \geq 0 , \text{ если } f(x) \geq 0 .$$

Таблица интегралов

$$1. \int dx = x + C;$$

$$2. \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1);$$

$$3. \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C;$$

$$4. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C;$$

$$5. \int e^x dx = e^x + C;$$

$$6. \int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$7. \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$8. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C;$$

$$9. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$$

$$10. \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C;$$

$$11. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C;$$

$$12. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C;$$

$$13. \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C.$$



Примеры:

$$\int_0^8 \sqrt[3]{x} dx = \frac{3x^{4/3}}{4} \Big|_0^8 = \frac{3}{4} x^3 \sqrt{x} \Big|_0^8 = \frac{3}{4} (8^3 \sqrt{8} - 0) = 12$$

$$\int_1^2 e^{2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} \Big|_1^2 = \frac{1}{2} (e^4 - e^2) = \frac{1}{2} e^2 (e^2 - 1)$$

$$\int_{-1}^3 (x^3 + 1) dx = \int_{-1}^3 x^3 dx + \int_{-1}^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_{-1}^3 + x \Big|_{-1}^3 = \left(\frac{x^4}{4} + x \right) \Big|_{-1}^3 = \left(\frac{3^4}{4} + 3 \right) - \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = \left(20 \frac{1}{4} + 3 \right) + \frac{3}{4} = 24$$

$$\int_0^{\pi} 2 \sin x dx = -2 \cos x \Big|_0^{\pi} = -(2 \cos \pi - 2 \cos 0) = 4$$

Пример

Вычислить $\int_0^3 e^{-\frac{x}{3}} dx$.

$$\begin{aligned} \int_0^3 e^{-\frac{x}{3}} dx &= \int_0^3 e^{-\frac{1}{3} \cdot x} dx = -3e^{-\frac{1}{3} \cdot x} \Big|_0^3 = -3 \left(e^{-\frac{1}{3} \cdot 3} - e^{-\frac{1}{3} \cdot 0} \right) = \\ &= -3(e^{-1} - 1) = -3 \left(\frac{1}{e} - 1 \right) = -3 \frac{1-e}{e} \end{aligned}$$

A scenic landscape of a mountain valley. The foreground and middle ground are dominated by lush green slopes and a winding river. In the background, there are dark, rugged mountains with patches of snow or light-colored rock. The sky is filled with dramatic, grey clouds, suggesting an overcast or stormy day. The overall mood is majestic and natural.

*Интегрирование
методом
подстановки.*

Теорема (Замена переменной в определенном интеграле).

Пусть $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, а функция $x = \varphi(t)$ непрерывна вместе со своей производной $\varphi'(t)$ на отрезке $[\alpha, \beta]$, причем $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$. Тогда

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt .$$

Пример

$$\int_0^3 \frac{x dx}{\sqrt{x+1}} = \left. \begin{array}{l} \sqrt{x+1} = t \\ x+1 = t^2 \\ x = t^2 - 1, dx = 2t dt \\ x = 0, t = 1 \\ x = 3, t = 2 \end{array} \right| = \int_1^2 \frac{t^2 - 1}{t} 2t dt =$$
$$= \int_1^2 2(t^2 - 1) dt = 2 \int_1^2 (t^2 - 1) dt = 2 \left(\frac{t^3}{3} - t \right) \Big|_1^2 = 2 \left[\left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \right] =$$
$$= 2 \left(\frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} + 1 \right) = 2 \left(\frac{7}{3} - 1 \right) = 2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

A scenic landscape featuring a calm, blue lake in the foreground, reflecting the surrounding environment. The lake is flanked by steep, rugged mountains. The left side shows dark, rocky slopes, while the right side is covered in lush green vegetation and evergreen trees. A small wooden building is visible on the right. In the upper right corner, a colorful hot air balloon floats in a bright blue sky with scattered white clouds. The overall atmosphere is peaceful and natural.

Интегрирование по частям

Теорема (Интегрирование по частям в определенном интеграле).

Если функции $u = u(x)$, $v = v(x)$ и их производные $u'(x)$ и $v'(x)$ непрерывны на отрезке $[a, b]$, то

$$\int_a^b u dv = u \cdot v \Big|_a^b - \int_a^b v du .$$

Пример

$$\int_1^e \ln x dx = \left| \begin{array}{l} u = \ln x, du = \frac{dx}{x} \\ dv = dx, v = x \end{array} \right| = x \ln x \Big|_1^e - \int_1^e x \frac{dx}{x} =$$


$$= x \ln x \Big|_1^e - \int_1^e dx = e \ln e - \ln 1 - x \Big|_1^e = e - e + 1 = 1$$



*Применение определенного
интеграла для вычисления
площадей плоских фигур*

ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ


Случай I. Фигура ограничена осью Ox , прямыми $x=a$, $x=b$ и графиком функции $y=f(x)$, причем $f(x)>0$.



$$S = \int_a^b f(x) dx$$

ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ

Случай II. Фигура ограничена осью Ox , прямыми $x=a$, $x=b$ и графиком функции $y=f(x)$, причем $f(x)<0$.




$$S = \left| \int_a^b f(x) dx \right|, f(x) > 0$$

$$S = - \int_a^b f(x) dx$$

ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ


Случай III. Фигура ограничена осью Ox , прямыми $x=a$, $x=b$ и графиками функций $y=f(x)$ и $y=\varphi(x)$, причем $f(x)>0$, $\varphi(x)>0$.



$$S = \int_a^b (f(x) - \varphi(x)) dx;$$

ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКОЙ

Случай IV. Если $f(x) \leq 0$, $\varphi(x) \leq 0$, то графики функций расположены *ниже* оси абсцисс, а условие $f(x) \geq \varphi(x)$, означает, что график $f(x)$ расположен выше графика $\varphi(x) > 0$.




$$S_{ABCD} = \underbrace{S_{aDCb}} - \underbrace{S_{aABb}} = -\int_a^b \varphi(x) dx - \left(-\int_a^b f(x) dx\right) = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b \varphi(x) dx = \int_a^b (f(x) - \varphi(x)) dx$$

ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ

Случай V. Фигура ограничена осью Ox , прямыми $x=a$, $x=b$, причем на интервале (a,c) $\varphi(x) > 0$, а на интервале (c,d) $\varphi(x) < 0$, тогда:


г)



$$S = \int_a^c (\varphi(x) - f(x)) dx + \int_c^b (f(x) - \varphi(x)) dx;$$

ОСНОВНЫЕ СЛУЧАИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ

Случай VI. Фигура ограничена осью Ox , прямыми $x=a$, $x=b$, причем на интервале (a,c) $\varphi(x)<0$, а на интервале (c,b) $\varphi(x)>0$, тогда:



$$S = S_1 + S_2$$

$$S = -\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

АЛГОРИТМ решения задач на **вычисление площадей :**

- 1. Сделать чертеж графиков заданных функций, ограничивающих площадь плоских фигур.**
- 2. Найти пределы интегрирования.**
- 3. Выяснить какой формулой площади плоской фигуры удобно пользоваться в данном случае.**
- 4. Вычислить площадь заданной фигуры.**


Пример. Найдите площадь фигуры,
ограниченной линиями $y = x - 3$, $y = x^2 - 3$

$$S = \int_{-2}^3 (x + 3 - (x^2 - 3)) dx$$

$$S = \int_{-2}^3 (x - x^2 + 6) dx$$

$$S = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + 6x \right) \Big|_{-2}^3$$

$$S = 11\frac{5}{6}$$




Пример. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями $g(x) = 3 - x$, $f(x) = 0,5x^2 + 2x + 3$, $x = -3$, $x = 2$, $y = 0$

$$S_{\phi} = S_1 + S_2$$

$$S_1 = \int_{-3}^0 (0,5x^2 + 2x + 3) dx =$$

$$S_2 = \int_0^2 (3 - x) dx = (3x - \frac{x^2}{2}) \Big|_0^2 =$$




$$S_{\phi} = 4,5$$

Пример. Вычислить площадь фигуры,

ограниченной линиями $y = 0,5x^2 + 1$, $y = 0$, $x = -2$, $x = 3$.


Применив формулу (1), найдем площадь криволинейной трапеции:



$$S = \int_{-2}^3 \left(\frac{1}{2}x^2 + 1 \right) dx = \left(\frac{1}{6}x^3 + x \right) \Big|_{-2}^3 =$$

$$= \left(\frac{1}{6} \cdot 3^3 + 3 \right) - \left(\frac{1}{6}(-2)^3 - 2 \right) = 10 \frac{5}{6} \text{ (кв.ед)}$$

Пример. Вычислить площадь фигуры,
ограниченной линиями $y = -x^2 - 1$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 2$.




По формуле (2) находим

$$S = -\int_{-1}^2 (-x^2 - 1) dx = \int_{-1}^2 (x^2 + 1) dx =$$

$$= \left(\frac{1}{3} x^3 + x \right) \Big|_{-1}^2 = \left(\frac{1}{3} \cdot 2^3 + 2 \right) - \left(\frac{1}{3} \cdot (-1)^3 - 1 \right) = 6 \text{ (кв.ед)}$$

Пример . Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями $y = \sin x$, $y = 0$, $x = -\pi/2$, $x = \pi$.



Очевидно, что $\sin x \leq 0$ для всех $x \in [-\pi/2; 0]$ и $\sin x \geq 0$ для всех $x \in [0; \pi]$.

Поэтому


$$S = - \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin x dx + \int_0^{\pi} \sin x dx = \cos x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0 - \cos x \Big|_0^{\pi} =$$
$$= \left(\cos 0 - \cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) - (\cos \pi - \cos 0) = (1 - 0) - (-1 - 1) = 3(\text{кв.ед})$$

Пример. Вычислить площадь фигуры, ограниченной

ЛИНИЯМИ $y = \frac{1}{3}x + 2$ и $y = \frac{1}{9}x^2$.

Пределы интегрирования a и b находим из системы уравнений:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{3}x + 2, \\ y = \frac{1}{9}x^2. \end{cases}$$



Отсюда $\frac{1}{3}x + 2 = \frac{1}{9}x^2$, т. е. $x^2 - 3x - 18 = 0$, откуда $x = -3$ и $x = 6$. Следовательно, $a = -3$ и $b = 6$. Так как на отрезке $[-3; 6]$ для $f(x) = \frac{1}{3}x + 2$, $g(x) = \frac{1}{9}x^2$.

имеем $f(x) \geq g(x)$, то по формуле (3) находим

$$\begin{aligned} S &= \int_{-3}^6 \left(\left(\frac{1}{3}x + 2 \right) - \frac{1}{9}x^2 \right) dx = \left(\frac{1}{6}x^2 + 2x - \frac{1}{27}x^3 \right) \Big|_{-3}^6 = \\ &= \left(\frac{1}{6} \cdot 6^2 + 2 \cdot 6 - \frac{1}{27} \cdot 6^3 \right) - \left(\frac{1}{6} \cdot (-3)^2 + 2 \cdot (-3) - \frac{1}{27} \cdot (-3)^3 \right) = 13,5 (\text{кв.ед}) \end{aligned}$$

Вычислить площадь фигур, ограниченных линиями (работа в группах)

1) $y = x^2 + 1, y = 5$

2) $y = x^2, y = 2x$

3) $y = -x^2 + 4x - 4$ и осями координат

4) $y = x, y = x - 6, y = 0$

5) * $y = x, y = (x + 2)^3, y = 1, y = 0$

ОТВЕТ



РЕШЕНИЯ

4) $y = \sqrt{x}$, $y = (x+2)^3$, $y = 1$, $y = 0$

$$S_{\phi} = S_{ABC} + S_{CBDO} + S_{ODE} \quad -1$$


$$S_{ABC} = \int_{-2}^{-1} (x+2)^3 dx = \frac{(x+2)^4}{4} \Big|_{-2}^{-1} = \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{4}$$

$$S_{CBD} = CO \times OD = 1$$

$$S_{ODE} = \int_0^1 1 dx - \int_0^1 \sqrt{x} dx = x - \frac{2}{3} x\sqrt{x} \Big|_0^1 =$$

$$= (1-0) - \frac{2}{3}(1-0) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$S_{\phi} = \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{3} = 1\frac{7}{12}$$




5) $y = \sqrt{x}$, $y = x-6$, $y = 0$

$$S = S_{OBD} - S_{CBD} = 18 - 4.5 = 13.5$$

$$S_{OBD} = \int_0^9 x dx = \frac{2}{3} x \cdot x \Big|_0^9 = \frac{2}{3} \cdot 9 \cdot 3 - 0 = 18$$

$$S_{CBD} = \frac{1}{2} CD \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = 4.5$$

Ответ: 13,5



Итоговый контроль

Вычислить площади фигур, ограниченных линиями.

1) $y = 5 - x^2, y = 3 - x$

- а) 3 б) 4,5 в) 6 г) 6,5

2) $y = 4x - x^2, y = 0$

- а) $3 \frac{2}{3}$ б) 11 в) $9 \frac{1}{2}$ г) $10 \frac{2}{3}$

3) $y = x^3, y = x$

- а) $1 \frac{1}{4}$ б) $\frac{1}{2}$ в) $\frac{1}{4}$ г) $1 \frac{1}{2}$

4) $y = 1/(x - 1)^2, y = 0, x = -1, x = 0$

- а) 0,75 б) 1 в) 0,5 г) 1,25



ОТВЕТ



ОТВЕТЫ

- 1 – б
- 2 – г
- 3 – в
- 4 – в

Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа.

ВАРИАНТ 1.

1. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями

$$y = \sqrt{x+1} \quad \text{и} \quad y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}x$$

2. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями

$$y = -x^2 + 4x + 3 \quad \text{и} \quad y = x^2 - 2x = 3.$$

ВАРИАНТ 2.

1. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями

$$y = \sqrt{x-1} \quad \text{и} \quad y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$$

2. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями

$$y = -x^2 - 2x + 5 \quad \text{и} \quad y = x^2 + 4x + 5.$$

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

