


# Продуктовая презентация



<b>Brand</b>	<b>Country</b>	<b>Brand manager (customer)</b>	<b>Product manager (Viseven)</b>
	Україна	Iuliia.Teteriatnyk@pfizer.com	e.bessmertnaya@viseven.com
<b>Presentation name</b>	<b>Repository</b>	<b>Manager's contact (design department)</b>	<b>Senior/ Chief designer's contact</b>
Лірика Нейро			
<b>iPad, IOS</b>	<b>Design link</b>	<b>Delivery date</b>	<b>Support platform</b>
10,5 ipad pro	<a href="https://visevengroup.sharepoint.com/:b:/s/accounts/ESyWF18Q3BBIIYy2P9_H8eUB01yAb2t93cOpd-OeexLSXQ?e=LqKhiu">https://visevengroup.sharepoint.com/:b:/s/accounts/ESyWF18Q3BBIIYy2P9_H8eUB01yAb2t93cOpd-OeexLSXQ?e=LqKhiu</a>		Veeva
<b>Link for brand requirements for eWizard support</b>	<b>eWizard delivery (production)</b>	<b>Total amount of the screenshots</b>	<b>Link for the latest presentation version as a standalone application (Product manager is responsible for the latest valid version)</b>

# Навігація, активні елементи, стандартні іконки



Меню:

В нижній частині екрана. Статичне.


Навігація:


Лінійна навігація. Бистрий перехід по панелі внизу екрана. Свайп одним пальцем. Чаптери підсвічуються.

Активні елементи:

1. На стартову
2. Тамбнейлы
3. Источники (література)
4. Инструкция (пдф)

# Структура текущей презентации

	<b>Пацієнти</b>	<b>Міжнародні рекомендації</b>	<b>Безпека та Ефективність</b>	<b>Прегабалін та Габалентин</b>	<b>Лірика та генерики</b>	<b>Дозування</b>
---	-----------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------



Лінійна навігація презентації. Швидкий перехід по панелі внизу кожного слайду. Чаптери на панелі мають підсвічуватися відповідно до знаходження на слайдах, що відповідають чаптерам.

## Лірика неврологи

Стартова сторінка

Обирайте оптимальну  
терапію

1.0

Стартова сторінка

Інтерактивність:

Істочник:

Дизайн:



Обирайте  
оптимальну  
терапію

WUKLYR2317070  
Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначено для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

IMG\_0222

Лірика

Золофт®


Pfizer

# Лірика неврологи

Пацієнти

Біль чи тривога – Лірика у допомогу!

2.0





Слайд середньої складності. Необхідно зробити активними три нижні кнопки. При натисні **Біль у спині** кнопки **Діабетична полінейропатія (ДПН)** та **Інші нейропатії** переходимо на 8 слайд.

на 10 слайд, на 11 слайд.

**Інтерактивність:** кнопка «» відкриває референс з літературою. Активна нижня панель, яка при натисканні провалює нас у відповідний розділ. Коли ми переходим від розділу до розділу, на цій панелі підсвічується назва поточного розділу

**Істочник:**



**Дизайн:**



# Лірика неврологи

Пацієнти

Нейропатичний біль погіршує якість життя та лишає людей працездатності<sup>1</sup>


3.0



Простой статичный слайд з одним референсом

Интерактивность:

Источник:



Дизайн:



# Лірика неврологи

Пацієнти

Нейропатичний біль –  
непросто описати словами<sup>1,2</sup> 6.0

**ЛІРИКА**  
СВІДКИЙ ЕФЕКТ. СПІЛКІЙ РЕЗУЛЬТАТ.

**НЕЙРОПАТИЧНИЙ БІЛЬ – НЕПРОСТО ОПИСАТИ СЛОВАМИ<sup>1,2</sup>**

Захворювання, при яких зустрічається нейропатичний біль

- Розсіяний склероз до 56%<sup>2</sup>
- Пухлиноасоційований біль 40%<sup>4</sup>
- Інсульт 8%<sup>2</sup>
- Спінальна травма близько 70%<sup>2</sup>
- Оперізуючий герпес 10-20%<sup>3</sup>

Інтерактивні елементи: меню, кнопки, панель навігації.

Простий статичний слайд з одним референсом

Інтерактивність:

Істочник:

**ЛІРИКА**  
СВІДКИЙ ЕФЕКТ. СПІЛКІЙ РЕЗУЛЬТАТ.

**НЕЙРОПАТИЧНИЙ БІЛЬ – НЕПРОСТО ОПИСАТИ СЛОВАМИ<sup>1,2</sup>**

Захворювання, при яких зустрічається нейропатичний біль

Джерело: Розсіяний склероз

- Davies M., Brophy S., Williams R., et al. The prevalence, severity and impact of painful diabetic peripheral neuropathy in Type 2 diabetes. *Diabetes Care*, 2006; 29:1518-22
- Біль (практическое руководство для врачей). Под ред. Н.Н. Янюк, М.Л. Кукушкина. М.: Издательство РАМН, 2011. С. 144-169, 252-255.
- Волынова Л.И. Постгерпетическая невралгия: клиника, лечение, профилактика. *Неврология и психиатрия*, 2007, с.76-79.
- Cielito S., Reyes-Gibby, Phuong Khang Motow, Arman Vazdar, et al. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy as a predictor of neuropathic pain in breast cancer patients previously treated with rasburicase. *J.Pain*, 2009 November; 10(11):1146-1150.

Дизайн:

## Лірика неврологи



пацієнти

Діабетична нейропатія спостерігається близько у 50% людей з діабетом<sup>1</sup>

5.0

**ЛІРИКА**  
СЕРТИФІКАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ШВИДКИЙ ЕФЕКТ. СТІЙКИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

**Діабетична нейропатія спостерігається близько у 50% людей з діабетом<sup>1</sup>**

"Замкнений круг" болю при ДПН<sup>1, 2</sup>Нейропатичний біль не заважає пацієнтам приймати протидіабетичні ліки<sup>1</sup>

Простой статичний слайд з одним референсом

Інтерактивність:

Істочник:

Дизайн:

**Джерело**

1. Klein SL, Heisler M, Piette JD, et al. The effect of chronic pain on diabetes patients' self-management. *Diabetes Care*. 2005;28(1):69-76.
2. Dobson AJ, McMillan L, Li J. Benefits of exercise intervention in reducing neuropathic pain. *Front Cell Neurosci*. 2014 Apr 4;8:102.

PMG.0230

# Лірика неврологи

Пацієнти

Лірика допомагає краще, ніж стандартна терапія в лікуванні болю у спині з нейропатичним компонентом<sup>1</sup>


4.0



Простий статичний слайд з одним референсом

Інтерактивність:

Источник:



Дизайн:

# Лірика неврологи

Міжнародні рекомендації

Лікування нейропатичного болю<sup>1-8</sup>

7.0

**ЛІКУВАННЯ НЕЙРОПАТИЧНОГО БОЛЮ<sup>1-8</sup>**

**ПРЕПАРАТ 1 лінійної терапії** нейропатичного болю

Європейське неврологічне Суспільство (EFNS)  
Прегабалін рекомендований як препарат вибору для лікування (рівень доказовості А) болювих полінейропатій, постгерпетичної невралгії, центрального нейропатичного болю

Європейське суспільство медичної онкології (ESMO)  
Антиконвульсанти рекомендовані як уясті монотерапії нейропатичного болю при онкологічних захворюваннях

Міжнародна асоціація з вивчення болю (IASP)

Товариство з вивчення клінічної ефективності (CREST)

Американська Академія неврології (AAN)

Французьке суспільство з вивчення болю (SFETD)

Канадське товариство з вивчення болю (CPS)

Пациєнти | **Міжнародні рекомендації** | Безпека та Ефективність | Прегабалін та Габапентин | Лірика та генерики | Дозування

**ЛІКУВАННЯ НЕЙРОПАТИЧНОГО БОЛЮ<sup>1-8</sup>**

**Джерело**

1. Flanagan N.E, Altal N, Hancockman S, et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: systematic review, meta-analysis and updated NICE recommendations. *Lancet Neurol*. 2015 Feb; 14(2): 182–192.
2. Altal N, Chocro S, Baron R, et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain 2010 revision. *Eur J Neurol*. 2010;17(5):1113-8 e88.
3. M. Fabian, R. Swift, F. Avila, et al. Management of Cancer Pain in Adult Patients. ESMO Clinical Practice Guidelines. *Ann Oncol* (2018) 29 (Suppl 4): iv166–iv191.
4. Bell N, England J, Franklin S, et al. Evidence-based guideline: Treatment of painful diabetic neuropathy. *Neurology*. 2011;76:11-6.

Французьке суспільство з вивчення болю (SFETD) | Канадське товариство з вивчення болю (CPS)

Пациєнти | **Міжнародні рекомендації** | Безпека та Ефективність | Прегабалін та Габапентин | Лірика та генерики | Дозування

**ЛІКУВАННЯ НЕЙРОПАТИЧНОГО БОЛЮ<sup>1-8</sup>**

**Джерело**

5. J. Ballentine. IASP Pain clinical update, Pharmacological Management of Neuropathic Pain, 2010, Vol. XVII, Issue 9.
6. Mu A., Weinberg E., Moulin D.E, et al. Pharmacologic management of chronic neuropathic pain: Review of the Canadian Pain Society consensus statement. *Can Pain Revue*. 2017 Nov;33(11):844-852.
7. CREST. Guidelines on the management of neuropathic pain. Доступно за посиланням: <http://www.crest-pain.org/wp-content/uploads/Guidelines-CREST-10-2017-Management%20of%20Neuropathic%20Pain-01-2020.pdf> PDF станом на 27.02.2019.
8. V. Martinez, N. Altal, D. Volkmann, et al. Chronic neuropathic pain: diagnosis, evaluation and treatment in out-patient services. Guidelines for clinical practice of the French Society for the Study and treatment of

Французьке суспільство з вивчення болю (SFETD) | Канадське товариство з вивчення болю (CPS)

Пациєнти | **Міжнародні рекомендації** | Безпека та Ефективність | Прегабалін та Габапентин | Лірика та генерики | Дозування

Простий статичний слайд з одним референсом

Інтерактивність:

Источник:

Дизайн:

# Лірика неврологи

Безпека та Ефективність

Якщо мета терапії нейропатичного болю швидше, якісне та ефективне знеболювання\*

8.0



Якщо мета терапії нейропатичного болю  
**ШВИДКЕ, ЯКІСНЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ ЗНЕБОЛЮВАННЯ\***

Потрібно красиво і якимось по-іншому розмістити таблетки. Можливо – як сходинки вгору зліва направо нижня «швидко», середня «якісно», верхня – «знеболення». При цьому таблетки мають пульсувати, звертати на себе увагу і запрошувати до натискання на них. При натисканні на «швидко» - провалюємось на слайд 14, «якісно» - 16 слайд, «знеболення» - 18 слайд.

Інтерактивність:

Істочник:



Пацієнти

Міжнародні рекомендації

**Безпека та Ефективність**

Прегабалін та Габалентин

Лірика та генерики

Дозування



# Лірика неврологи

Безпека та Ефективність

Якщо мета терапії нейропатичного болю швидше, якісне та ефективне знеболювання\*

9.0




Замініть ссилку на 1

Слайд відкривається натисканням таблетки на слайді 13

Інтерактивність:

Замініти ссилку на 1

Істочник:



Дизайн:

## Лірика неврологи

Безпека та Ефективність

Якщо мета терапії  
нейропатичного болю швидше,  
якісне та ефективне  
знеболювання\*

10.0



Якщо мета терапії нейропатичного болю  
**ШВИДКЕ, ЯКІСНЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ ЗНЕБОЛЮВАННЯ\***


**ЯКІСНО!**

15 301  
пацієнт з НєБ

6 тижнів  
терапії

-62% зниження  
інтенсивності болю  
на фоні терапії Лірикою®

Інтенсивність болю до та після 6 тижнів лікування  
прегабаліном в залежності від етіологічної причини



Замінити ссилку на 1, 2

1. Діабетична поліневропатія (n = 5091)
2. Постгерпетична невралгія (n = 2187)
3. Невралгія трищого нерву (n = 1548)
4. Поліневропатія, пов'язана зі злоякісною пухлиною (n = 406)
5. Алкогольна поліневропатія (n = 803)
6. Поліневропатія другої етіології (n = 2379)
7. Біль в спині з нейропатичним компонентом (n = 4271)

Ссилка

2. Інформація про лікарський засіб  
Прегабалін (реєстраційне посвідчення №  
UA/13690/01/01) від 20.02.2018 на офіційному  
ресурсі МОЗ «Державний реєстр лікарських  
засобів України» (посилання  
<http://www.drlez.com.ua>) dsl 27/02/2019.


Слайд відкривається  
натисканням таблетки  
на слайді 13

Інтерактивність:

Источник:

Замінити ссилку на 1,  
додати ссилку 2

Дизайн:






# Лірика неврологи

Безпека та Ефективність

Якщо мета терапії нейропатичного болю швидше, якісне та ефективне знеболювання\*

11.0




**Замінити посилку на 1, 2**

Посилка  
2. Інформація про лікарський засіб Прегабалін (реєстраційне посвідчення № UA/13690/01/01) від 20.02.2018 на офіційному ресурсі МОЗ «Державний реєстр лікарських засобів України» (посилання <http://www.drz.com.ua>) dsl 27/02/2019.

Інтерактивність:

Істочник:



Дизайн:

# Лірика неврологи

Безпека та Ефективність

Безпека і переносимість  
Лірики ретельно вивчена, в  
тому числі при тривалих  
лікуваннях

12.0



## БЕЗПЕКА І ПЕРЕНОСИМІСТЬ ЛІРИКИ РЕТЕЛЬНО ВИВЧЕНА, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРИ ТРИВАЛИХ КУРСАХ ЛІКУВАННЯ

- 223 клінічних досліджень  
105 доклінічних досліджень<sup>3</sup>
- Світовий досвід застосування -  
35,6 мільйонів пацієнто-років  
прийому<sup>2</sup>
- Більше 10 років клінічного  
застосування в Україні<sup>4</sup>
- Виробництво - Німеччина



- 6** Місяців прийому  
Генералізований тривожний розлад (ГТР)<sup>5</sup>, фіброміалгія<sup>6</sup>
- 15 24** Місяців прийому  
Діабетична полінейропатія<sup>7,8</sup>
- 30** Місяців прийому  
Епілепсія<sup>9</sup>

### Сприятлива переносимість у літніх пацієнтів

- Середній вік пацієнтів з ГТР в 8-тижневому дослідженні склав 72 роки<sup>10</sup>
- Середній вік пацієнтів з постгерпетичною невралгією в 13-тижневому дослідженні склав 73 роки<sup>1</sup>

ПОЄДНАННЯ В ПОЛІТЕРАПІЇ

Пацієнти	Міжнародні рекомендації	<b>Безпека та Ефективність</b>	Прегабалін та Габапентин	Лірика та генерики	Дозування
----------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------



Простий статичний слайд

Інтерактивність:

Істочник:

Дизайн:



## Лірика неврологи

Безпека та Ефективність

Лірика® - зручне сполучення в політерапії, відсутність фармакокінетичної взаємодії з більшістю препаратів<sup>1-8</sup>

13.0

**Лірика® – зручне сполучення в політерапії, відсутність фармакокінетичної взаємодії з більшістю препаратів<sup>1-22</sup>**

- Не метаболізується в печінці
- Не зв'язується з білками плазми
- Не взаємодіє з цитохромом
- Виводиться нирками в незмінному вигляді

<ul style="list-style-type: none"> <li>Діуретики</li> <li>Інсулін</li> <li>Пероральні гіпоглікемічні засоби</li> <li>Оральні контрацептиви</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Карбамазепін</li> <li>Фенобарбітал</li> <li>Габалентин</li> <li>Лоразепам</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Фенітонін</li> <li>Тіагабін</li> <li>Ламотриджин</li> <li>Топірамат</li> <li>Вальпроєва кислота [IMG_0243]</li> </ul>
---	---	--

Пацієнти | Міжнародні рекомендації | **Безпека та Ефективність** | Прегабалін та Габалентин | Лірика та генерики | Дозування

Замінити ссылки на 1-8

Замінити ссылки на 1-8

**Лірика® – зручне сполучення в політерапії, відсутність фармакокінетичної взаємодії з більшістю препаратів<sup>1-22</sup>**

Джерело

- Bandelow B, et al. Guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders, obsessive-compulsive disorder and posttraumatic stress disorder in primary care. Int J Psychiatry Clin Pract. 2012;16(2):77-84. (REF-LYRAS50 - номер не наносити на промі).
- Інструкція по медико-цинському призначенню препарату Лірика® ЛС-001752.
- Data on file. Summary of Clinical Safety for Pregabalin. RR-Reg 720-30196.
- Коліцькая Е.В. Прегабалін в терапії генералізованої соматизованої тривоги. Психічне рас-стройств в общей медицине. 2011; (1).
- Соньков Т.С., Соляков С.А., Дорофеева О.А. Механізми ангіогенеза и терапия тревоги. Психіатрія и психофармакотерапія, 2011; 13 (6).
- Montgomery et al. Efficacy and safety of pregabalin in elderly people with generalised anxiety disorder. The British Journal of Psychiatry. 2008; 193, 389-394.
- Е.М. Крулицький. "Применение антиконвульсантов без назначения врача: синдром зависимости или самолечение". Manage pain. 2016, №2, с.7-10.
- Ben -Menachem E. Pregabalin Pharmacology and its relevance to clinical practice. Epilepsia, 45 (suppl 6):13-18, 2004. [IMG\_0244]

Пацієнти | Міжнародні рекомендації | **Безпека та Ефективність** | Прегабалін та Габалентин | Лірика та генерики | Дозування

Простой статичный слайд

Интерактивность:

Источник:

Дизайн:

# Лірика неврологи

Прегабалін та Габапентин

Прегабалін VS Габапентин

14.0

**Лірика - ефективна та передбачувана відповідь на терапію**

- Доза Лірики 450 мг/добу порівнянна з максимальною дозою габапентину 3600 мг/добу у відношенні зменшення больового синдрому<sup>1</sup>
- При прийомі Лірики досягається **швидкий ефект** терапії вже на стартовій добовій дозі, габапентин потребує тривалої титрації<sup>2</sup>
- Лірика може бути ефективною навіть у пацієнтів, що **рефрактерні до габапентину**<sup>3</sup>
- Відповідь на терапію Лірикою є **дозозалежною**
- Згідно рекомендаціям Американської академії неврології, лише прегабалін є 1-ю лінією терапії ДПН з рівнем доказовості А<sup>4</sup>

Фармакокінетика	Біодоступність	Частота прийому
Прегабалін	Лінійна	≥90%
Габапентин <sup>2,6</sup>	Нелінійна	Знижується при збільшенні дози (900мг-60%, 3600мг-33%)
		2-3 рази на добу
		3 рази на добу

Навігація: Пацієнта, Міжнародні рекомендації, Безпека та Ефективність, **Прегабалін та Габапентин**, Лірика та генерики, Дозування

**Джерело**

1. J. Fudin. How Gabapentin Differs From Pregabalin. Pharmacy Times, 2015. Available at <http://www.pharmacytimes.com/contributor/jeffrey-fudin/2015/09/how-gabapentin-differs-from-pregabalin> станом на 27.02.2019.
2. Wesche D, Bockbrader H, Arbor A. The pharmacokinetic properties of Pregabalin and Gabapentin: differences and similarities. J Pain, 2005;6(suppl 3): 829.
3. K. Jefferies. Treatment of Neuropathic Pain. SEMINARS IN NEUROLOGY. VOLUME 30, NUMBER 4 2010, p. 425-432.
4. Toth C. Substitution of Gabapentin therapy with pregabalin therapy in neuropathic pain due to peripheral neuropathy. Pain Med. 2010;11(3):456-65.

ІМС\_02

**Джерело**

2. Wesche D, Bockbrader H, Arbor A. The pharmacokinetic properties of pregabalin and gabapentin: differences and similarities. J Pain, 2005;6(suppl 3): 829.
3. K. Jefferies. Treatment of Neuropathic Pain. SEMINARS IN NEUROLOGY. VOLUME 30, NUMBER 4 2010, p. 425-432.
4. Toth C. Substitution of Gabapentin therapy with pregabalin therapy in neuropathic pain due to peripheral neuropathy. Pain Med. 2010;11(3):456-65.
5. Brill V, England J, Franklin G.M., et al. Evidence-based guideline: Treatment of painful diabetic neuropathy. Neurology. 2011;76:1-8.
6. Інструкція по медичному застосуванню препарату Тебантин (габапентин) от 07.11.2018

Простий статичний слайд

Інтерактивність:

Істочник:

Дизайн:

# Лірика неврологи

Лірика та генерики

Лірика та генерики/генеричні аналоги 15.0

**ЛІРИКА ТА ГЕНЕРИКИ/ГЕНЕРИЧНІ АНАЛОГИ**

**Оригінальний препарат:**  
 Створений на основі нової, вперше синтезованої або здобутої з природної сировини субстанції  
 Пройшов повний цикл доклінічних та клінічних досліджень з ефективності та безпеки використання  
 Захищений патентом на визначений термін<sup>1</sup>

**2011**  
 Facility of the Year Awards  
 CATEGORY WINNER  
 Sustainability

	Вітчизняний генерик	Лірика
Діюча речовина	Виробництво - Китай <sup>3</sup> Контроль якості при ввозі проводить замовник (виробник) <sup>3</sup>	Виробництво - Сінгапур <sup>4</sup> Обов'язковий аудит виробництва, контроль при ввозі згідно стандартів Європейського союзу (ЕС) <sup>5</sup>
Допоміжні речовини	Целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, магнію стеарат, Тальк <sup>6</sup>	Лактози моногідрат; крохмаль кукурудзяний; тальк; Виробництво згідно вимогам GMP* ЄС <sup>7</sup>
Готовий продукт	Термін придатності - 2 роки <sup>6</sup>	Термін придатності - 3 роки

**Будь-яке відхилення у складі допоміжних речовин може суттєво змінити якість препарату його біодоступність, призвести до токсичних та алергічних проявів<sup>2</sup>.**

\*GMP - належна практика виробництва

Пацієнти | Міжнародні рекомендації | Безпека та Ефективність | Препарати та Габалентин | **Лірика та генерики** | Дозування

**ЛІРИКА ТА ГЕНЕРИКИ/ГЕНЕРИЧНІ АНАЛОГИ**

**Оригінальний препарат:**  
 Джерело: **2011**  
 світої нової, вперше синтезованої або здобутої з природної сировини субстанції

1. H. Badaloni. Генерики и оригинальные препараты: взгляд фармацевта. Аптека онлайн №9(49)(2) от 07.2014
2. J. P. M. de Vries, R. van der Pluijm, General Policy Issues. Generic drugs: the hidden issues of quality and cost. WHO Drug Information 2008; 14(2)
3. Інформація про лікарський засіб Габалентин (реєстраційне посвідчення ВЛ/1189/01/01) від 20.02.2018 на офіційному ресурсі МОЗ України: <http://www.moz.gov.ua>
4. Методи контролю якості на препарат Лірика, затверджені наказом МЗСЗ від 16.04.2016 МСЗ України. PC UA/13702/01/06

**Будь-яке відхилення у складі допоміжних речовин може суттєво змінити якість препарату його біодоступність, призвести до токсичних та алергічних проявів<sup>2</sup>.**

Термін придатності - 2 роки | Термін придатності - 3 роки

Пацієнти | Міжнародні рекомендації | Безпека та Ефективність | Препарати та Габалентин | **Лірика та генерики** | Дозування

**ЛІРИКА ТА ГЕНЕРИКИ/ГЕНЕРИЧНІ АНАЛОГИ**

**Оригінальний препарат:**  
 Джерело: **2011**  
 світої нової, вперше синтезованої або здобутої з природної сировини субстанції

6. Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що виготовляються в Україні ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. № 902 (зі змінами від 7 жовтня 2015 р. № 804)
6. Інструкція з медичного застосування препарату Неогабін UA/13702/01/01, UA/13702/01/02 від 02.11.2018
7. Лірика (GMP сертифікат для виробника видано уповноваженим регуляторним органом України, доступна за посиланням: <http://www.moz.gov.ua>)
8. Facility of the Year Award, доступна за посиланням: <http://www.sustainabilityawards.com>

**Будь-яке відхилення у складі допоміжних речовин може суттєво змінити якість препарату його біодоступність, призвести до токсичних та алергічних проявів<sup>2</sup>.**

Термін придатності - 2 роки | Термін придатності - 3 роки

Пацієнти | Міжнародні рекомендації | Безпека та Ефективність | Препарати та Габалентин | **Лірика та генерики** | Дозування

**ЛІРИКА ТА ГЕНЕРИКИ/ГЕНЕРИЧНІ АНАЛОГИ**

**Оригінальний препарат:**  
 Джерело: **2011**  
 світої нової, вперше синтезованої або здобутої з природної сировини субстанції

- 7 жовтня 2015 р. № 804
6. Інструкція з медичного застосування препарату Неогабін UA/13702/01/01, UA/13702/01/02 від 02.11.2018
7. Лірика (GMP сертифікат для виробника видано уповноваженим регуляторним органом України, доступна за посиланням: <http://www.moz.gov.ua>)
8. Facility of the Year Award, доступна за посиланням: <http://www.sustainabilityawards.com>

**Будь-яке відхилення у складі допоміжних речовин може суттєво змінити якість препарату його біодоступність, призвести до токсичних та алергічних проявів<sup>2</sup>.**

Термін придатності - 2 роки | Термін придатності - 3 роки

Пацієнти | Міжнародні рекомендації | Безпека та Ефективність | Препарати та Габалентин | **Лірика та генерики** | Дозування

Простий статичний слайд

Інтерактивність:

Источник:

Дизайн:



# Лірика неврологи

Лірика та генерики

Дослідження біоеквівалентності<sup>1</sup>

**ЛІРИКА**  
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЕКВІВАЛЕНТНОСТІ<sup>1</sup>

Два лікарських засоби, що містять однакову діючу речовину, вважаються біоеквівалентними, якщо вони є фармацевтично еквівалентними або фармацевтично альтернативними, а їх біодоступність (швидкість та ступінь абсорбції) після введення в однаковій молярній дозі знаходиться в попередньо встановлених критеріях прийнятності.

**Стандартний дизайн дослідження біоеквівалентності:**

- Однократне введення однієї найвищої дози натще
- Дорослим здоровим добровольцям не молодше 18 років
- У кількості не менше 12 осіб
- З індексом маси тіла 18,5-30 кг/м<sup>2</sup> та, бажано, без залежності від психотропних речовин
- Можливий двоетапний набір добровольців при відсутності доведеної біоеквівалентності першого набору
- Порівняльні дослідження профілів розчинення слід провести для перших трьох промислових серій

При дослідженні біоеквівалентності при однократному введенні дози 90% довірчий інтервал для співвідношення досліджуваного та референтного лікарських засобів має бути в діапазоні прийнятності від 80.00% до 125.00%

**Джерело**

1. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ. ДІСЛІДЖЕННЯ БІОЕКВІВАЛЕНТНОСТІ. Настанова СТ-Н МОЗУ 42-7:1-2016

**ЛІРИКА**  
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЕКВІВАЛЕНТНОСТІ<sup>1</sup>

Два лікарських засоби, що містять однакову діючу речовину, вважаються біоеквівалентними, якщо вони є фармацевтично еквівалентними або фармацевтично альтернативними, а їх біодоступність (швидкість та ступінь абсорбції) після введення в однаковій молярній дозі знаходиться в попередньо встановлених критеріях прийнятності.

**Джерело**

1. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ. ДІСЛІДЖЕННЯ БІОЕКВІВАЛЕНТНОСТІ. Настанова СТ-Н МОЗУ 42-7:1-2016

Простой статичный слайд

Интерактивность:

Источник:

Дизайн:

# Лірика неврологи

Лірика та генерики

Пацієнти, які починають терапію Лірикою, демонстрували кращі результати у лікуванні нейропатичного болю порівняно з генериком<sup>1</sup>

16.0



Пацієнти, які починають терапію Лірикою, демонстрували кращі результати у лікуванні нейропатичного болю порівняно з генериком<sup>1</sup>

Оцінка змін вираженості нейропатичного болю між початком та припиненням лікування



🏠	Пацієнти	Міжнародні рекомендації	Безпека та Ефективність	Прегабалін та Габапентин	<b>Лірика та генерики</b>	Дозування
---	----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------

Пацієнти, які починають терапію Лірикою, демонстрували кращі результати у лікуванні нейропатичного болю порівняно з генериком<sup>1</sup>

Оцінка змін вираженості нейропатичного болю між початком та припиненням лікування

Джерело

1. Sicras-Mainar A, Rojas-Gutiérrez J, Perez-Parramio M, et al. Consequences on economic outcomes of generic versus brand-name drugs used in routine clinical practice: the case of treating peripheral neuropathic pain or generalized anxiety disorder with pregabalin. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2019; 19(1), 45-57. doi: 10.1080/14737167.2019.1519399.

Простой статичный слайд

Интерактивность:

Источник:

Дизайн:



## Лірика неврологи

Лірика та генерики


Переключення на дженерики в класі антиконвульсантів призводить до дестабілізації стану та збільшенню кількості небажаних явищ<sup>1</sup>

17.0



Замінити посилку на 1

Замінити посилку на 1



Простий статичний слайд

Переваги оригінальних антиконвульсантів

Решту тексту прибрати, відцентрувати в ясті заголовку до наступних трьох пунктів

Інтерактивність:

Источник:

Дизайн:

# Лірика неврологи

Дозування

Зручність титрування та прийому<sup>1</sup>

18.0

**ЛІРИКА**  
Зручність титрування та прийому

**Зручність титрування та прийому<sup>1</sup>**

Показання	Старт терапії (початкова доза)		Всього на добу	Залежно від індивідуальної відповіді та переносимості препарату пацієнтом								
	Ранок	Вечір		Через 3-7 днів			Ще через 7 днів			Ще через 7 днів		
				Ранок	Вечір	Всього на добу	Ранок	Вечір	Всього на добу	Ранок	Вечір	Всього на добу
Нейропатичний біль	75 мг	75 мг	150 мг	150 мг	150 мг	300 мг	300 мг	300 мг	600 мг	-	-	-
Епілепсія	75 мг	75 мг	150 мг	150 мг	150 мг	300 мг	300 мг	300 мг	600 мг	-	-	-
Генералізований тривожний розлад	75 мг	75 мг	150 мг	150 мг	150 мг	300 мг	150 мг	300 мг	450 мг	300 мг	300 мг	600 мг
Фіброміалгія	75 мг	75 мг	150 мг	150 мг	150 мг	300 мг	150 + 75	150 + 75	450 мг	-	-	-

**Правила нарощування дози і відміна терапії прегабаліном**

- відміна поступово протягом мінімум 1 тижня
- Лірику можна приймати до та після прийому їжі
- Дозу підвищують на основі індивідуальної реакції у відповідь та переносимості у пацієнта
- Допускається частота прийому 3 рази на добу
- Максимальна добова доза – 600 мг

Пацієнти | Міжнародні рекомендації | Безпека та Ефективність | Прегабалін та Габапентин | Лірика та генерики | **Дозування**

Простой статичний слайд

Інтерактивність:

Источник:

**ЛІРИКА**  
Зручність титрування та прийому<sup>1</sup>

**Джерело**

1. Інструкція з медичного застосування препарату Лірика № UA/3753/01/02, UA/3753/01/04, № UA/3753/01/05, UA/3753/01/06, затверджені Наказом МОЗ № 91 від 17.01.2020 р.

• відміна поступово протягом мінімум 1 тижня

- Лірику можна приймати до та після прийому їжі
- Дозу підвищують на основі індивідуальної реакції у відповідь та переносимості у пацієнта
- Допускається частота прийому 3 рази на добу
- Максимальна добова доза – 600 мг

Пацієнти | Міжнародні рекомендації | Безпека та Ефективність | Прегабалін та Габапентин | Лірика та генерики | **Дозування**

Дизайн: