

Презентація

Показникова і Логарифмічна
Функція

Історичні Відомості

Засновники функцій та
графіків

Леонард Ейлер

- Леона́рд Е́йлер (15 квітня 1707, Базель, Швейцарія — 18 вересня 1783), видатний швейцарський математик та фізик, який провів більшу частину свого життя в Росії та Німеччині. Традиційне написання "Ейлер" походить від рос. Леонард Эйлер.
- Ейлер здійснив важливі відкриття в таких різних галузях математики, як математичний аналіз та теорія графів. Він також ввів велику частину сучасної математичної термінології і позначень, зокрема у математичному аналізі, як, наприклад, поняття математичної функції[3]. Ейлер відомий також завдяки своїм роботам в механіці, динаміці рідини, оптиці та астрономії, інших прикладних науках.




Джон Непер

- У ранній молодості, негайно ж після закінчення курсу в Сент-Ендрюського університеті, куди він вступив в 1563 році, Непер зробив подорож по Німеччині, Франції та Італії, з якого повернувся на батьківщину в 1571 році. Поселившись в своєму рідному замку і поженившись в тому ж році, він потім вже ніколи не залишав Шотландії.
- Весь його час було присвячено заняттям богословськими предметами і математикою. За його власними словами, тлумачення пророцтв завжди складало головний предмет його занять, математика ж служила для нього тільки відпочинком.



Вільям Отред

- Отред народився в Ітоні, графство Бекінгемшір (в наші дні - Беркшир), в сім'ї священника. Закінчив Кембріджський університет (1595), після чого до 1608 викладав там. Потім він вибрав духовну кар'єру англійського священника, в 1608 році отримав прихід у Олбері (Albury), недалеко від Лондона, де і провів більшу частину свого життя. Одночасно Отред продовжував займатися математикою, викладав цю науку численним учням і вів інтенсивне листування з видатними математиками того періоду.
- «Всі його думки були зосереджені на математиці, - писав сучасник Отреда, - і він весь час розмірковував або креслив лінії і фігури на землі ... Його будинок був повний юних джентльменів, які приїздили з усіх усюд, щоб повчитися в нього».




Показникова та логарифмічна функції

- Основні властивості показникової функції $y=ax$.

- 1. Область визначення функції ax – множина \mathbb{R} дійсних чисел.

- 2. Область значень функції ax (якщо $a \neq 1$) – множина \mathbb{R}^+ всіх додатних дійсних чисел. Якщо $a=1$, функція ax при всіх x стала: вона дорівнює 1.

- 3. Якщо $a > 1$, функція ax зростає на всій числовій прямій; якщо $0 < a < 1$, функція ax спадає на множині \mathbb{R} .



- Основні властивості логарифмічної функції $y = \log_a x$.

- 1. Область визначення логарифмічної функції – множина \mathbb{R}^+ всіх додатних чисел.

- 2. Область значень логарифмічної функції – множина \mathbb{R} всіх дійсних чисел.

- 3. Логарифмічна функція на всій області визначення \mathbb{R}^+ зростає, якщо $a > 0$ і спадає, якщо $0 < a < 1$.

- Властивості степенів

- Для будь-яких x, y і додатних a і b справедливі рівності:

- $a^0 = 1; a^1 = a;$

- $a^x \cdot a^y = a^{x+y}; a^x : a^y = a^{x-y};$

- $(a^x)^y = a^{xy}; (ab)^x = a^x b^x;$

- Показникові та логарифмічні рівняння

- 1. Показникове рівняння

- $a^f(x) = b^g(x)$ ($a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$)

- рівносильне рівнянню

- $f(x) \log_c a = g(x) \log_c b,$

- де $c > 0, c \neq 1$.

Види рівнянь

- **Розв'язати рівняння**
 - $1/4 \cdot 4x^2 = 8 \cdot (0,5)3x$
 - **Розв'язання**
 - $2 - 2 \cdot (22)x^2 = (2-1)3x;$
 - $2 - 2 \cdot 22x^2 = 23 \cdot 2 - 3x;$
 - $2 - 2 + 2x^2 = 23 - 3x;$
 - $-2 + 2x^2 = 3 - 3x;$
 - $2x^2 + 3x - 5 = 0;$
 - $x_1 = 1; x_2 = -2,5.$
 - **Відповідь: $x_1 = 1; x_2 = -2,5.$**

 - Коренями рівняння
 - $(u(x))f(x) = (u(x))g(x),$
 - є розв'язки мішаної системи
 -
 - і ті значення x , для яких $u(x) = 1$, якщо при цих значеннях визначені $f(x)$ і $g(x)$.
- Розв'язати рівняння
 - $3 \cdot 4x + 2x \cdot 3x - 2 \cdot 9x = 0.$
 - Розв'язання $3 \cdot (2x)^2 + 2x \cdot 3x - 2 \cdot (3x)^2 = 0.$
 - Це є однорідне рівняння. Поділимо ліву і праву частину рівняння на $(3x)^2.$
 - $3 \cdot ((2/3)x)^2 + (2/3)x - 2 = 0$
 - Нехай $(2/3)x = t$, тоді
 - $3 \cdot t^2 + t - 2 = 0;$
 - $t_1 = 2/3; t_2 = -1 < 0$ - стороній корінь
 - $(2/3)x = 2/3;$
 - $x = 1.$
 - **Відповідь: $x = 1.$**

Функції та їх властивості

1. Областю визначення показникової функції $y = a^x$ є множина всіх дійсних чисел. Справді, якщо $a > 0, a \neq 1$, вираз a^x визначений для будь-якого $x, -\infty < x < +\infty$.


2. Показникова функція $y = a^x$ додатна при будь-якому значенні аргументу, тобто $a^x > 0$.

Неважко переконатися в тому, що показникова функція не може ні дорівнювати нулю, ні бути від'ємною, тобто областю її значень є множина всіх додатних чисел $(0; +\infty)$. Справді, a^x може дорівнювати нулю лише тоді, коли $a = 0$, але ми домовилися, що $a \neq 0$. Функція a^x може бути від'ємною лише коли $a < 0$ (і то не для всіх значень x), але ми домовилися розглядати показникову функцію лише коли $a > 0$. А при піднесенні додатного числа a до степеня x з будь-яким дійсним показником завжди матимемо додатне число.

Щоб переконатися в цьому, розглянемо всі можливі випадки:

а) Нехай $x = n$, де n — натуральне число. Тоді $a^x = a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n > 0$ як добуток додатних чисел.

б) Якщо x є дробове додатне число, тобто $x = \frac{m}{n}$, де $\frac{m}{n}$ — нескоротний дріб, то $a^x = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$. Але $a^m > 0$ (умова існування кореня n -го степеня).



Найпростішим показниковим рівнянням є

$$a^x = b, \quad a > 0, \quad b > 0, \quad a \neq 1. \quad (1)$$

Якщо замість x у показнику степеня стоїть деяка функція $f(x)$, то

$$a^{f(x)} = b, \quad a > 0, \quad b > 0, \quad a \neq 1. \quad (2)$$

Загального методу розв'язування показникових рівнянь немає. Можна виділити кілька типів показникових рівнянь і навести схеми їх розв'язування.


Деякі показникові рівняння можна звести до виду (1) або (2) за допомогою основних показникових тотожностей.

Найпоширенішим є спосіб зведення обох частин показникового рівняння до спільної основи. Розглянемо приклади розв'язування рівнянь.


Метод координат - це спосіб визначення положення точки, фігури або тіла за допомогою чисел або інших символів. Числа, за допомогою яких визначається положення точки, називаються координатами.

Перевага методу координат перед системним методом, за якого безпосередньо розглядаються фігури і кожна задача потребує особливого підходу, в його алгоритмічності. Справді, за допомогою методу координат кожна геометрична задача зводиться до алгебраїчної, а алгебраїчні задачі легше алгоритмізувати.

Логарифми та логарифмічні функції



Логарифмічна функція



Логарифмічна функція
комплексної змінної

- Логарифм – з грецької означає “логос”- відношення і “аритмос”- число.
- Його винахід пов’язаний з двома постатями: швейцарцем Іобстом Бюргі(1552-1632), знаним годинникарем і майстром майстром астрономічних інструментів, і шотландцем Джоном Непером (1550-1617), який теж не був математиком за професією, астрономія була його «хобі». А Бюргі працював разом з астрономом Іоганном Кеплером. Саме величезний обсяг необхідних в астрономії обчислень і спонукав Бюргі і Непера шукати шляхів для їх спрощення. 20 років присвятив Непер своїм логарифмічним таблицям, аби, за його словами, «позбутися нудних і тяжких обчислень, відлякують зазвичай багатьох від вивчення математики». Обидва автори прийшли до своїх таблиць незалежно один від одного. Вони склали таблиці так званих натуральних логарифмів. Бюргі працював над таблицями 8 років і видав їх у 1620 році під назвою «Арифметична і геометрична таблиця прогресії». Проте його таблиці не отримали широкого поширення, бо Непер видав свій «Опис дивовижної таблиці логарифмів» на 6 років раніше. Тому і визнали число e неперовим числом.

ЛОГАРИФМИ І ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЯ

ЛОГАРИФМ ЧИСЛА

Означення

Логарифмом додатного числа b за основою a ($a > 0$, $a \neq 1$) називається показник степеня, до якого треба піднести a , щоб одержати b

Властивості логарифмів

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$

ОСНОВНА ЛОГАРИФМІЧНА ТОТОЖНІСТЬ

$$a^{\log_a b} = b, \quad a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0$$

ФОРМУЛИ ЛОГАРИФМУВАННЯ

При $x > 0$, $y > 0$:

$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a x^n = n \log_a x$$

Узагальнення

При $xy > 0$: $\log_a (xy) = \log_a |x| + \log_a |y|$

При $\frac{x}{y} > 0$: $\log_a \frac{x}{y} = \log_a |x| - \log_a |y|$

При $x \neq 0$: $\log_a x^{2k} = 2k \log_a |x|$

ФОРМУЛА ПЕРЕХОДУ ДО ЛОГАРИФМІВ З ІНШОЮ ОСНОВОЮ

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}, \quad a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0, \quad b \neq 1, \quad x > 0$$


Наслідки

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$


$$\log_a b = \log_a b^k$$

ГРАФІК ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ

$a > 1$ (функція зростає)



$0 < a < 1$ (функція спадає)



Функції $y = a^x$ та $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$) — взаємно обернені функції, тому їх графіки симетричні відносно прямої $y = x$

Виконали роботу:
Жадан Олександр,
Коломійчук Діана.