











# Ультразвуковое исследование локтевого сустава



- Санкт-Петербург, государственный медицинский педиатрический университет, Имельбаев А.И.






































































*Hammer BH, et al., Rheumatology  
2009;48:1530–1532*

Эрозии при ревматоидном артрите встречаются у 1 из 10 пациентов с ревматоидным артритом, при этом развиваются в сроки менее чем 6 месяцев от дебюта заболевания. Чаще всего эрозии обнаруживаются на локтевой стороне, дистальной трети локтевой кости под сухожилием локтевого разгибателя запястья.






*Luukkainen et al, Clin Rheumatology 2004*



Выпот в локтевом суставе. При исследовании 50 локтевых суставов у пациентов с ревматоидным артритом выпот в плечелоктевом суставе был выявлен у 17 пациентов с клинически «здоровыми» суставами, в ямке локтевого отростка у 23 пациентов с клинически «здоровыми» локтевыми суставами. 1-выпот, 2-капсула




*De Maeseneer, Invest Radiology 1998; 33:117*






УЗ исследование обладает значительно большей чувствительностью в выявлении выпота, в сравнении с рентгенографией. 1 - выпот, 2 - капсула.















Бурсит локтевой суставной сумки, требуется очень аккуратное исследование с минимальной компрессией сумки, с тем, чтобы не вызвать сдавления мягких тканей и исчезновения скопления жидкости































Ревматоидные узелки, похожи на подагрические тофусы, но отличаются от них за счет более четко определяемых границ, а так же по наличию центральной анэхогенной области некроза в своей структуре.

