


Биохимия почек и мочеобразования

ГУ «Луганский государственный медицинский университет»

Кафедра мед.химии, доц.И.В.Соловьёва




ФУНКЦИИ ПОЧЕК

- 1 - экскреция конечных метаболитов азотистого обмена;
- 2 – экскреция чужеродных веществ;
- 3- экскреция избытка органических и неорганических веществ, попавших с пищей или образовавшихся в ходе метаболизма;
- 4 - поддержание постоянства осмотического давления крови;
- 5 - поддержание ионного баланса организма;
- 6 - поддержание кислотно-основного состояния;
- 7- участие в метаболизме белков, жиров, углеводов;
- 8 - участие в регуляции кровообращения;
- 9 - участие в регуляции объема циркулирующей крови,
- 10 - секреция биологически активных веществ и ферментов;
- 11 - регуляция эритропоэза.

Почки осуществляют воздействие:

- **на углеводный обмен:** в почках интенсивно протекают такие процессы: гликогеногенез и глюконеогенез, тканевое дыхание.
- **на липидный обмен:** синтез фосфолипидов, триглицеридов, активной формы витамина D_3 .
- **на белковый обмен:** синтез креатина, дезаминирование, трансаминирование.
- **гормональная функция** – синтезируется ренин, простагландины, эритропоэтин.



Кровообращение почки:

- через почки проходит до 25% сердечного выброса (1000- 1200 мл/мин),
- давление в капиллярах клубочка около 65-70 мм рт.ст.,
- выносящий сосуд на 30% меньшего диаметра, чем приносящий, что повышает фильтрационное давление.





Нефрон – структурная единица почки

Процесс образования мочи включает:

- фильтрацию, реабсорбцию и секрецию

Схема строения почечной мембраны



- **Эндотелиальные клетки капилляров имеют поры 100-150 нм.**
- **Промежутки между коллагеновыми нитями базальной мембраны примерно 3-7,5 нм.**
- **Система пор подоцитов величиной 5-12 нм.**
- **Суммарное “сито” мембраны капсулы проходимое для веществ, имеющих молекулярную массу менее 5.500.**
- **В норме молекулярная масса 80.000 является абсолютным пределом прохождения частиц через поры.**

Фильтрация

- **Эффективное фильтрационное давление** (ЭФД) является результирующей взаимодействия сил, часть которых выталкивает содержимое крови из капилляров, а другая - препятствует этому. Выталкивающей силой является трансмуральное давление (P_t), обусловленное разницей между гидродинамическим давлением крови клубочка (P_k) и гидростатическим давлением жидкости, находящейся в просвете капсулы ($P_{гк}$), а препятствующей - онкотическое давление крови (P_o):
- **$ЭФД = P_t - P_o$** (мм рт.ст.)
- В обычных условиях ЭФД в начале капилляров равно: $(65 - 15) - 25 = 25$ мм рт.ст. Но по мере выхода некоторой части плазмы крови (вернее безбелковой ее фазы) онкотическое давление возрастает, и

Первичная моча

- У мужчин скорость клубочковой фильтрации (СКФ) около 125 мл/мин, а у женщин - 110 мл/мин из расчета равной площади поверхности тела в 1,73 м³.
- В *фильтрат* поступает примерно 1/5 часть проходящей через почки плазмы. В результате, за сутки образуется 150-180 л фильтрата (первичной мочи).
- Легко подсчитать, что вся плазма крови очищается почками не менее 60 раз в сутки.
- Строение почечного «сита» таково, что в отличие от плазмы крови фильтрат содержит очень мало белков, в то время как другие соединения с мол. массой менее 80.000 находятся здесь практически в той же концентрации.

Отличия первичной мочи от конечной

Конечная моча - около 1% первичной.

Вещество	Концентрация		Клиренс <u>конц. в моче</u> <u>конц. в плазме</u>
	в плазме	в моче	
Na ⁺	142 мекв/л	128 мекв/л	0,9
K ⁺	5	60	12
Cl ⁻	103	134	1,3
Глюкоза	100 мг/дл	0 мг/дл	0
Мочевина	26	1820	70
Мочевая к-та	3	42	14
Креатинин	1,1	196	140
Белок, г/л	около 70	следы	

Реабсорбция

Канальцевая реабсорбция происходит во всех отделах, но механизм ее в разных участках неодинаков. Процессы реабсорбции могут быть ***активными*** или ***пассивными***. Для активного процесса кроме наличия специфических ***транспортных систем*** требуется еще и ***энергия***. Пассивные процессы идут без использования энергии на основе физико-химических закономерностей.

Различается реабсорбция в:


- а) проксимальных канальцах,
- б) петле Генле,
- в) дистальных канальцах,
- г) собирательных трубочках.

Проксимальные каналцы



- Практически полностью реабсорбируются аминокислоты, глюкоза, витамины, белки, микроэлементы. В этом же отделе реабсорбируется около 2/3 воды и неорганических ионов: Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , HCO_3^- .
- Здесь реабсорбируются те вещества, которые необходимы организму для обеспечения его жизнедеятельности, как бы по ошибке попавшие в мочу. Механизм реабсорбции подавляющего большинства указанных выше соединений прямо или косвенно связан с реабсорбцией Na^+ .


Механизмы реабсорбции



Реабсорбция натрия


- Путь активной реабсорбции Na^+ через клетки можно разбить на 3 этапа:
- а) перенос иона через апикальную мембрану эпителиальных клеток канальцев,
- б) транспортировка к базальной или латеральной мембранам,
- в) перенос их через указанные мембраны в межклеточную жидкость, а затем в кровь.
- Основной движущей силой реабсорбции является перенос с помощью **Na, K-АТФазы** (насоса) через базолатеральную мембрану. Это создает в клетках низкую концентрацию **Na**.

Механизм реабсорбции глюкозы и аминокислот




- Глюкоза и аминокислоты реабсорбируются с помощью специфических белков, обеспечивающих их транспорт через апикальную мембрану.
- Из клетки они выходят пассивно по градиенту концентрации, а Na откачивается насосом.
- Далее – в кровь.

Глюкозурия




- При повышении концентрации глюкозы в крови выше 1 ммоль/л (около 1,8 г/л), мощность транспортной системы становится недостаточной для ионной реабсорбции. И во вторичной моче появляются первые следы нереабсорбированной глюкозы.
- До концентрации 3,5 г/л, этот рост не прямо пропорционален, так как еще остаются незадействованными часть транспортеров. Но начиная с 3,5 г/л, выведение глюкозы с мочой становится прямо пропорциональным концентрации ее в крови.
- Полная загрузка мембранных систем реабсорбции глюкозы у мужчин происходит при поступлении 2,08 ммоль/мин (375 мг/мин) глюкозы, а у женщин - 1,68 ммоль/мин (303 мг/мин) при расчете на 1,73 м² поверхности.

Петля Генле




- а) эпителий тонкого нисходящего отдела имеет щелевидные пространства шириной до 7 нм,
- б) чем дальше в мозговое вещество спускается петля, тем выше становится осмотическое давление окружающей межклеточной жидкости (с 300 мосм/л в коре до 1200-1400 мосм/л на вершшке сосочка);
- в) восходящее колено почти непроницаемо для воды;
- г) эпителий восходящего отдела активно, с помощью транспортных систем, выкачивает как натрий, так

Поворотно-противоточный механизм петли Генле




- Вода покидает фильтрат на всем протяжении нисходящего колена, что обеспечивает реабсорбцию здесь около 15-20% ее объема от первичной мочи.
- В связи с выходом воды осмотическое давление мочи постепенно повышается, и своего максимума оно достигает в области поворота петли.
- Гиперосмотическая моча поднимается по восходящему колену, где активно теряет ионы Na^+ и Cl^- , выводимые работой транспортных систем.

Дистальные каналцы



- В дистальные каналцы и собирательные трубочки обычно поступает около 15% объема первичного фильтрата и здесь происходит *факультативная* (зависимая) реабсорбция, обусловленная водной ситуацией организма.
- Она регулируется гормонами – АДГ и альдостероном в зависимости от состояния организма:
- При обезвоживании организма мочи выделяется мало, но она имеет высокую концентрацию экскретируемых продуктов.
- Напротив, при поступлении в организм большого количества воды выводится много

Калий



- Экскреция калия составляет около 10% от профильтровавшегося. Он почти полностью реабсорбируется в проксимальном отделе петли Генле. Но затем K^+ вновь поступает в мочу благодаря работе Na,K -насоса.
- В случае необходимости сохранения K^+ в организме в насосе он заменяется на H^+ .


Слабые органические кислоты и основания

- **Слабые органические кислоты и основания** подвергаются, так же как и мочевины, реабсорбции и секреции. Основой взаимодействия этих процессов является **неионная диффузия**. Данные соединения могут находиться в двух состояниях: **недиссоциированном и диссоциированном**.
- В **недиссоциированном** виде они хорошо растворяются в жирах и поэтому могут легко диффундировать по градиенту концентрации. А вот в **ионизированном** состоянии они значительно хуже проникают через мембраны и поэтому, задерживаясь в фильтрате, поступают во вторичную мочу. Исходя из этого, **реабсорбция и выведение указанных соединений определяется соотношением в моче их диссоциированной и недиссоциированной форм**.

Выведение H^+ и аммиака

- В почках в результате обмена белков образуется мочеви́на и аммиак.
- Аммиак обладает высокой растворимостью в жирах и легко проникает через мембрану в фильтрат. И если его здесь не связать, то он так же легко может вернуться в клетку, а затем и во внеклеточную жидкость. Но в моче протекает реакция связывания аммиака с H^+ благодаря чему аммиак находится в равновесном состоянии с аммонием:
 - $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{NH}_4^+$
- Ион аммония плохо проникает через мембрану и, связываясь с катионами, выделяется с мочой.
- В клетках канальцев имеется высокая активность фермента *карбоангидразы*, благодаря чему здесь из угольной кислоты образуется много H^+ :
- $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$

Секреция



Экскреция мочевины напрямую зависит от скорости мочетока в нефроне.

- **Секреция** - процесс, направленный на активный переход вещества из крови или образующихся в самих клетках канальцевого эпителия в мочу. Она может быть *активной*, то есть, происходит с использованием транспортных систем и энергии (АТФ). В данном случае она совершается против концентрационного или электрохимического градиента.
- **Пассивная секреция** идет по физико-химическим законам.



Мочевина и процесс образования мочи

- Процессы реабсорбции, секреции и экскреции мочевины весьма важны для всего мочеобразования. Они не только обеспечивают выделение мочевины, но и играют особую роль в механизме осмотического концентрирования мочи. Если в наружной зоне мозгового вещества повышение осмолярности обусловлено главным образом накоплением солей натрия, то во внутреннем слое наряду с ними важную роль играет мочевина.
- Наиболее проницаемы для мочевины те участки собирательных трубочек, которые расположены во внутреннем мозговом веществе почки. К тому же проницаемость этих отделов к мочеvine регулируется уровнем *вазопрессина* (АДГ) (стимулятор). Реабсорбируемая здесь мочевина, создавая высокую осмомолярность интерстиция мозгового вещества, влияет на активность реабсорбции воды. Поэтому при питании малобелковой пищей, когда образуется меньше

Регуляция мочеобразования


- Кровоток:
- Миогенная ауторегуляция.
- 1. Сужение сосудов вызывают:
 - *ангиотензин II;*
 - производные арахидоновой кислоты – *тромбоксан, лейкотриен;*
 - и ряд других гормонов.
 - Вазодилататорами обеих сосудов являются *ацетилхолин, дофамин, гистамин, простаглицлин.*
- Мочеобразование:
- *АДГ* (гипофиз) создает условия для реабсорбции воды
- *Альдостерон* - гормон коркового вещества надпочечников – обеспечивает реабсорбцию Na.
- *Натрийуретический гормон* предсердий – обеспечивает снижение реабсорбции Na.

Юкстагломерулярный аппарат (ЮГА) – регуляция почечного кровотока ренином



АДГ

- Образование вазопрессина (АДГ) происходит в гипоталамусе откуда он по нейронам поступает в нейрогипофиз.
- Регулируется образование с помощью осморецепторов, контролирующих осмотическое давление крови.



Физико-химические свойства мочи

- **Объем мочи (диурез)** зависит от количества потребляемой жидкости и составляет в среднем 50-80 % от её объема;
- Суточное количество мочи у здорового взрослого обычно колеблется от 1000 до 2000 мл.
- **Плотность мочи (удельный вес)** может колебаться в широких пределах от 1,002 до 1,040 г/мл.
- **Кислотность мочи** - при смешанном питании моча обычно имеет слабокислую реакцию, рН её составляет 5,5- 6,5;
- Употребление преимущественно мясной пищи приводит к подкислению мочи и рН становится меньше 5; при растительной диете моча подщелачивается и рН может быть более 7;
- Выделение мочи с повышенной кислотностью (*рН равняется 4-5*) наблюдается после выполнения интенсивных физических нагрузок;

Цвет мочи

- В норме моча имеет соломенно-желтую (*слабо желтую*) окраску, которую ей придают, главным образом, пигменты, образующиеся при распаде гемоглобина.
- Интенсивность окраски в значительной мере зависит от плотности мочи;
- Чем выше плотность мочи, тем более насыщенная у нее окраска.

Прозрачность мочи.

- Свежевыделенная моча у здоровых людей, как правило, прозрачна;
- Однако при стоянии возможно помутнение мочи. Поэтому оценку прозрачности следует проводить сразу же после выделения мочи.

Химический состав мочи

- В сутки с мочой из организма выделяется 50-75 г растворенных в ней веществ;
- Химический состав мочи очень разнообразен, в ней обнаружено около 150 разновидностей органических и неорганических соединений.

Патологические компоненты мочи

БЕЛОК

Появление белка в моче в большом количестве носит название *протеинурия*:

- Основной причиной протеинурии является увеличение проницаемости «почечного фильтра», т.е. стенки капилляров сосудистого клубочка и капсулы Шумлянско-Боумена;
- Наблюдается протеинурия часто при болезнях почек и сердечной недостаточности;
- Физические нагрузки, свойственные современному спорту, также вызывают выраженную протеинурию.

ГЛЮКОЗА

- В нормальной моче глюкоза практически отсутствует;
- Однако при некоторых заболеваниях, а также после выполнения тренировочных и соревновательных нагрузок с мочой выделяется повышенное количество глюкозы, даже до нескольких десятков граммов в сутки;
- Это явление называется *глюкозурия*.

КЕТОНОВЫЕ ТЕЛА

- В моче здорового человека содержание кетоновых тел очень мало;
- Выделение с мочой больших количеств кетоновых тел обычно наблюдается тогда, когда в организме для получения энергии вместо углеводов усиленно используются запасы жира.

КРОВЬ

- В моче здорового человека содержание кетоновых тел очень мало;
- Выделение с мочой больших количеств кетоновых тел обычно наблюдается тогда, когда в организме для получения энергии вместо углеводов усиленно используются запасы жира.

Причины гематурии:


- Инфекционные заболевания — гломерулонефрит, пиелонефрит, простатит, уретрит, цистит
- Камни в почках и мочевыделительных путях
- Травмы почек и мочевыделительных путей
- Новообразования почек и мочевыделительных путей
- Рак почек, мочевого пузыря

Макрогематурия



Gross hematuria means blood can be seen in the urine.

Микрогематурия



Microscopic hematuria means blood can be seen only with a microscope.