

Игра для учеников 7 класса

«Лесные секреты»

Подготовила:
учитель биологии МБОУ «Гимназия»
г. Суворова Тульской обл. Пефтеева В.Е.

Волки не дают травоядным сильно размножаться, регулируют их численность.



Барсук – самый крупный и редкий зверь семейства куньих.



Ондатра – полуводное млекопитающее.



Бобры не промокают и не мерзнут даже в ледяной воде.



Зимой мех у лисы становится плотнее, защищая от морозов.



Охота на косуль полностью запрещена.



Бобры заготавливают на зиму тонкие веточки осины или ивы.




Землеройка-бурозубка весит 4-5 граммов.



Снегири и свиристели прилетают к нам зимой в поисках корма. Они любят питаться плодами рябины.



Барсуки рыхлят землю, распространяют семена растений и одновременно уничтожают огромное количество вредителей.



Волки в стае ведут себя очень дружелюбно. В ней каждому отведено свое место и в отношениях царит строгий порядок.



Бобры весят до 30 килограммов



Шишки — любимый зимний корм белок.



Несколько сотен желудей собирает сойка, готовясь к зиме. Она прячет их, а потом не все находит.



Веретеница совершенно безобидна и приносит лишь пользу человеку, во множестве уничтожая различных вредителей.



Лесной хорь приносит пользу истреблением мышевидных грызунов.



Лоси весят до 600 килограммов.



Королёк -самая маленькая птица Европы. Длина его только 8-9 сантиметров, а вес около 6 граммов.



Ондатра была завезена в нашу страну в 1928 году.





Острые копыта лося глубоко рассечены и могут расходиться в стороны. Кожистая перепонка между пальцами не даёт ногам проваливаться в топях.



У стрижей очень длинные крылья, а вот ноги короткие. Если бы стриж сел на землю, то не смог бы взлететь.



Отличаются они по форме хвоста: у городской ласточки (воронка) хвост с короткими концами. А еще и по окраске: у деревенской ласточки (касатки) брюшко желтоватое, а горлышко красно-коричневое.



У русака длинные уши и лапы, хвост его несколько длиннее, чем у всех остальных зайцев, и сверху окрашен в черный цвет.



Кабаны зимой нуждаются в регулярной подкормке.



Кукушки уничтожают гусениц, которых не едят другие птицы.



Вальдшнеп при опасности переносит в лапах своих птенцов в другое место.

