


# Функциональные заболевания желудочно- кишечного тракта у детей

*Доцент кафедры факультетской  
педиатрии ЗГМУ Мазур В.И.*

# План лекции

1. Актуальность
2. Этиология
3. Патогенез
4. Принципы диагностики
5. Принципы лечения и профилактики
6. Заключение



Язык

Зубы

Глотка

Печень


Желчный пузырь

Двенадцатиперстная

кишка

Толстый кишечник

Прямая кишка



Околоушная  
слюнная железа

Подъязычная  
слюнная железа  
Подчелюстная  
слюнная железа

Пищевод


Желудок

Поджелудочная  
железа

Тонкий кишечник

Прямая кишка 3


# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА: Определение



- **Функциональные гастроинтестинальные расстройства – это разнообразная комбинация гастроинтестинальных симптомов без структурных или биохимических нарушений**
- **Функциональные гастроинтестинальные расстройства рассматриваются как психологические нарушения или просто отсутствие органических болезней**

# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА: Определение

- Согласно общепринятому определению к функциональным заболеваниям относят те состояния, когда не удается обнаружить морфологических, генетических, метаболических и иных изменений, которыми можно было бы объяснить наблюдающиеся клинические симптомы



## Внепищеводные симптомы:

- Бронхолегочные – кашель, приступы удушья
- Оториноларингологические - осиплость голоса, сухость в горле, синусит, фарингит
- Стоматологические – кариес, эрозии эмали зуба



# Методы диагностики

## Обязательные инструментальные исследования:

- ФЭГДС
- Биопсия слизистой пищевода при осложненном течении ГЭРБ
- Рентген грудной клетки, пищевода и желудка

# Дополнительные исследования

- 24-часовая внутрипищеводная рН-метрия («золотой стандарт»): увеличение времени рефлюкса (рН менее 4,0 более чем 5% в течение суток) и длительность эпизода рефлюкса (более 5 мин)
- Внутрипищеводная манометрия – с целью оценки функционирования нижнего пищеводного сфинктера, моторной функции пищевода
- УЗИ органов брюшной полости
- ЭКГ

# Лечение

## Цели лечения:

- Купирование симптомов
- Заживление эрозий
- Предотвращение осложнений
- Повышение качества жизни
- Профилактика рецидивов

## Рекомендации по изменению образа жизни:

- Избегать обильного приема пищи, после приема пищи избегать наклонов вперед, горизонтального положения
  - Ограничить употребление: жирных продуктов, алкоголя, кофе, шоколад, цитрусовых, томатов, лука, чеснока, жареных блюд
  - Спать с приподнятым головным концом кровати
  - Поддержание массы тела
  - Не носить тесную одежду, пояса, не поднимать тяжести
- 50

# Медикаментозное лечение

- **Прокинетики** (стимулируют опорожнение желудка) домперидол (мотилиум), метоклопрамид,
- **Антисекреторные препараты (ИПП):** лансопразол, рабепразол, эзомепразол. При неэрозивной ГЭРБ однократно в сутки 4-6 нед, при ззофагите – 2 раза в сутки до 4-8 нед
- **Антациды** (симптоматически для купирования изжоги) 3 раза в день через 40-60 мин после еды
- У детей первых месяцев жизни – **антирефлюксные смеси** (в которых увеличено содержание казеина), содержащих загустители (плода рожкового дерева)





