


Заболевания, передающиеся половым путём.

Шошин Филипп, 11 «Б».

Цели:

- Рассказать о половых заболеваниях и их последствиях.
- Как избежать заражения.
- Что делать, если ты уже заразился.



Сифилис

Сифилис (устар.: люэс) — хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида *Treponema pallidum* (бледная трепонема) подвида *pallidum*, относящимся к роду трепонем (*Treponema*)[1] порядка Спирохеты (*Spirochaetales*).



**ПРЕВРАЩАЕТ
ВОДУ В ВИНО**



**ПРЕВРАЩАЕТ
ЖИЗНЬ В СМЕРТЬ**



**ПРЕВРАЩАЕТ
СВОЙ СИФИЛИС
В ТВОЙ**



Гонорея

Гонорея — это заболевание, передающееся половым путем (ЗППП), которым могут заразиться и мужчины, и женщины. Она может вызвать инфекцию половых органов, прямой кишки и глотки. Это очень распространенная инфекция, особенно среди молодых людей в возрасте 15–24 лет.

Малышева и Триппер. (Малышева справа, в жёлтом)



Спасибо за подписку, а то я уж думал тут два триппера

Могло быть и хуже, например, две Малышевы






Хламидиоз

Хламидиоз — это распространенное заболевание, передающееся половым путем (ЗППП), которое легко поддается лечению. При отсутствии лечения хламидиоз может затруднить наступление беременности у женщины.








Трихомоноз


Трихомоноз (трихомоноз) — это широко распространенное заболевание, передающееся половым путем (ЗППП). Оно возникает из-за заражения простейшим микроорганизмом под названием *Trichomonas vaginalis*. Поскольку симптомы трихомоноза варьируются, большинство зараженных не могут самостоятельно определить у себя наличие этого заболевания.





Как избежать заражения.

секс? это кто(who)



Что делать если ты уже заразился?

Есть семь основных признаков, обнаружив которые, не стоит тянуть с визитом к врачу. Зуд и жжение в интимной зоне. Покраснение в области половых органов и заднего прохода, иногда – язвочки, пузырьки, прыщики. Выделения из половых органов, запах. Частое, болезненное мочеиспускание. Увеличение лимфатических узлов, особенно в паховой области. У женщин – боль внизу живота, во влагалище. Дискомфорт во время полового акта. Однако, например, сифилис или хламидиоз могут проявиться спустя несколько недель после заражения, а иногда ЗППП вообще долгое время могут протекать скрыто, переходя в хроническую форму.



МЫ
ИВАН
ГОЛУНОВ

Спасибо за внимание!
Используйте только
качественные
контрацептивы.