

Лекция 2-4

10.3. Приложения тройных интегралов.

Пусть дано тело V переменной плотности $\gamma(x, y, z)$.
Массу тела M можно вычислить по формуле

$$M = \iiint_V \gamma(x, y, z) dv.$$

1) Статические моменты инерции тела относительно координатных плоскостей Oxy , Oxz , Oyz :

- $M_{xy} = \iiint_V z\gamma(x, y, z) dv, \quad M_{xz} = \iiint_V y\gamma(x, y, z) dv,$

$$M_{yz} = \iiint_V x\gamma(x, y, z) dv.$$

2) Координаты центра тяжести:

$$x_{\text{цм}} = \frac{M_{yz}}{M} = \frac{\iiint_V x\gamma(x, y, z) dv}{\iiint_V \gamma(x, y, z) dv}, \quad y_{\text{цм}} = \frac{M_{xz}}{M} = \frac{\iiint_V y\gamma(x, y, z) dv}{\iiint_V \gamma(x, y, z) dv},$$

$$z_{\text{цм}} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\iiint_V z\gamma(x, y, z) dv}{\iiint_V \gamma(x, y, z) dv}.$$

Если тело однородно, т. е. $\gamma(x, y, z) = \text{const}$, то

$$x_{\text{цм}} = \frac{M_{yz}}{M} = \frac{\iiint_V x dv}{V}, \quad y_{\text{цм}} = \frac{M_{xz}}{M} = \frac{\iiint_V y dv}{V}, \quad z_{\text{цм}} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\iiint_V z dv}{V}.$$

3) Моменты инерции тела относительно

координатных осей:

$$J_x = \iiint_V \gamma(x, y, z) (y^2 + z^2) dv,$$

$$J_y = \iiint_V \gamma(x, y, z) (x^2 + z^2) dv, \quad J_z = \iiint_V \gamma(x, y, z) (x^2 + y^2) dv.$$

4) Центробежные моменты инерции тела:

$$J_{xy} = \iiint_V xy\gamma(x, y, z) dv, \quad J_{xz} = \iiint_V xz\gamma(x, y, z) dv,$$

$$J_{yz} = \iiint_V yz\gamma(x, y, z) dv.$$

5) Полярный момент инерции тела:

$$J_0 = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) \gamma(x, y, z) dv.$$

11. КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ.

11.1. Криволинейный интеграл по длине дуги (1 – го рода).

Дифференциал длины дуги в плоском случае для линии, заданной уравнением $y = y(x)$ равен

$$ds = \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

Дифференциал длины дуги в пространственном случае для линии, заданной уравнениями

$y = y(x), z = z(x)$ **равен** $ds = \sqrt{1 + (y'(x))^2 + (z'(x))^2} dx.$

При параметрическом задании линии

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t)$$

**дифференциал длины дуги в плоском случае
равен**


$$ds = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt,$$

а в пространственном случае -

$$ds = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$

Определение.

- Криволинейным интегралом 1-го рода $\int_K f(x, y) ds$ от функции двух переменных $f = f(x, y)$ (заданной в некоторой связной области), взятым по отрезку $K = \overline{AB}$ плоской кривой (этот отрезок находится в той же области и называется путем интегрирования), заданной своим уравнением, называется число, получаемое следующим образом:



1) Отрезок AB разбивается на n элементарных отрезков произвольно выбранными точками A_1, \dots, A_{n-1} , идущими от начала отрезка $A = A_0$ до его конца $B = A_n$.

2) Внутри (или на границе) каждого элементарного отрезка $A_{i-1}A_i$ выбирается одна произвольная точка M_i с координатами x_i, y_i .

3) Значения функции $f(x_i, y_i)$ в этих выбранных точках умножаются на длины отрезков $A_{i-1}A_i = \Delta s_i$ (эти длины считаются положительными).

4) Все полученные n произведений $f(x_i, y_i) \Delta s_i$ складываются.

5) Вычисляется предел суммы

$$\lim_{\max \Delta s_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta s_i.$$

Если этот предел существует и не зависит от выбора точек A_i, M_i , то он называется криволинейным интегралом 1-го рода

$$\int_K f(x, y) ds = \lim_{\substack{\max \Delta s_i \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta s_i. \quad (\text{А})$$

Аналогично определяется криволинейный интеграл 1-го рода для функции трех переменных $u = f(x, y, z)$, взятый по отрезку K пространственной кривой

$$\int_K f(x, y, z) ds = \lim_{\substack{\max \Delta s_i \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta s_i. \quad (\text{Б})$$

Теорема существования.

- Если функция $f(x, y)$ или $f(x, y, z)$ непрерывна, а кривая на отрезке K непрерывна и имеет непрерывно вращающуюся касательную, то криволинейный интеграл 1-го рода типа (А) или (Б) существует. Т. е. пределы существуют и не зависят от выбора точек A_i, M_i .

Вычисление криволинейного интеграла **1**-го рода.

Оно сводится к вычислению определенного интеграла:

1) Если уравнения пути интегрирования заданы в параметрической форме $x = x(t)$, $y = y(t)$, то

$$\int_K f(x, y) ds = \int_{t_0}^{t_1} f(x(t), y(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt. \quad (\text{А})$$

Для пространственной кривой $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$

$$\int_K f(x, y, z) ds = \int_{t_0}^{t_1} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt. \quad (\text{Б})$$

Здесь значение параметра t_0 берется для точки A , значение параметра t_1 берется для точки B .

Точки A и B выбираются так, чтобы выполнялось неравенство $t_0 < t_1$.


2) Если уравнения пути интегрирования заданы в явном виде $y = y(x)$ для плоской кривой (для пространственной кривой $y = y(x), z = z(x)$), то

$$\int_K f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx, \quad (\text{А})$$

$$\int_K f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x, y(x), z(x)) \sqrt{1 + (y'(x))^2 + (z'(x))^2} dx. \quad (\text{Б})$$

Здесь значение $x = a$ берется для точки A , значение $x = b$ берется для точки B . Точки A и B выбираются так, чтобы выполнялось неравенство $a < b$.

Замечание. Пусть кривая такова, что для заданного x координата y принимает несколько значений, например:



Тогда кривую нужно разбить промежуточными точками на отрезки таким образом, чтобы для каждого отрезка выполнялось взаимно однозначное соответствие между x и y , и интегрировать в сторону увеличения координаты x . Для данного примера криволинейный интеграл 1-го рода примет вид

$$\int_{AB} f(x, y) ds = \int_{AC} f(x, y) ds + \int_{DC} f(x, y) ds + \int_{DB} f(x, y) ds.$$

Приложения криволинейного интеграла 1-го рода.

- 1) Длина криволинейного отрезка K : $L = \int_K ds.$
- 2) Масса неоднородного криволинейного отрезка K переменной плотности $\gamma = \gamma(x, y, z)$:

$$M = \int_K \gamma(x, y, z) ds.$$

Пример.

Вычислить криволинейный интеграл $I = \int_K y ds$, где K

- дуга параболы $y^2 = 2x$ от точки $A(0,0)$
до точки $B(4, \sqrt{8})$.

Удобно задать уравнение параболы в виде $x = \frac{y^2}{2}$ и
вычислять интеграл по координате y .

Производная равна $x' = y$. Интеграл примет вид

$$I = \int_K y ds = \int_0^{\sqrt{8}} y \sqrt{1 + (x')^2} dy = \int_0^{\sqrt{8}} y \sqrt{1 + y^2} dy = \frac{(1 + y^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \Big|_0^{\sqrt{8}} = \frac{26}{3}.$$