Особенности эмоциональных состояний мужчин и женщин в ситуациях оказания стоматологической помощи

Дипломная работа студентки 6 курса заочного отделения Дадажиной Татьяны Васильевны

Научный руководитель: К.пс.н. ст. преподаватель Липина Наталья Владимировна Объект исследования: мужчины и женщины.

<u>Предмет исследования:</u> эмоциональные состояния мужчин и женщин.

<u>Цель:</u> исследовать особенности эмоциональных состояний мужчин и женщин в ситуациях оказания стоматологической помощи.

Гипотеза исследования: существуют различия в эмоциональных переживаниях у мужчин и женщин в ситуациях оказания стоматологической помощи.

Методы исследования:

- 1. метод оценки реактивной (ситуативной) тревожности по Ч.Д. Спилбергеру Ю.Л. Ханину;
- 2. шкала нервно-психического напряжения (T.A. Немчина);
- 3. методика диагностики состояния стресса (К. Шрайнера).

Выборка исследования: 40 человек (20 мужчин и 20 женщин, различного возраста и профессии).

Экспериментальная база исследования: ММУ ГКП № 15 (Самара, ул. Фадеева, 56A).




Рис. 1

Результаты испытуемых по методике реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина




Рис. 2

Результаты испытуемых по шкале нервнопсихического напряжения в обеих группах




Рис. 3
Результаты испытуемых по методике диагностики состояния стресса

Выводы

- 1. Не существует достоверных различий в уровне эмоциональных переживаний мужчин и женщин при оказании стоматологической помощи, то есть большинству мужчин и женщин свойственна умеренная реактивная тревожность, низкая личностная тревожность, умеренное выражение нервно-психического напряжения и средний уровень регуляции в стрессовых ситуациях.
- 2. В процентном соотношении, перед стоматологическим приемом для женщин в большей степени, по сравнению с мужчинами характерны такие проявления эмоций, как личностная тревожность и ситуативная тревожность, нервно-психическая напряженность и стресс,
- **3.** Эмоциональное состояние стоматологических больных в целом характеризуется рядом особенностей: наличием внутренней напряженности, беспокойства и тревоги перед стоматологическим вмешательством.