

РОСЛИНИ ХИЖАКИ

Зробив; учень 6 в класу:
Борейчук Дмитро




непентес

Росте на острові
Мадагаскар, належить до
роду непентес. Поруч із
звичайними листками у
цих рослин розвиваються
і такі, у яких на кінці
вирастають червонуваті,
довгі до 50-70 см,
«глечики» з кришкою
нагорі.



Непентес

Яскраве забарвлення живої судини і солодкий сік, що утворюється по його краях, приваблюють комах. Потрапивши на гладку внутрішню стінку вони падають на дно, де збирається до 2 літрів рідини. Рослина перетравлює комах, а потім вбирає.



Сарраценія

багаторічна болотна
трава - сарраценія,
що належить до
найкрупніших
комахоїдних рослин.



Сарраценія

Її трубчасті листя-судини досягають 70-80 см. Вони також привертають нектаром комах, які падають у воду, зібрану на дні живої судини. Стерчать на його внутрішній стінці і спрямовані вниз волоски заважають комасі вибратися назовні.



Сарраценія



Венерина мухоловка

Венерина мухоловка росте на болотах Північної і Південної Кароліни в США. Овальні половинки листка цієї рослини розташовані під тупим кутом одна до іншої. У них по краях виростають довгі, міцні немов кігті, зубці. На кожній половинці - по три чутливих щетинки.




Венерина мухоловка

Як тільки комаха доторкнеться до них, половинки вмиг закриваються. Пастка сконструйована таким чином, що рослина ловить комаху блискавично і з щільною фіксацією. Тонка щетина на внутрішній стороні аркуша активізується при зіткненні, на протязі 30 секунд відбувається "впізнання" безпосередньо видобутку від інших зовнішніх факторів, наприклад дощова крапля.



Пухирчатка

Але не тільки в
заморських країнах
зустрічаються
рослини-хижаки. У
наших стоячих
водоймах можна
зустріти пухирчатку
утрікулярію.



Пухирчатка

У цієї рослини на листках утворюються бульбашки до 5 мм у діаметрі з отвором, яке закривається зсередини клапаном з волосками. Коли личинка комара, маленький рачок доторкнуться до волосків на кришечці, тварина миттєво засмоктує всередину бульбашки разом з водою. Іноді в полон потрапляють навіть мальки риб і пуголовки. Вони також служать кормом для рослини.



Рослянка

На торф'яних болотах Європи зустрічається невелика, до 20 см заввишки, багаторічна рослина з дрібними листочками, зібраними в прикореневу розетку. Листочки усіяні волосками з прозорими як роса крапельками на кінцях.



РосЯнка



Притягнуте блискучими крапельками комага сяде на листок і вже не зможе з нього злетіти - «роса» являє собою клейку рідину. Волоски немов щупальця схиляються до комасі. Потім виділяється травний сік, який за складом нагадує шлунковий сік тварин.

Росянка

У росянки дуже чутливі листя, вони реагують на вагу комахи всього 0,008 мг! Росянка здатна реагувати не тільки на вагу, але і на продукти тваринного походження: шматочки м'яса, сиру, кісток. Коли їжа переварена, листочок випрямляється, витрушуючи хітинову оболонку, що залишилася від комахи. Випрямляються і волоски, з'являються крапельки соку, листик знову готовий до полювання.



Чому з'явилися рослини - хижаки?

Справа в тому, що вони ростуть у воді, на болотах або бідних ґрунтах, де їм бракує поживних речовин - фосфору, азоту, а також солей натрію, калію, магнію. Ось вони за допомогою всяких хитромудрих капканів, липучок і полюють на дрібних тварин, щоб поповнити свій раціон.

Зараз у світі відомо понад 500 видів рослин-хижаків.



