

МОНГОЛОИДНАЯ РАСА



Монголоидная раса - потомки древней ветви человечества



Представители этой расы обладают прямыми жесткими темными волосами, желтоватым оттенком кожи, карими глазами, выдающимися скулами лица, узким или среднешироким носом с низкой переносицей, умеренно утолщенными губами, а также типичной кожной складкой верхнего века, которая прикрывает слезный бугорок во внутреннем углу глаз. Эта складка называется эпикантусом. Характерным для монголоидов является слабое развитие волосяного покрова. - Читайте подробнее на

Учёные считают, что *первые монголоиды* – это сохранившиеся на далёком севере, за счёт отсутствия конкуренции, единственные представители денисовской ветви человечества, наряду с кроманьонцами и вымершими к тому времени неандертальцами.



↑
неандерталец



↑
кроманьонец

Монголоидная раса по многим признакам и происхождению близка американским индейцам, у которых при этом редко встречается эпикантус, нос выступает сильнее, а общие характеристики монголоидного облика нередко бывают сглаженными. В Азии принято подразделять монголоидную расу на две основные группы – тихоокеанскую и континентальную: вторая отличается от первой более темной кожей, весьма крупным лицом, ортогнатизмом, довольно тонкими губами.

Яркими представителями монголоидной расы являются монголы, поработившие большую часть Евразии в XIII веке.

Классические монголоиды (северная монголоидная раса) – это также калмыки, тувинцы, буряты, якуты. К монголоидам относятся и сибирские татары, которые смешаны с так называемой западносибирской расой. Жители южного Китая, японцы, корейцы относятся южной монголоидной расе, имеющей признаки смешения с австралоидами. У населения Юго-Восточной Азии и Индокитая эта примесь заметна ещё сильнее.

История Все специалисты по антропологии уже не подвергают сомнению близость американоидной и монголоидной рас. Монголоиды-азиаты и американоиды-индейцы имеют много общего. Это проявляется не только во внешнем облике, но и в генетических признаках (МТ-ДНК и Y-хромосомы у них одинаковые). Наблюдается также сходство верований (культ ворона, или культ орла). В некоторых исследованиях также говорится о том, что современная монголоидная раса моложе американоидной расы. Характерных же монголоидов (центральноазиатский тип) отдельные ученые относят к группе самых молодых рас. Вопрос о происхождении восточного ствола в целом (предков индейцев и монголоидов) достаточно сложный. Предполагают, что типичная монголоидная раса сформировалась в Центральной Азии на территории сурового климата. Вариантов ее происхождения много, найти истину предстоит ученым. Инципиентная монголоидность в эпоху неолита появилась в Европе (Баварии). Монголоидная раса отличается лопатовидными резцами, и как раз они были обнаружены у синантропов, которые проживали 420 тысяч лет тому назад. - Читайте подробнее на FB.ru: <http://fb.ru/article/44235/mongoloidnaya-rasa>

Территории контакта с иными расами Это такие зоны как территория Средней Азии, Сибири, Казахстана. Изначально Великая Степь была населена ираноязычными представителями европеоидной расы (скифами), но приблизительно с V века здесь поселяются монголоиды. В Юго-Восточной Азии первоначально проживали австралоиды, но впоследствии на эту территорию проникли монголоиды. Монголоидная раса делится на несколько подрас – североазиатскую, южноазиатскую, арктическую, дальневосточную, американскую. Кроме трех (четырех, по другой классификации) больших человеческих рас с подрасами, еще существуют малые расы, особые, но их происхождение четко не установлено. Предположительно, они могли сформироваться из древних слабо дифференцированных популяций на границе климатических зон (малые расы – переходные), при контактах населения разных рас (малые расы – смешанные), или в результате далеких миграций в непривычные условия проживания, когда нужно было к ним приспособливаться и вырабатывать иные признаки или возрождать те, что были (метаморфозные подрасы).

ПодписатьсяПоделитьсяРассказатьРекомендовать -
Читайте подробнее на

FB.ru: <http://fb.ru/article/44235/mongoloidnaya-rasa>

Монголоиды делятся на 3 ветви (**северные, тихоокеанские, американские**), но, американская значительно противопоставлена первым двум лишь зачаточным проявлением монголоидности.

Северные монголоиды

В Последниковье в Центральной Азии сформировались современные природные зоны Северного полушария, в области высокого давления возникли крупные пустыни планеты, в том числе и Гоби. Специфические особенности внутриконтинентальных пустынь (пыльные бури, обилие яркого света летом, обжигающие морозы зимой) заставило насельников выработать приспособительные морфофизические особенности (эпикантус, узкий разрез глаз, плосколицесть, лицевую стеатопигию [уплощенность] и т.п.). Процесс адаптации заключался в появлении полезных мутаций, которые закреплялись в потомстве. Индивидуумы, лишённые этих полезных приспособительных признаков, постепенно исчезали из популяции. Формировался новый физический тип. Гены, отвечающие за монголоидность, в условиях изоляции стали доминирующими.

голоценовый возраст «типичных» монголоидов подтверждается памятником Чжалайнор (Внутренняя Монголия). Создатели этого памятника имели очень плоское лицо, абсолютно широкое и высокое. Носовые кости выступали слабо, клыковые ямки выражены не резко, предносовые же развиты сильно.

Исходная популяция, которая в Центральной Азии претерпела столь глубокую трансформацию, неизвестна. Черепа из Верхней пещеры близ Пекина (возраст 18 000 лет), несомненно, принадлежавшие человеку разумному, обладают так же ярко выраженными монголоидными особенностями. Мужской череп (№ 101) отличается значительной массивностью коробки, крупными абсолютными размерами. Череп резко **долихокранный** с **огромным продольным диаметром** и умеренной шириной. **Лоб сильно наклонный, надбровье мощное** [примитивные черты], глазницы прямоугольной формы, абсолютно и относительно низкие. Лицо исключительно высокое и в то же время широкое. Но череп отчетливо прогнатный - это явный признак **экваториальной расы**.

Северные монголоиды делятся на **северо-азиатская** и **арктических**:

• **Североазиатская** малая раса - северный вариант большой монголоидной расы. Распространена на большей части **Сибири** и **Центральной Азии**. Характерные черты: низкий широкий череп, крайняя уплощенность большого, высокого и широкого лица, ортогнатизм, большая частота эпикантуса, узкий разрез глазной щели, высокие округлые орбиты, тонкие губы, очень слабый рост волос на лице и теле, цвет волос и глаз светлее, чем у других монголоидов, а кожа **бывает светлее**, чем у северных **европеоидов**, сравнительно низкий рост, коренастое телосложение, выраженная жировая компонента, несколько изогнутые и укороченные ноги.

Североазиатская подраса делится на **центральноазиатскую** и **байкальскую** [**сибирскую** ?] подрасы:

- **Центральноазиатская** малая раса. К ее представителям относятся **монголы КНР** и **МНР**, **калмыки**, **буряты**, **якуты**, **тувинцы**, **хакасы**, **алтайцы**. Отличаются выраженными монголоидными признаками, ростом ниже среднего, крупными размерами лица, умеренной брахикефалией. С 3-4 веков Центральноазиатская раса распространилась из Центральной Азии на запад, где смешалась с различными группами европеоидов [образовав смешанную **южносибирскую** подрасу].
- **Сибирская** [**байкальская** ?] малая раса. Характеризуется темными, прямыми, но часто мягкими волосами, ослабленной (по сравнению с другими монголоидами) пигментацией кожи и радужины глаз, слабым ростом бороды и усов, выраженными монголоидными чертами глазной области (до 60-70% эпикантуса у взрослых), высоким, широким и очень плоским лицом с выступающими скулами, низким переносьем, тонкими губами. Преобладает среди коренного населения **Сибири** к востоку от Енисея (северные эвенки, **эвены**, или **ламуты**, **юкагиры**, некоторые группы **якутов** и **бурят**, **негидальцы** Приамурья и **ороки** Сахалина). Сибирская раса прослеживается на территории Сибири с эпохи неолита [не самая старая].

• **Арктическая** [эскимосоидная] малая раса. Характерны довольно темные волосы и глаза, выступающий узкий нос, долихокефалия. Распространена на крайнем северо-востоке Азии, Северной Америки, в Гренландии. Арктическая раса включает **эскимосов**, **чукчей** и **коряков**. Население Северо-Востока имеет элементы, связанные с древним населением Восточной и **Юго-Восточной Азии**. У чукчей сохранились явные признаки южной расы [!] - большая ширина носа, толстые губы, чаще встречается вогнутая спинка носа. [Ольмекские статуи Юкатана также несут в себе одновременно эскимосские и негроидные черты.]

Тихоокеанские (восточноазиатские) монголоиды

Восточное (тихоокеанское) побережье Азии заселено группами, которые включаются в большую монголоидную расу, но различаются по ряду признаков. Эти различия и легли в основу выделения малых монголоидных рас. Все расовые группы тихоокеанского побережья Азии имеют смешанные монголо-австралоидные черты, что их и объединяет. Их генетическое единство подтверждается и ареальной непрерывностью. Всю приморскую полосу Восточной Азии можно рассматривать как область формирования особой группы монголоидов. Исходным «материалом» послужило изначально австралоидное население южного ([аустрического](#)) миграционного потока. Нет оснований считать этих монголоидов метисами: до сих пор на побережье не найдены останки древних «чистых» монголоидов. Известны только «чистые» австралоиды, пришедшие по берегу Индийского океана, у которых где-то в Восточной Азии возникли монголоидные признаки. Произошло это примерно 20 тыс. лет назад, но еще в неолите Юго-Восточный Китай был заселен людьми [полинезийско-меланезийского](#) [!] типа.

Тихоокеанские монголоиды делятся на дальне-восточных и южно-азиатских:

- **Дальневосточная** малая раса. Цвет кожи смуглый. Глаза темные, как у остальных монголоидов. Волосы прямые, жесткие и очень темные. У взрослых эпикантус встречается от 70 до 95% случаев. Третичный волосяной покров развит слабо. Длина тела средняя или выше средней. Лицо узкое, средней ширины, высокое, плоское. Мозговой череп в горизонтальном сечении небольшой, но высокий. Нос довольно длинный, с прямой спинкой, слабо- или средневыступающий. Значительный процент населения Китая, Кореи, Японии имеет ясно выраженные черты **дальневосточной расы**. Причем, северные [китайцы](#) и [корейцы](#) обладают явными монголоидными чертами (скуластость, жесткие волосы, эпикантус и т.п.). У корейцев более четко, чем у северных китайцев, проявляются черты [южной расы](#) — губы у них толще, ширина носа больше, третичный волосяной покров развит лучше. По этим параметрам [корейцы](#) сближаются с южными китайцами. Что касается современного населения Японии, то оно обладает [смешанным](#) антропологическим типом. По некоторым признакам [японцы](#) сближаются с [айнами](#), которые имеют **веддо-полинезийский** облик (поздний признак), и южными монголоидами (относительно широкий нос, толстые губы, малый рост). В восточноазиатскую группу монголоидов [в особый таксон дальневосточной ветви?] можно включить и [нивхов](#). Наряду с явно монголоидными признаками (сильное развитие эпикантуса, плоское лицо, низкое переносье) у них несомненны и [южные](#): сильное развитие бороды, заметный прогнатизм.
- **Южноазиатская** малая раса. Цвет кожи более темный, чем у **дальневосточной** расы. Есть некоторый процент волнистых волос. Эпикантус встречается реже (20-50%). Лицо менее уплощено и относительно ниже. Губы более толстые, а нос относительно шире. Мозговой череп также небольшой и относительно широкий. Лоб часто имеет выпуклую форму. Длина тела небольшая. Раса широко распространена в странах Южной и [Юго-Восточной Азии](#) [Южный Китай и Индокитай, также, вероятно - Индонезия?].

Американские монголоиды (индейцы)

Американская (американоидная) малая раса. Включает коренное население **Америки (индейцев)**. [Иногда относят к северным монголоидам?] Сочетает монголоидные черты (прямые чёрные волосы, широкие выступающие скулы) с признаками, не свойственными монголоидам (сильно выступающий нос с высоким переносьем, отсутствие эпикантуса). В целом американская раса стоит ближе к монголоидному расовому стволу, обнаруживая особое сходство с древним протомонголоидным типом. Своеобразие американоидной расы объясняется долгим её развитием в изоляции [и сильной примесью европеоидов в начале колонизации Нового Света].


С современными азиатскими монголоидами американоидов роднит желтовато-бурый цвет лица, прямые и очень жесткие волосы, слабый третичный волосяной покров, заметно выступающие скулы, высокие орбиты, очень часто встречающиеся лопатообразные резцы верхней челюсти, эпикантус у детей. С европеоидами их сближают высокое переносье, сильно выступающий нос и отсутствие эпикантуса у взрослых [!]. Большими размерами коренных зубов, большой шириной рта, значительной шириной носа (до 42 мм), наличием небольшого прогнатизма, удлинённостью предплечья индейцы напоминают некоторые варианты **австралоидной расы**. Следовательно, американоиды сохранили в своем облике в разном соотношении признаки всех трех основных человеческих рас. Это характеризует древнего человека, еще слабо дифференцированного в расовом отношении.

Все попытки найти «родственников» индейцев в Азии среди современного населения **Сибири**, и, в частности, **кетов**, не увенчались успехом и, как будто, оставлены за бесперспективностью. Признавая безусловно правильной точку зрения о приходе населения Америки из Азии, тем не менее, мы не можем найти в Сибири предков индейцев не только среди современного населения, но и древнего. Американоиды пришли в Новый Свет в «готовом» виде. Об этом свидетельствует большое сходство в строении черепов современных и древних индейцев [значит, американоиды сформировались в Старом Свете, где затем были ассимилированы кем, где?].

Всех монголоидов можно разделить на две группы: низколицых, формировавшихся на базе **бореальной** (северной) популяции (тапанойды, уральцы и сибирские или таёжные монголоиды) и высоколицых, сформировавшихся на базе **аустрической** (южной) популяции (монголоиды Центральной и дальневосточной Азии, американоиды). Обе группы имеют изначально самостоятельное происхождение.

Народы монголоидной расы





Наиболее важными адаптивными признаками монголоидной расы является отложение жировой клетчатки на лице у детей. Все эти признаки в прошлом имели значение от обморожения, ветра, пыли и солнечного света, который отражался от снега.

«Тихоокеанские монголоиды»



Дальневосточная
малая раса



Южноазиатская
малая раса

Дальневосточная малая

раса



Признаки:

-Кожа смуглая. Глаза темные.
Эпикантус встречается часто.
Третичный волосяной покров очень
слабый. Рост средний или выше
среднего. Лицо узкое, средней
ширины, высокое, плоское. Высокий
мозговой череп.



ЮЖНОАЗИАТСКАЯ МАЛАЯ РАСА



Признаки:

-Цвет кожи темнее, чем у дальневосточной расы. В сравнении с ней эпикантус менее характерен: губы более толстые; нос относительно шире. Череп небольшой и широкий. Лоб выпуклый. Длина тела небольшая. Ареал — страны Южной и Юго-Восточной Азии.

«Северные монголоиды»

```
graph TD; A[«Северные монголоиды»] --> B[Североазиатская малая раса]; A --> C[Арктическая малая раса];
```

Североазиатская
малая раса

Арктическая
малая раса

Североазиатская малая раса



-Цвет кожи более светлый, чем у тихоокеанских монголоидов. Волосы темные и темно-русые, прямые и жесткие. Лицо высокое и широкое, очень плоское. Мозговой череп невысокий. Встречается очень низкое переносье. Част эпикантус. Разрез глаз небольшой. Длина тела средняя и ниже средней. Входит в состав многих коренных народов Сибири (эвенков, якутовы, бурятов).


Арктическая малая раса

-Входит в состав эскимосов, чукчей, американских индейцев, коряков. Пигментация темнее, чем у североазиатской малой расы. Волосы прямые и жесткие. Эпикантус встречается у 50% представителей расы. Нос умеренно выступает. Широкая нижняя челюсть. Сильно развиты костяк и мышцы. Корпус и руки короткие. Грудная клетка округлая.



«Американская раса»

Ареал — обширная территория Америки.
Крупный нос, иногда выпуклый.
Уплощенность лица умеренная.
Эпикантус редок.
Лицо и голова большие.
Массивное тело.





Монголоидная, или азиатско-американская, самая многочисленная раса, которую иногда называют «желтой», она имеет яркие и своеобразные черты, отличающие ее от других рас.

