

Лекарственные препараты , влияющие на миометрий. (Маточные средства).

- Это лекарственные препараты ,
применяемые в акушерской практике

Классификация препаратов.

1. Утеростимулирующие средства:

-препараты задней доли гипофиза:

окситоцин, питуитрин

-простагландины: динопрост,

динопростон

2. Утеротонические средства.

-препараты спорыньи: Эргометрин,
эрготамин, эрготал, метилэргометрин

3. Токолитические средства

-бета-адреномиметики: партусистен,
ритодрин , тербуталин

-гестагенные препараты: прогестерон,
туринал

ОКСИТОЦИН-

- - в/в капельно в 500 мл 5% раствора глюкозы

Вызывает ритмические сокращения матки,
применяется для родостимуляции

- -в/м по 1 мл 2-3 раза в день

Вызывает тонические сокращения,
применяется для остановки маточных
послеродовых кровотечений.

Простогландины - повышают сократимость матки в течении всей беременности. Используют для прерывания беременности в поздние сроки, действие проявляется независимо от степени раскрытия шейки матки. (с 13 по 25 нед.)

Динопрост, Динопростон

Вводятся в специализированных учреждениях

2. Утеротонические средства.

Алкалоиды спорыньи вызывают тонические сокращения матки, пережимание сосудов, остановку маточных кровотечений.

Применяются внутрь, в/м, в/в 2-3 раза в день.

-при маточных кровотечениях

-для субинволюции матки после родов и аборта.

3. Токолитические средства – средства, понижающие тонус и сократительную активность миометрия, используются при угрозе выкидыша и преждевременных родов.

1) -- β -адреномиметики

Улучшают маточно-плацентарное кровообращение

- Партусистен(фенотерол) Ритодрин
Тербуталин

2) Гестагены

Прогестерон

Туринал (Аллиэстренол) таблетки 0,005

-при угрозе выкидыша

1 табл.х3 раза в день-10 дней

1 табл.х2 раза в день-5 дней

1 табл.х1 раз в день 2 недели

При угрозе преждевременных родов.

2 табл.х3 раза в день -7 дней

1 табл.х3 раза в день 7 дней

1 табл.х1 раз в день –до исчезновения симптомов угрозы.