


Патологія видільної системи




Лектор-к.м.н, доц. Пашевін Д.О.

Функції нирок

- Сечоутворювальні
 - осморегулююча
 - волюморегулююча
 - іонорегулююча
 - екскреторна
- Несечоутворювальні
 - регуляція АТ
 - регуляція еритропоезу
 - регуляція згортання крові
 - метаболізм вітаміну D
 - участь в обміні речовин

Процес сечоутворення




1. Фільтрація

Канальцева реабсорбція


Канальцева секреція

Нефрон - структурнофункціональна одиниця нирки


- Нирка здорової людини містить від 800 000 до 1500 000 діючих нефронів



Капсула Шумлянського-Боумена, фенестрований ендотелій. Через нього фільтрується плазма, формуючи первинну сечу (100-120 **ЛІТРІВ** на добу)




Клубочкова фільтрація



Формула Кокрофта-Голта

$$\text{ШКФ} = \frac{1,23(1,05)^x (140 - \text{вік}, p) \times \text{маса, кг}}{\text{Креатинін крові, мкмоль/л}}$$




$$P_H - \pi - P_{\text{fluid}} = \text{net filtration pressure}$$



$$55 \text{ mm Hg} - 30 \text{ mm Hg} - 15 \text{ mm Hg} = 10 \text{ mm Hg}$$

KEY


- P_H = Hydrostatic pressure (blood pressure)
- π = Colloid osmotic pressure gradient due to proteins in plasma but not in Bowman's capsule
- P_{fluid} = Fluid pressure created by fluid in Bowman's capsule



Канальцева реабсорбція



Канальцева секреція - виключно активний транспорт речовин в сечу.



Недостатність нирок - зниження швидкості клубочкової фільтрації, що супроводжується неспроможністю підтримувати гомеостаз

Причини

- Преренальні (зменшення ОЦК, колапс, СН)
- Ренальні (ішемія, запалення, токсичні впливи)
- Постренальні (порушення сечовиведення)

Стадії

- Початкова
- Олігоанурична
- Поліурична
- Одужання



Стадія олігоанурії

Активація ренін-ангіотензинової системи

- У відповідь на зниження АТ/активацію симпатoadреналової системи)
- Порушення реабсорбції На клітинами щільної плями (macula densa)



Стадія поліурії




Хронічна ниркова недостатність


Стадії

- Латентна
- Стадія поліурії (загибель 50% нефронів та більше, ШКФ-30мл/хв та менше)
- Стадія олігоурії (загибель 70% та більше нефронів, ШКФ-10мл/хв та менше)

Патогенез усладненъ ХНН



Chronic kidney disease





Трансплантація нирки- альтернатива гемодіалізу

Зачем тебе почка,




Посттрансплантаційні ускладнення



Гломерулонефрит - дифузне захворювання нирок з переважним імунним ушкодженням клубочків нефронів



Glomerulonephritis



Glomerulonephritis

Non-Proliferative

Proliferative

Minimal Change Glomerulonephritis

Abnormal Podocytes
Seen on Electron Microscopy
Treat with Supportive care
+ Prednisolone
Most respond well

Membranous Glomerulonephritis (MGN)

Thickened Glomerular Basement Membrane
Usually idiopathic
1/3 have chronic MGN
1/3 go into remission
1/3 progress to renal failure

Focal Segmental Glomerulosclerosis

Segments of Glomeruli Develop Sclerosis
Presents with Nephrotic Syndrome
Genetic causes identified
Steroids often ineffective
50% Progress to Renal Failure

IgA Nephropathy

Most common type of GN in adults
Macroscopic haematuria
Appears 24-48hrs post URTI/GI infection
IgA deposits seen in the matrix

Membranoproliferative Glomerulonephritis

Primary (immune mediated)
Secondary (SLE, Hep)
Usually progresses to End Stage Renal Failure

Rapidly Progressive Glomerulonephritis (Crescentic)

Post Infectious Glomerulonephritis

Occurs weeks after URTI
Usually Strep Pyogenes
Supportive treatment
Resolves over 2-4 weeks

Vasculitic Disorders

Goodpastures Syndrome



Autoimmune anti-GBM antibody
Glomerulus & Lung affected
Haematuria & Haemoptysis
Treat with steroids
+/- steroid sparing agents

Wegeners Granulomatosis


Vasculitis
Lungs, Kidney & other organs
c-ANCA +ve
Treat with Steroids
+ Cyclophosphamide

Microscopic Polyangiitis


Small vessel vasculitis
p-ANCA +ve
Treat with long term steroids
+/- cytotoxic agents




GLOMERULAR OR DYSMORPHIC ERYTHROCYTES




Нефротичний синдром - симптомокомплекс ушкодження нирок, що проявляється протеїнурією, гіпоальбумінемією та генералізованими набряками






Нефритичний синдром - симптомокомплекс запального ушкодження нирок, до складу якого входять гематурія, протеїнурія, гіпертензія, азотемія та олігурія

Nephrotic syndrome



Nephritic syndrome






Сечокам'яна хвороба - захворювання видільної системи, що проявляється формуванням конкрементів у сечовивідних шляхах. Вражає до 10% популяції.

- Оксалати (70% і більше випадків уролітіаза)



Недостатність цитрату в сечі (нижче за 350-300 мг/день) – визначальна причина утворення оксалатних каменів



J Am Soc Nephrol. 2015 Dec; 26(12): 3001–3008.

PMCID: PMC4657843

Published online 2015 Apr 8. doi: [10.1681/ASN.2014121223](https://doi.org/10.1681/ASN.2014121223)




Effect of Potassium Citrate on Calcium Phosphate Stones in a Model of Hypercalciuria

Nancy S. Krieger,^{✉*} John R. Asplin,[†] Kevin K. Frick,^{*} Ignacio Granja,[†] Christopher D. Culbertson,^{*} Adeline Ng,[‡] Marc D. Grynpas,[‡] and David A. Bushinsky^{*}




Nephrolithiasis: Composition, frequency, causes

COMPOSITION	FREQUENCY	CAUSES AND MECHANISMS
Calcium oxalate or calcium phosphate	70%–80%	<p>Hypercalciuria High dietary sodium and protein intake Hypercalcemia Idiopathic Chronic metabolic acidosis Low urine volume Chronic dehydration, hot climate with increased water loss Hyperuricosuria High-purine, high-protein diet Gout Hyperoxaluria Low dietary calcium, high-oxalate diet, genetic hyperoxaluria Low urine citrate Chronic metabolic acidosis Renal tubular acidosis Inflammatory bowel disease Idiopathic</p>
Uric acid	10%–15%	<p>Low urine pH, defect in renal ammonium secretion Chronic metabolic acidosis Hyperuricosuria Obesity, metabolic syndrome</p>
Magnesium ammonium phosphate (struvite, infection-related)	10%–15%	<p>Urine infection (urea-splitting bacteria)</p>
Cystine	< 1%	<p>Cystinuria Autosomal recessive disorder of cystine, ornithine, arginine, and lysine</p>
Others Indinavir (Crixivan) Triamterene (Dyrenium)	< 1%	<p>Indinavir is an antiretroviral therapy for HIV Triamterene is a potassium-sparing diuretic used to treat hypertension</p>
Xanthine		<p>Xanthine oxidase inhibitor therapy, eg, allopurinol (Zyloprim), for hyperuricemia or gout</p>

Бактеріальна персистенція в конкрементах



Метаболізм вітаміну D в нирках та його порушення



Kidney Stones

