

БОЛЕЗНИ СЛЕЗНОГО АППАРАТА

Слезный аппарат

- Состоит из:
- 1. слезной железы,
- 2. выводных протоков,
- 3. слезных точек,
- 4. слезных канальцев,
- 5. слезного мешочка,
- 6. слезно-носового канала.



Слезная железа (gl. lacrimalis)

- У всех животных лежит в верхне-наружной части орбиты в fossa fl. lacrimalis отростка лобной кости, вблизи основания верхнего века.
- Железа состоит из двух частей:
 - 1. глазничной, расположенной на глазу,
 - 2. пальпебральной, или орбитальной, обращенной к верхнему своду орбиты.

ВОСПАЛЕНИЕ СЛЕЗНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (Dacryoadenitis)

ЭТИОЛОГИЯ

Инфекционные болезни

Воспаление околоушной железы

Воспаление воздухоносного мешка

Механические повреждения (раны, ушибы,
переломы орбиты)

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- При остром течении:

- Припухлость в верхненаружном углу орбиты
- Отек верхнего века
- Повышение местной температуры
- Болезненность
- Гиперсекреция железы
- Гнойные выделения
- Гиперемия и отек конъюнктивы
- Затруднено движение глазом
- Абсцедирование

- При хроническом течении:

- Плотное безболезненное опухание железы

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

- От абсцесса верхнего века – воспаление по всему протяжению верхнего и нижнего века
- От непроходимости слезоотводящих путей
- От новообразований – прогрессирующая припухлость и отсутствие болезненности

ЛЕЧЕНИЕ

- Новокаино-антибиотиковые блокады
- Введение сульфаниламидных препаратов и мазей с антибиотиками в конъюнктивальный мешок
- При гнойных процессах – оперативное лечение
- Антисептическое лечение

ВОСПАЛЕНИЕ СЛЕЗНОГО МЕШКА (Dacryocystitis)

■ ЭТИОЛОГИЯ

- Воспаление конъюнктивы, слизистой оболочки носа
- Инфекционного происхождения
- Внедрение инородных тел в слезный мешок

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- Слизистая слезного мешка припухает
- Гиперсекреция железы
- Гнойные выделения
- Гиперемия и отек конъюнктивы
- Слабофлюктуирующее припухание на месте слезного мешка
- Болезненность
- Местное повышение температуры

ЛЕЧЕНИЕ

- Этиопатогенетическая терапия
- Антисептическая терапия
- Новокаиотерапия
- Антибиотикотерапия
- При необходимости оперативное лечение – иссечение слезного мешка и слезной железы

Сужение, закупорка и заращивание слезно-носового канала (Stenosis, obturatio et obliteratio cana is naso-lacrimalis)

■ ЭТИОЛОГИЯ

- Воспаление слезно-носового канала
- Воспаление слизистой носового отверстия
- Новообразования
- Перелом слезной и верхнечелюстной костей
- Внедрение инородных тел, гельминтов

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- Непрерывное слезотечение
- Мацерация кожи
- Воспаление слезного мешка и конъюнктивы
- Флюктуирующая припухлость выше места сужения

ЛЕЧЕНИЕ

- Этиопатогенетическая терапия
- Антисептическая терапия (промывание слезно-носового канала)
- При новообразованиях – оперативное лечение

Оперативное лечение при сужении носослезного канала

057



059



060

