

Видеотрансляция операции «Лабиринт ШВ»

Хирург: директор НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева,
Академик РАН Л.А. Бокерия

Пациент В., 62 лет.

Диагноз:

Приобретенный порок сердца. Недостаточность митрального клапана 2 степени

Недостаточность трикуспидального клапана 2 степени

Нарушение ритма сердца. Длительно существующая персистирующая форма фибрилляции предсердия, тахисистолический вариант

ХСН 2А ФК III по NYHA

Данные анамнеза

- Считает себя больным с 2013 года , когда впервые отметил появление одышки при физической нагрузке сопровождающееся учащенным сердцебиением. Неоднократно обращался к кардиологу поликлиники по месту жительства. В декабре 2015 года ночью появилась одышка в покое, учащенное сердцебиение, не купирующийся приемом медикаментов. На следующий день обратился к кардиологу по месту жительства. По ЭКГ зарегистрирована фибрилляция предсердий, экстренно госпитализирован в стационар г. Судак. На фоне медикаментозной терапии отмечал улучшение состояния.
- Проводилась консервативная терапия: верошпирон 50 мг, варфарин 5 мг, беталок
- Направлен в НЦССХ им. А.Н. Бакулева, для проведения оперативного вмешательства лабиринт 3Б.
- В отделении проведено стандартное дооперационное обследование, включавшее: эхокардиографию, чреспищеводную эхокардиографию, компьютерную томографию, коронарографию (коронарные артерии без гемодинамически значимых стенозов).

- Ритм сердца: фибрилляция предсердий с частотой желудочковых сокращений 145 уд/мин

Эхокардиография

- **Левый желудочек:** КСР=3,5 см. КДР=5,2-5,5 см, КДО=132-147 мл. УО=81 мл. ФВ(Teicholtz)=61 %, КСО-51 мл
- **Левое предсердие:** 5.7 X 6.7 см
- **Митральный клапан:** створки подвижные , разнонаправленные, ПМС слегка пролабирует. d фиброзного кольца=33 мм. Степень регургитации=2.
- **Аортальный клапан:** створки уплотнены, кровоток не нарушен. d фиброзного кольца=23 мм. Регургитации нет.
- **Аорта:** d восходящего отдела=32 мм.
- **Трикуспидальный клапан:** подвижные. d фиброзного кольца=38-40 мм. Степень регургитации=2 ст.
- **Заключение:** Дилатация предсердия . Митральная, трикуспидальная регургитация 2 степени. Сократительная способность миокарда ЛЖ сохранена. Атеросклеротические изменения



МРТ сердца с
контрастированием

Объем левого
предсердия 223
мл

Планируется выполнение операции
«Лабиринт III В»