

## Общие черты кишечнополостных.

- Обитают в водной среде
- Тело состоит из двух слоев
- Имеется внутренняя полость
- Лучевая симметрия тела
- Имеют стрекательные клетки
- Насчитывают около 9 тыс. видов



# Кишечнополостные



**Гидроидные**




**Коралловые полипы**



**Сцифоидные**

# Класс гидроидные.




— Небольшое полупрозрачное животное длиной 1 см. Тело имеет цилиндрическую форму.


— Нижний конец — *подшова* — прикрепляется к стеблям, листьям водных растений, к корягам и камням.


— На верхнем конце тела, вокруг рта, имеются 6-12 щупалец.

# Клеточное строение гидры


Тело гидры состоит из двух слоев клеток: наружного – эктодермы и внутреннего – энтодермы. Между ними имеются слабо дифференцированные клетки. Полость называется кишечной. Отсюда и название типа – Кишечнополостные.







# СТРОЕНИЕ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО СЛОЕВ ТЕЛА ГИДРЫ



<b>Название клеток гидры</b>	<b>Функции</b>
<i>Эпителиально-мускульные</i>	<i>Покров тела гидры и движение</i>
<i>Нервные</i>	<i>Раздражимость</i>
<i>Стрекательные</i>	<i>Нападение и защита</i>
<i>Промежуточные</i>	<i>Формирование всех типов клеток</i>
<i>Пищеварительно – мускульные</i>	<i>Сокращение, движение, захват пищи, внутриклеточное пищеварение</i>
<i>Железистые</i>	<i>Выделение пищеварительного сока</i>

# Стрекательная клетка




Рис. 41. Схема строения стрекательной клетки: 1 — ядро; 2 — стрекательная капсула; 3 — чувствительный волосок; 4 — стрекательная нить: свернутая (справа) и выброшенная (слева)

# Питание, дыхание, выделение

— Гидра по образу жизни – хищник, питается мелкими животными, преимущественно рачками.

— Гидра дышит растворенным в воде кислородом.

Органов дыхания у нее нет, и она поглощает кислород всей поверхностью тела, выделяя наружу углекислый газ.

— В процессе жизнедеятельности в клетках образуются вредные вещества, которые выделяются в воду.



# Пищеварение кишечнополостных

- ▶ Внутриклеточное
- ▶ Полостное

Питаются гидры мелкими беспозвоночными животными, которых они ловят щупальцами.

# Размножение.



**Половое**



**Бесполое**

**Почкование – бесполое размножение**






Рис. 42. Бесполое размножение гидры (почкование)



**Гермафродиты – животные, у которых и сперматозонды, и яйцеклетки образуются на теле одного организма. Такие животные, совмещающие в себе признаки и женского, и мужского пола.**



- **Половое** размножение обычно наступает осенью, при недостаточном питании и понижении температуры.
- Половые железы – *годаны* – образуются в виде бугорков в эктодерме.
- Оплодотворение наружное.
- После завершения дробления зародыш одевается оболочкам и перезимовывает.
- Взрослые гидры с наступлением холодов погибают.

# Регенерация




Рис. 44. Регенерация гидры

Регенерация – способность восстанавливать утраченные или поврежденные части тела.

Гидра легко восстанавливает утраченные части тела. Даже сильно израненная, она выживает. Пресноводная гидра способна полностью восстановить свой организм, даже если от нее остается лишь одна восьмая часть тела.

# Классе сцифонидные медузы



Место обитания: моря

**600 видов**




# Схема строения медузы



❖ У большинства медуз тело прозрачно, что обусловлено большим (нередко до 97,5%) содержанием воды в тканях.

❖ Форма тела – ЗОНТИК.

# Раздельнополые




# Коралловые полипы



Наиболее  
многочисленные  
кишечнополостные,  
обитатели морей и  
океанов.

Встречаются как  
одиночные (актинии),  
так и колониальные  
формы.

Характерная особенность полипов - наличие скелета, который может быть известковым или состоять из рогоподобного вещества и располагается внутри тела и снаружи (у актинии он отсутствует).



1 - щупальца,  
ение коралла

- 2 - ротовое отверстие
- 3 - глотка
- 4 - септы
- 5 - подошвенная пластинка
- 6 - чашечка
- 7 - склеросепты, втягивающие мягкие ткани полипа

# Личинки в



- **Размножаются коралловые полипы половым и бесполом путём.**
- **Половые продукты развиваются в энтодерме перегородок. Потомство обычно покидает материнский организм на стадии личинки — планулы, некоторое время плавает, а затем оседает на дно, где прикрепляется и превращается во взрослого полипа.**

## Рост колонии



**Бесполое размножение осуществляется путём почкования. В результате не доведённого до конца почкования полипы образуют колонии.**



Коралловый риф служит местом обитания многих морских животных и растений.

Здесь поселяются другие кишечнополостные, разнообразные моллюски, черви, ракообразные, иглокожие.



от е  
кр  
зв  
ият  
кор





Большой Барьерный Риф, растянувшийся более чем на 2500 километров вдоль восточного побережья Австралии, включает в себя почти 3 тысячи рифов площадью от гектара до 100 км.2 Занесён в список объектов культурного Всемирного наследия.

Выпишите из учебника значение  
кишечнополостных.


# Значение кишечнополостных

- ▶ Пища для рыб, морских черепах.
- ▶ Кишечнополостные поедают планктонных организмов и мелких рыб.
- ▶ Добывание строительного материала из мертвых коралловых рифов.
- ▶ Употребление медуз в пищу.
- ▶ Изготовление ювелирных украшений.
- ▶ Коралловые рифы препятствуют



# Тип Кишечнополостные

Опираясь на рисунок объясните, как функционируют стрекательные клетки у кишечнополостных?



Из каких клеток образуются половые клетки?

# Цианея



# Аурелия



# Корнерот



# Морские перья

