



Депрессивная фаза биполярного аффективного расстройства

Выполнил: Студент 419 группы
лечебного факультета
Попович М.В.

Преподаватель: асс. Кузнецов О.И.

Биполярное аффективное расстройство

Эндогенное психическое заболевание, характеризующееся периодичностью возникновения аффективных нарушений в виде депрессивных и маниакальных состояний с полной их обратимостью и восстановлением психических функций в интермиссию. Имеет наследственную предрасположенность.



Современный взгляд

- БАР – широко распространённое инвалидизирующее хроническое заболевание;
- Начинается в молодом возрасте;
- Имеет серьёзные последствия (длительная нетрудоспособность, риск суицида);
- Затруднение социальной адаптации человека;
- Трудно для диагностики;
- Клиническое ведение пациентов должно быть индивидуальным и пожизненным

Депрессивная фаза

Характеристика депрессивной фазы:

- Гипотимия (сниженное настроение);
- Брадифрения (снижение умственной деятельности)
- Гипокинезия (снижение двигательной активности)
- Гипобулия (снижение воли)

Стадии течения депрессивной фазы

Стадия	Признаки
Начальная	Незначительное ослабление жизненного тонуса; Нерезкое ухудшение настроение; Снижение работоспособности; Трудности с засыпанием, поверхностный сон.
Нарастающая депрессия	Явное угнетение настроение; Присоединение иррациональной тревоги; Значительное ухудшение работоспособности; Моторная и умственная заторможенность; Замедление темпа речи; Стойкая бессонница; Заметное ухудшение аппетита.
Выраженная депрессия	Максимальное развитие депрессивных симптомов; Мучительная патологическая тревога; Интенсивная стойкая тоска; Тихая, замедленная речь; Возникновение депрессивного ступора; Появление бредовых идей самоуничтожения, самообвинения, ипохондрические настроения; Возникновение суицидальных мыслей и действий; Нередко возникают слуховые галлюцинации.
Реактивная	Постепенное ослабление депрессивных признаков с сохранением астении; В редких случаях отмечается незначительное психомоторное возбуждение.

Типичные варианты депрессий

Витальная депрессия

- Тоска и психомоторная заторможенность
- Максимальная выраженность в утренние часы

Апатическая депрессия

- Дефицит побуждений с падением жизненного тонуса;
- Обеднение мимики, монотонность речи, замедленность движений;
- Склонность к самоповреждениям

Анестетическая депрессия

- Отчужденность;
- Наличие болезненной психической нечувствительности




Циркулярные депрессии

Циклотимические депрессии –
признаки депрессии
малозаметны

- Астеногипотимические
- Астенодисфорические
- Адинамические
- Неврастено-ипохондрические
- Простые гипотимические

Простые циркулярные депрессии – подавленное угнетённое настроение, снижение побуждений и воли. Не достигают уровня психоза

Бредовые циркулярные депрессии – сочетание выраженного депрессивного эффекта и депрессивных бредовых идей



Атипичные варианты депрессий

Сенесто-ипохондрические депрессии – аффективные нарушения, вегетативные симптомы, ипохондрические расстройства в форме навязчивой ипохондрии (мысль о соматическом заболевании). Склонность к затяжному течению с относительным постоянством клинической картины.

Депрессии с явлениями навязчивости – навязчивые явления с тягостным аффектом (прим.: страх заболеть неизлечимым заболеванием), может присутствовать депрессивная триада.

БОЛЬ В ГОРЛЕ?



ВЕРОЯТНО РАК!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!