

**Иммунобиологические и
противоопухолевые свойства средств,
полученных из высших грибов
(базидиомикотовых и аскомикотовых) в
норме и при опухолевом росте
(современные данные)**

Профессор Макаренко Александр Николаевич

**Киев, Украина
12 ноября 2016 г.**

- Представители аскомицетовых и базидиомицетовых грибов известны своими лечебными свойствами и авторитетно зарекомендовали себя в восточной медицине. В частности, представители родов *Ganoderma* и *Cordyceps* известны медицине уже более 2000 лет на территории Китая, Кореи и Японии.
- Известно, что ткани данных грибов содержат более 400 различных биоактивных компонентов, среди которых тритерпеноиды, полисахариды, стеролы, стероиды, жирные кислоты, пептиды, обладающие широким спектром фармакологического действия, в том числе активирующие иммуномодуляцию, антиатеросклеротическое, противовоспалительное, обезболивающее, антиканцерогенное, антиоксидантное и противомикробное действия.
- Сегодня препараты на основе данных грибов рекомендованы в качестве альтернативных и вспомогательных средств для лечения лейкозий, гепатитов, диабета и других заболеваний.

Цель исследования

Изучение сравнительной противомикробной, иммуномодулирующей и противоопухолевой активности средств «Хэюань», «Мацутаке», «Хэ Чжун» и «Сян Ци» компании “Merro Int.” (КНР), полученных из высших грибов и некоторых растений.



Торговое название: Хэюань



Кордицепс китайский
(Cordyceps sinensis)



**Трутовик
лакированный**
(Рейши, Линчжи)
(Ganoderma lucidum)

Лечебные и фармакологические свойства полисахаридов гриба **Кордицепса китайского** *(Cordyceps sinensis)*

- Смягчает побочное действие радио- и химиотерапии онкологических заболеваний.
- Иммунологическая регуляция, повышает сопротивляемость организма к развитию различных заболеваний.
- Бактериостатическое действие против нескольких десятков патогенных бактерий: пневмококка, золотистого стафилококка и др.
- Противовоспалительное действие.
- Расширяет просвет кровеносных сосудов, увеличивает кровоснабжение сердца, легких и других органов.
- Регулирует давление крови, понижает уровень сахара в крови.

Лечебные и фармакологические свойства полисахаридов гриба **Рейши** (*Ganoderma lucidum*)

- Улучшение общего состояния и повышение защитных свойств организма.
- Регулирование функций иммунной системы, противоопухолевое действие.
- Улучшение функций дыхательной системы, угнетение сухого кашля, лечение астмы и разжижение мокроты.
- Улучшение сна.
- Нормализация уровня отдельных липидов, а также сахара в крови, профилактика развития атеросклероза.
- Защита клеток сердца и печени от действия патогенных факторов.
- Торможение процессов старения, улучшение состояния кожи и уменьшение образования пигментных пятен

Торговое название: Матсутакэ



Мацутаке
(Tricholoma matsutake)



**Трутовик
лакированный
(Рейши, Линчжи)
(Ganoderma lucidum)**



**Грифола кучерявая
(Мейтаке)
(Grifola frondosa)**

Лечебные и фармакологические свойства
полисахаридов гриба **Мацутаке** (*Tricholoma
matsutake*)

- Противоопухолевое действие.
- Противорадиационное действие.
- Связывание канцерогенных веществ и выведение их из организма.
- Инактивация и выведение из тканей организма вирусов.
- Нормализация нарушенного липидного и углеводного обменов.
- Антиоксидантное действие.
- Противовоспалительное действие.

Лечебные и фармакологические свойства полисахаридов гриба **Мейтаке** (*Grifola frondosa*)

- Торможение или блокирование роста и последующий регресс опухоли.
- Предотвращение метастазирования злокачественных клеток.
- Уменьшение последствий химиотерапии (сохранение уровня лейкоцитов в крови, предупреждение развития иммунодефицита, физической слабости).
- Стимуляция специфических функций клеток иммунной системы.
- Адаптация организма к действию стрессовых факторов.
- Нормализация обмена веществ и нарушенных гормональных процессов.

Торговое название: Хэ Чжун



Лентинус съедобный
(Шиитаке)
(Lentinula edodes)



Ежевик гребенчатый
(Хоу-тоу)
(Hericium erinaceus)



Навозник белый
(Coprinus comatus)

Лечебные и фармакологические свойства полисахаридов гриба **Шиитаке** (*Lentinula edodes*)

- Профилактика и эффективное лечение рака.
- Защита от побочного действия химиотерапии опухолевых заболеваний.
- Увеличение количества Т-лимфоцитов.
- Положительное влияние молекул гриба на организм при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (на олигоглиоциты).
- Нормализация уровня холестерина крови.
- Понижение артериального давления при гипертонической болезни.


Лечебные и фармакологические свойства полисахаридов гриба **Ежевика гребенчатого** *(**Hericium erinaceus**)*

- Предотвращает развитие опухолевых процессов в пищевом канале, рассматривается как фармакоэскорт при лечении рака различных отделов пищевой системы человеческого организма.
- Повышает иммунитет организма, предотвращает утомляемость, понижает уровень липидов крови, используется как эффективное профилактическое средство преждевременного старения.
- Нейтрализация действия соляной кислоты, защита стенок желудка от ее влияния при наличии язвенной болезни, стимулирует регенерацию слизистой оболочки желудка.
- Улучшает кровообращение органов пищевого тракта, стимулирует процессы всасывания в желудке и кишечнике.
- Усиливает перистальтику стенок органов желудочно-кишечного тракта.

Лечебные и фармакологические свойства
полисахаридов гриба **Навозника белого** (*Coprinus
comatus*)

- Предотвращает развитие опухолей и метастазирование клеток.
- Способствует повышению реакций клеточного иммунитета.
- Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, усиливает аппетит.
- Улучшает кровообращение, снижает уровень липидов крови, нормализует артериальное давление.
- Способствует понижению уровня сахара в крови.
- Эффективен при лечении сахарного диабета.

Торговое название: Сян Ци



Лентинус съедобный
(Шиитаке)
(*Lentinula edodes*)



Дереза китайская
(*Lycium chinense*)



Китайский финик
(*Ziziphus jujuba*)

Лечебные и фармакологические свойства веществ

Дерезы китайской (*Lycium chinense*)

- Профилактика развития опухолей.
- Предотвращение развития побочных эффектов химиотерапии и лучевой терапии онкологических заболеваний.
- Предотвращение развития атеросклероза.
- Профилактика состояния хронической усталости.
- Лечение хронического простатита.
- Предотвращение развития и лечение заболеваний печени и почек.
- Лечение гипертонической болезни.
- Улучшение остроты зрения.
- Лечение кашля.

Лечебные и фармакологические свойства веществ **Китайского финика (*Ziziphus jujuba*)**

- Мочегонное действие.
- Седативное действие.
- Стимуляция пищеварения.
- Антидиарейное действие.
- Отхаркивающее и гипотензивное действие.
- Нормализация сердечного ритма.
- Противомикробное и ранозаживляющее действие.

Планируемый инновационный продукт №1



Агарик бразильский
Agaricus blazei



Астрагал
шерстистоцветковый
(Astragalus dasyanthus)



Пория кокосовидная
(Poria cocos
Wolfiporia extensa)

Лечебные и фармакологические свойства полисахаридов гриба **Агарика Бразильского** (*Agaricus blazei*)

- Высокоэффективное лечение и профилактика ряда онкологических заболеваний (злокачественных опухолей).
- Лечение и профилактика доброкачественных опухолей.
- Использование в качестве дополнительного парафармацевтического средства до и после проведения химио- и лучевой терапии злокачественных новообразований.
- Лечение и профилактика поражений печени разного генеза: токсических гепатитов, вирусных гепатитов В, С, D, J, начальных стадий цирроза, жировой дистрофии, гепатозов и других заболеваний.
- Лечение организма в условиях ослабленного или нарушенного иммунитета.

Лечебные и фармакологические свойства веществ

Астрагала шерстистоцветкового (*Astragalus dasyanthus*)

- Используется для лечения доброкачественных (фибромиомы и миомы матки) и злокачественных (рак яичников, молочной железы, желудка, пищевода, шейки матки, печени, кишечника) новообразований.
- Эффективен при лечении хронической сердечной недостаточности.
- Нормализует свертывающую и противосвертывающую функции крови, капиллярный кровоток, расширяет просвет сосудов.
- Повышает диурез.
- Обладает потогонным действием.

Лечебные и фармакологические свойства веществ

Пории кокосовидной (*Poria cocos*)

- Угнетает рост злокачественных клеток.
- Тормозит метастазирование опухолей.
- Обладает мочегонным действием.
- Улучшает циркуляцию крови, обладает противовоспалительным действием, уменьшает боли в суставах и позвоночнике.
- Эффективен при импотенции и повышает сексуальное влечение.
- Эффективен при дисбактериозе, восстанавливает всасывающую функцию кишечника, подавляет рост патогенных бактерий.

Инновационный продукт №2



Лисичка настоящая
(Cantharellus cibarius)

Противогельминтное действие гриба **Лисички настоящей** (*Cantharellus cibarius*)

- Хиноманноза – вещество лисичек, не вызывающее побочного действия или поражения жизненноважных органов человека.
- Действие этого вещества принципиально отличается от синтетических антигельминтных лекарств. Они не отравляют, а внедряются в слизистую оболочку, вызывая нейротоксическое влияние на нервную систему гельминтов.
- Хиноманноза блокирует нервные центры гельминтов, нарушая синаптическую передачу нервных импульсов в ЦНС.
- Хиноманноза оказывает перфоративное действие, то есть частично растворяет оболочки яиц глистов, уничтожая многочисленные кладки яиц гельминтов в макроорганизме.

Лечебные и фармакологические свойства веществ гриба **Лисички настоящей (*Cantharellus cibarius*) №1**

- Противоопухолевое действие
- Антиоксидантная активность вследствие захвата свободных радикалов и хелатирования железа.
- Антимутагенное действие.
- Антигипоксическая активность.
- Гепатопротекторное действие благодаря наличию в составе лисички эргостерола, нормализует ферментативную активность клеток печени.
- Улучшает зрение благодаря наличию каротина
- Противовоспалительное действие


Лечебные и фармакологические свойства веществ гриба **Лисички настоящей (*Cantharellus cibarius*) №2**

- Инсектицидная активность.
- Антигельминтное действие независимо от типа гельминта.
- Противогрибковая активность в отношении низших грибов.
- Противомикробное действие за счет наличия антибиотиков растительного происхождения.
- Противовирусная активность (влияние на вирус гепатита благодаря высокому содержанию траметонолиновой кислоты).

Материалы и методы собственных исследований


1. Изучалось противомикробное действие исследуемых средств 1) Кордицепс китайский + Трутовик лакированный; 2) Мацутаке + Трутовик лакированный + Грифола курчавая; 3) Шиитаке + Ежевик гребенчатый + Навозник белый; 4) Шиитаке + Дреза китайская + Китайский финик.
2. Оценивалась **минимальная ингибирующая концентрация** этих средств при действии на условно-патогенные микроорганизмы (золотистый стафилококк, синегнойная палочка, Клебсиелла пневмонии и Кишечная палочка).
3. Изучалась реакция органов иммунной системы животных при перевивании карциномы Эрлиха с использованием высших грибов на мышах линии Balb/c (по 10 животных, 10 опытных групп). Средний вес мышей составлял 18-20 г. Оценку реакции иммунной системы проводили с помощью иммунологических методов исследования:
 - **НСТ-тест** – влияния на кислород-зависимый метаболизм перитонеальных макрофагов (уровень RO_2).
 - Определения **относительной массы лимфоидных органов.**
 - Определения **относительной клеточности лимфоидных органов.**
4. Установлена динамика роста опухоли и выживаемость животных.

Золотистый стафилококк (*Staphylococcus aureus*)




Вызывают развитие гнойных воспалительных процессов и заболеваний органов и тканей человека.

Синегнойная палочка (*Pseudomonas aeruginosa*)




Вызывают развитие абсцессов, ассоциированы с развитием энтеритов и циститов в условиях вторичного иммунодефицита.

Клебсиелла пневмонии (*Klebsiella pneumoniae*)



Вызывают развитие пневмоний, урогенитальных инфекций, абсцессов печени, селезенки, гнойных и фиброзных плевритов, перикардитов, гайморитов и эндофтальмитов.

Кишечная палочка (*Escherichia coli*)




Некоторые серотипы *E. coli* вызывают развитие острых и хронических инфекционных заболеваний (гастроэнтеритов, перитонитов, кольпитов, простатитов и сепсиса).

Определение минимальных ингибирующих концентраций для высших грибов

Культуры микроорганизмов	Кордицепс китайский + Трутовик лакированный	Мацутаке+Трутовик лакированный+Грифола курчавая	Шиитаке+Ежевик гребенчатый+Навозник белый
	<i>МИК,</i> МГ/МЛ	<i>МИК,</i> МГ/МЛ	<i>МИК,</i> МГ/МЛ
Стаф.	>0,01-1,0	>0,01-1,0	>0,01-1,0
Синегн. палочка	>1,0	>1,0	>1,0
Клебсиелла	>1,0	>1,0	>1,0
Кишеч.	>1,0	>1,0	>1,0


Примечание: В опытах использовались концентрации веществ грибов от 0,01 до 1 мг/мл.

Воздействие высших грибов на среднюю продолжительность жизни животных-опухоленосителей




2 – контрольные животные-опухоленосители; 3 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «Кордицепс китайский + Трутовик лакированный»; 4 – животные опухоленосители, которым давали грибы «Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая»; 5 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «(Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая) + (Шиитакэ + Ежевик гребенчатый + Навозник белый)»; 6 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «(Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая) + (Шиитакэ + Дереза китайская + Китайский финик)».

Оценка воздействия применения высших грибов на кислород-зависимый метаболизм перитонеальных макрофагов мышей




1 – интактные животные 2 – контрольные животные-опухоленосители; 3 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «Кордицепс китайский + Трутовик лакированный»; 4 – животные опухоленосители, которым давали грибы «Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая»; 5 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «(Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая) + (Шиитакэ + Ежевик гребенчатый + Навозник белый)»; 6 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «(Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая) + (Шиитакэ + Дереза китайская + Китайский финик)».

Оценка реакции лимфоузлов мышей с карциномой Эрлиха на применение высших грибов




1 – интактные животные 2 – контрольные животные-опухоленосители; 3 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «Кордицепс китайский + Трутовик лакированный»; 4 – животные опухоленосители, которым давали грибы «Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая»; 5 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «(Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая) + (Шиитакэ + Ежевик гребенчатый + Навозник белый)»; 6 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «(Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая) + (Шиитакэ + Дреза китайская + Китайский финик)».

Оценка реакции тимусов мышей с карциномой Эрлиха на применение высших грибов




1 – интактные животные 2 – контрольные животные-опухоленосители; 3 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «Кордицепс китайский + Трутовик лакированный»; 4 – животные опухоленосители, которым давали грибы «Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая»; 5 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «(Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая) + (Шиитакэ + Ежевик гребенчатый + Навозник белый)»; 6 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «(Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая) + (Шиитакэ + Дереза китайская + Китайский финик)».

Оценка реакции массы и клеточности селезенок мышей с карциномой Эрлиха на применение высших грибов



1 – интактные животные 2 – контрольные животные-опухоленосители; 3 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «Кордицепс китайский + Трутовик лакированный»; 4 – животные опухоленосители, которым давали грибы «Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая»; 5 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «(Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая) + (Шиитакэ + Ежевик гребенчатый + Навозник белый)»; 6 – животные-опухоленосители, которым давали грибы «(Мацутакэ + Трутовик лакированный + Грифола курчавая) + (Шиитакэ + Дереза китайская + Китайский финик)».

Оценка динамики роста опухоли при использовании высших грибов



- 2 Контрольные животные-опухоленосители
- 1 Опухоль+Кордицепс китайский+Трутовик лакированный
- 3 Опухоль+Мацутаке+Трутовик лакированный+Грифола курчавая
- 4 Опухоль+(Мацутаке+Трутовик лакированный+Грифола курчавая)+(Шиитаке+Ежевик гребенчатый+Навозник белый)
- 5 Опухоль+(Мацутаке+Трутовик лакированный+Грифола курчавая)+(Шиитаке)
- 6

Воздействие грибов на опухоли из определенного зародышевого пласта (цифрами показано количество типов опухолей)


№ п/п	Название гриба	Зародышевый листок		
		Эктодерма	Мезодерма	Энтодерма
1	Агарик бразильский	2	4	1
2	Кордицепс китайский	1	1	2
3	Трутовик лакированный	-	4	2
4	Грифола курчавая	4	5	4
5	Шиитаке	2	2	4

ВЫВОДЫ 1

1. Полисахариды высших грибов не обладают прямым антибактериальным действием в отношении тест-культур микроорганизмов (Синегнойная палочка, Золотистый стафилококк, Клебсиелла пневмонии, Кишечная палочка) *in vitro*.
2. Наибольшее влияние на стимулированный кислород-зависимый метаболизм оказывали грибы «Кордицепс китайский+Трутовик лакированный» и «Мацутаке+Трутовик лакированный+Грифола курчавая», увеличивая этот показатель относительно контроля опухоленосителей в 1,3 и 1,2 раза соответственно.
3. Наиболее эффективное влияние на лимфоузлы осуществляли грибы «Мацутаке+Трутовик лакированный+Грифола курчавая», которые приводили к снижению относительного веса лимфоузлов и к повышению относительной клеточности органов.
4. Наиболее выраженное влияние на показатели относительной массы и клеточности селезенок осуществляли грибы «Мацутаке+Трутовик лакированный+Грифола курчавая», которые вызывали повышение относительной массы селезенок по сравнению с контролем опухоленосителей в 1,3 раза.

ВЫВОДЫ 2

5. Наиболее эффективным противоопухолевым средством при проведении исследования оказался «Мацутакэ+Трутовик лакированный+Грифола курчавая», который повышал относительную массу тимусов относительно контроля опухоленосителей в 4,7 раза.
6. Среди исследованных комбинаций грибов наиболее эффективными по показателю угнетения роста опухоли «карциномы Эрлиха» оказались «Мацутакэ+Трутовик лакированный+Грифола курчавая», «Кордицепс китайский+Трутовик лакированный» и комбинированное применение грибов «(Мацутакэ+Трутовик лакированный+Грифола курчавая)+(Шиитаке)», и «Кордицепс китайский+Трутовик лакированный».
7. Следующее исследование противоопухолевого действия высших грибов будет проводиться с комбинированным использованием грибов «Мацутакэ+Трутовик лакированный+Грифола курчавая» и «Кордицепс китайский+Трутовик лакированный» в комбинации с Бразильским Агариком.



Спасибо за внимание!