


Место метода ЭКГ в диагностике заболеваний сердца

Подготовил: Чалышкан К.
Группа: ВОП – 756
Приняла: Абдушукурова Г.

Общий вид сердца спереди:




1-перикард;

**2 — верхняя
полая вена;**

3 — аорта;

**4 — легочные
артерии**

Клапанный аппарат сердца



**1—митральный
клапан;**

**2—аортальный
клапан;**

**3-клапан легочной
артерии;**


**4— трикуспидальный
клапан**




Анализ ЭКГ

- Ритм
- Положение ЭОС
- Частота сердечных сокращений в минуту: $60/RR$ (сек).
- Количественная и качественная характеристика зубцов и интервалов по стандартному отведению, зубца Р и QRS во всех отведениях
- Отклонение сегмента R-ST от изолинии и изменение зубца Т.
- Заключение по ЭКГ.

Схема расположения и полярности 12 отведений, общепринятых в клинической электрокардиографии.



Определение ЭОС



а — отклонение вправо ($\alpha = +90^\circ \dots +120^\circ$);


б — вертикальное направление ($\alpha = +70^\circ \dots +90^\circ$);

в — нормальное направление ($\alpha = +30^\circ \dots +69^\circ$);

г — горизонтальное направление ($\alpha = +29^\circ \dots 0^\circ$);

д — отклонение влево ($\alpha = 0^\circ \dots -90^\circ$).

Нормальная ЭКГ



Зубцы ЭКГ: зубец Р

- 1. В норме в отведениях I, II, aVF, V2—V6 зубец Р всегда положительный.
- 2. В отведениях III, aVL, V1 зубец Р может быть положительным, двухфазным, а в отведениях III и aVL иногда даже отрицательным.
- 3. В отведении aVR зубец Р всегда отрицательный.
- 4. Продолжительность зубца Р не превышает 0,1 с, а его амплитуда — 1,5—2,5 мм.
- Интервал Р-Q (P-R) 0,12-0,20 с.



Зубец Q

- При наличии зубца Q его глубина не должна превышать $\frac{1}{4}$ зубца R в этом же отведении
 - Продолжительность не более 0,03 с.
- 

Зубец R

- 1. В норме зубец R может регистрироваться во всех стандартных и усиленных отведениях от конечностей. В отведении aVR зубец R нередко плохо выражен или отсутствует вообще.
- 2. В грудных отведениях амплитуда зубца R постепенно увеличивается от V1 к V4, а затем несколько уменьшается в V5 и V6. Иногда зубец rV1, может отсутствовать.
- 3. Зубец RV 1 V 2 отражает распространение возбуждения по межжелудочковой перегородке и правому желудочку, а зубец RV4 V5 V6 — по мышце левого и частично правого желудочков.
- 4. Интервал внутреннего отклонения в отведении V1, не превышает 0,03 с, а в отведении V6 — 0,05 с.

Зубец S

- 1. У здорового человека амплитуда зубца S в различных электрокардиографических отведениях колеблется в больших пределах, не превышая 20 мм.
- 2. При нормальном положении сердца в грудной клетке в отведениях от конечностей амплитуда -S мала, кроме отведения aVR.
- 3. В грудных отведениях зубец S постепенно уменьшается от V1 V2 до V4, а в отведениях V5, V6 имеет малую амплитуду или отсутствует совсем.
- 4. Равенство зубцов R и S в грудных отведениях («переходная зона») обычно регистрируется в отведении V3, или (реже) между V2. и V3, или V3, V4.



Зубец Т


- 1. В норме зубец Т всегда положительный в отведениях I, II, aVF, V2-V6. причем $T_I > T_{II}$, а $T_{V6} > T_{V1}$
- 2. В отведениях III, aVL и V1 зубец Т может быть положительным, двухфазным или отрицательным.
- 3. В отведении aVR зубец Т в норме всегда отрицательный




Сегмент RS-T

- 1. Сегмент RS—T у здорового человека в отведениях от конечностей расположен на изолинии ($\pm 0,5$ мм).
- 2. В норме в грудных отведениях V1—V3 может наблюдаться небольшое смещение этого сегмента RS—T вверх от изолинии (не более 2 мм), а в отведениях V456 — вниз (не более 0,5 мм).

Синусовый ритм




Предсердный ритм



Характеризуются, наличием отрицательных зубцов P11 P111 и следующих за ними неизмененных комплексов QRS.


Ритм из AV-узла



А- среднеузловой отсутствием на ЭКГ зубца P, сливающегося с обычным неизменным комплексом QRS, либо


Б- из нижней части AV-узла наличием отрицательных зубцов P, расположенных после обычных неизменных комплексов QRS

Идеовентрикулярный ритм




ЧСС=45 в минуту, зубец P не определяется, комплекс QRS резко деформирован, уширен, конечная часть ST—T дискордантна по отношению к QRS, ритм имеет желудочковое происхождение.

Предсердная Э/С




- 1) преждевременное внеочередное появление зубца P' и следующего за ним комплекса QRST
- 2) деформация или изменение полярности зубца P' экстрасистолы;
- 3) наличие неизмененного экстрасистолического желудочкового комплекса QRST, похожего по форме на обычные нормальные комплексы QRST синусового происхождения;
- 4) наличие после предсердной экстрасистолы неполной компенсаторной паузы.

Узловая Э/С



- 1) Появление преждевременное неизмененного желудочкового комплекса QRS' похожего по форме на остальные комплексы QRST синусового происхождения;
- 2) отрицательный зубец P' в отведениях II, III и aVF после экстрасистолического комплекса QRS' или отсутствие зубца P' (слияние P' и QRS')
- 3) наличие неполной компенсаторной паузы.

Желудочковая Э/С




- 1) преждевременное внеочередное появление на ЭКГ измененного желудочкового комплекса QRS'
- 2) значительное расширение и деформация экстрасистолического комплекса QRS'
- 3) расположение сегмента RS—T и зубца T экстрасистолы дискордантно направлению основного зубца комплекса QRS'
- 4) отсутствие перед желудочковой экстрасистолой зубца P
- 5) наличие в большинстве случаев после желудочковой экстрасистолы полной компенсаторной паузы.

Мерцание предсердий



- 1) отсутствие во всех электрокардиографических отведениях зубца P
- 2) наличие на протяжении всего сердечного цикла беспорядочных волн f, имеющих различную форму и амплитуду. Волны f лучше регистрируются в отведениях V1 V2, II, III и aVF.
- 3) нерегулярность желудочковых комплексов QRS — неправильный желудочковый ритм (различные по продолжительности интервалы R— R).
- 4) наличие комплексов QRS, имеющих в большинстве случаев нормальный неизменный вид без деформации и уширения.

Трепетание предсердий



- 1) наличие на ЭКГ частых — до 200—400 в минуту — регулярных, похожих друг на друга предсердных волн F, имеющих характерную пилообразную форму (отведения II, III, aVF, V1 V2);
- 2) в большинстве случаев правильный, регулярный желудочковый ритм с одинаковыми - интервалами F—F (за исключением случаев изменения степени атриовентрикулярной блокады в момент регистрации ЭКГ);
- 3) наличие нормальных неизменных желудочковых комплексов, каждому из которых предшествует определенное (чаще постоянное) количество предсердных волн (2:1, 3:1, 4:1 и т. д.).



Трепетание желудочков

Основным электрокардиографическим признаком трепетания желудочков является наличие на ЭКГ частых (до 200—300 в минуту) регулярных и одинаковых по форме и амплитуде волн трепетания, напоминающих синусоидальную кривую.





Фибрилляция желудочков


При мерцании (фибрилляции) желудочков на ЭКГ регистрируются частые (от 200 до 500 в минуту), но нерегулярные волны, отличающиеся друг от друга различной формой и амплитудой





Гипертрофии отделов сердца


Гипертрофия правого предсердия



Гипертрофия правого предсердия

- 1) в отведениях II, III, aVF зубцы P высокоамплитудные с заостренной вершиной (P-pulmonale);
- 2) в отведениях V2 зубец P (или по крайней мере его первая — правопредсердная — фаза) положительный с заостренной вершиной.
- 3) в отведениях I, aVL, V5,6 зубец P низкой амплитуды, а в aVL может быть отрицательным (непостоянный признак);
- 4) длительность зубцов P не превышает 0.10 с.л



Гипертрофия левого предсердия



Гипертрофия левого предсердия

- 1) раздвоение и увеличение амплитуды зубцов P1, II, aVL, V5,6 (P-mitrale);
- 2) увеличение амплитуды и продолжительности второй отрицательной (левопредсердной) фазы зубца P в отведении V1, (реже V2) или формирование отрицательного зубца PV1
- 3) отрицательный или двухфазный (+—) зубец P111 (непостоянный признак);
- 4) увеличение общей длительности (ширины) зубца P — более 0,1 с.



Гипертрофия левого желудочка



Гипертрофия левого желудочка

- 1) увеличение амплитуды зубца R в левых грудных отведениях (V5, V6) и амплитуды зубца S в правых грудных отведениях (V1, V2). При этом $R_{V4} < R_{V5}$ или $R_{V4} < R_{V6}$; $R_{V56} > 25$ мм или $R_{V56} + S_{V1} > 35$ мм (на ЭКГ лиц старше 40 лет) и > 45 мм (на ЭКГ молодых лиц);
- 2) признаки поворота сердца вокруг продольной оси против часовой стрелки: смещение переходной зоны вправо, в отведение V2, исчезновение зубцов S в левых грудных отведениях (V5, V6);
- 3) смещение электрической оси сердца влево.
- 4) смещение сегмента RS—T в отведениях V5,6, I, aVL ниже изолинии и формирование отрицательного или двухфазного (—+) зубца T в отведениях I, aVL и V5,6;
- 5) увеличение длительности интервала внутреннего отклонения QRS в левых грудных отведениях (V5, V6) более 0,05

Гипертрофия правого



Гипертрофия правого желудочка


- 1) смещение электрической оси сердца вправо (угол α более $+100^\circ$);
- 2) увеличение амплитуды зубца R в правых грудных отведениях ($V1,2$) и амплитуды зубца S в левых грудных отведениях ($V5,6$). При этом количественными критериями могут являться: амплитуда $RV1 > 7$ мм или $RV1 + SV5,6 > 10,5$ мм;
- 3) появление в отведении $V1$ комплекса QRST типа rSR' или QR
- 4) смещение переходной зоны влево, к отведениям $V5—V6$.
- 5) смещение сегмента RS—T вниз и появление отрицательных зубцов T в отведениях III, aVF, $V1,2$;
- 6) увеличение длительности интервала внутреннего отклонения в правом грудном отведении ($V1$) более 0,03 с.



Нарушение проводимости




Проводящая система сердца




1—синусовый узел; 2— тракт Бахмана— верхний межузловой тракт; 3— тракт Торелля—задний межузловой тракт; 4— тракт Венкебаха— средний межузловой тракт; 5— атриовентрикулярное соединение; 6—ствол Гиса; 7—правая ножка пучка Гиса; 8— передняя ветвь левой ножки пучка Гиса; 9—задняя ветвь левой ножки пучка Гиса; 10— волокна Пуркинье; 11—правый пучок Кента; 12—левый пучок Кента

AV- блокада I-степени




увеличение продолжительности интервала P-Q(R) более 0,20 с;

AV- блокада II-степени, Мобитц I




Постепенное увеличение интервала P-Q с
выпадением желудочкового комплекса QRST

AV- блокада II-степени,





выпадение желудочкового комплекса QRST ,без удлинения интервала PQ

Полная AV-блокада



Полное разобщение предсердного (P) и желудочкового (QRST) ритмов и снижение числа желудочковых сокращений до 60—30 в минуту или меньше.



Полная блокада правой ножки пучка Гиса



Полная блокада правой ножки пучка Гиса

- 1) наличие в правых грудных отведениях $V_1, 2$ (реже в отведениях от конечностей III и aVF) комплексов QRST типа rSR' или rsR' имеющих M-образный вид, причем $R1 > r$;
- 2) наличие в левых грудных отведениях (V_5, V_6) и в отведениях I, aVL уширенного, нередко, зазубренного зубца S;
- 3) увеличение длительности (ширины) комплекса QRS более 0,12 с;
- 4) наличие в отведении VI (реже в отведении III) депрессии сегмента RS—T с выпуклостью, обращенной вверх, и отрицательного или двухфазного (-+) асимметричного зубца T.

Полная блокада левой ножки пучка Гиса



Полная блокада левой ножки пучка Гиса

- 1) наличие в отведениях V5, V6, I, aVL уширенных деформированных желудочковых комплексов, типа R с расщепленной или широкой вершиной;
- 2) наличие в отведениях V1 V2, III, aVF уширенных деформированных желудочковых комплексов, имеющих вид QS или rS с расщепленной или широкой вершиной зубца S;
- 3) увеличение общей длительности комплекса QRS более 0,12 с;
- 4) наличие в отведениях V5, V6, I, aVL дискордантного по отношению к QRS смещения сегмента RS—T и отрицательных или двухфазных (—+) асимметричных зубцов T
- 5) отклонение электрической оси сердца вправо наблюдается часто, но не всегда.