

Семей Мемлекеттік Медицина Университеті

**Тақырып;** ИБВДВ бойынша бағалау және жіктеу. Қызба.  
Тамақ пен құлақтың мәселесі

Орындаған: Утеева А.А


# Балада қызба барма?

Егер бар болса, сұраңыз;  
Ұзақтығы қанша?

Егер 5 күннен артық болса, қызба күнде анықталды ма  
Соңғы Зайда бала қызылшамен ауырдыма?



Қараймыз;  
Шүйде бұлшықеттерінің регидтілігін  
Қызылшаның белгілерін іздейміз;  
▪ Жайылған бөртпелердің болуы  
▪ Жөтел, мұрнынан су ағу, көзінің қызаруы




Егер жоғарыдағылар бар болса, қызбамен жіктейміз



<ul style="list-style-type: none"><li>•Кез келген қауіп белгілерінің біреуі</li><li>•Шүйде бұлшықеттерінің регидтілігі</li></ul>	<b>Өте ауыр фебрильді ауру</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪Сәйкес келетін антибиотиктің бастапқы дозасын беріңіз</li><li>▪Ауырсыну кезінде парацетамолдың бастапқы дозасын беріңіз</li><li>▪ Жедел стационарға жіберіңіз</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Қызба 5күннің ішінде немесе одан көп</li></ul>	<b>Ұзаққа созылған қызба</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪Амбулаторияда жоғары лихорадка/38,5С немесе ↑/ кезінде парацетамолдың бірреттік дозасын беріңіз</li><li>▪ Поликлиникаға тексеруге жіберіңіз</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>•Классификация- Пневмония, Дизентерия, стрептококкты фарингит,жедел құлақ инфекциясы</li></ul>	<b>Мүмкін бактериальды инфекция</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪Амбулаторияда жоғары лихорадка/38,5С немесе ↑/ кезінде парацетамолдың бірреттік дозасын беріңіз</li><li>▪ ИВБДВ бойынша емдеңіз</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Жоғарыда көрсетілген ешбір белгілер жоқ</li></ul>	<b>Асқынбаған қызба</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪Амбулаторияда жоғары лихорадка/38,5С немесе ↑/ кезінде парацетамолдың бірреттік дозасын беріңіз</li><li>▪ Келесі келу 2күннен соң, егер қызба басылмаса</li></ul>

Егер балада қызылша н/е қызылшамен соңғы Зайдын ішінде  
ауырған болса;



Қараймыз;  
Ауыз қуысында жаралар барма? Терең бе, жайылған ба?  
Көзде іріңді бөліністер барма?  
Қасаң қабақтың  
бұлыңғырлануы?



<ul style="list-style-type: none"> <li>●Кез келген қауіп белгілерінің біреуі н/е</li> <li>● Қасаң қабықтың бұлыңғырлануы</li> <li>●Ауыз қуысының терең н/е жайылған жаралары</li> </ul>	<p><b>Қызылшаның ауыр асқынуы</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ А вит беріңіз</li> <li>▪Сәйкес келетін антибиотиктің бастапқы дозасын беріңіз</li> <li>▪ Егер қасаң қабықтың бұлыңғырлануы н/е көзден іріңді бөліністер болса көзге арналған тетрациклинді мазьды қолданыңыз</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●Көзден іріңді бөліністер н/е</li> <li>● Ауыздағы жаралар</li> </ul>	<p><b>Қызылша ауыз және көздің асқынуымен</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ А вит беріңіз</li> <li>▪ Егер көзден іріңді бөліністер болса көзге арналған тетрациклинді мазьдаы қолданыңыз</li> <li>▪ Ауыздағы жараны генцианвиолетпен емдеңіз</li> <li>▪Келесі келу 2күннен кейін</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●Егер балада қызылша,н/е қызылшамен соңғы Зайдын ішінде ауырған болса</li> </ul>	<p><b>Қызылша</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ А вит беріңіз</li> </ul>

## ► Дайте Подходящий Антибактериальный Препарат

► ПРИ ПНЕВМОНИИ, ОСТРОЙ ИНФЕКЦИИ УША ИЛИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОМ ЗАБОЛЕВАНИИ:  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ АМОКСИЦИЛЛИН

ВОЗРАСТ или ВЕС	АМОКСИЦИЛЛИН	
	ТАБЛЕТКИ 250 мг	СИРОП 125 мг в 5 мл
От 2 до 11 месяцев (4-9 кг)	1/2	5 мл
От 12 месяцев до 3 лет (10-14 кг)	1 1/2	15 мл
От 3 до 5 лет (15-20 кг)	2	20 мл

## ► Дайте Парацетамол При Высокой Лихорадке (> 38,5°C) или Боли в Ухе

► Давайте парацетамол каждые 6 часов до устранения высокой лихорадки или боли в ухе.

ПАРАЦЕТАМОЛ		
ВОЗРАСТ ИЛИ ВЕС	СИРОП (120 мг в 5 мл)	ТАБЛЕТКА (500 мг)
от 2 месяцев до 3 лет (4-<14 кг)	5 мл (1 ч.л.)	1/4
от 3 лет до 5 лет (14-<19 кг)	10 мл (2 ч.л.)	1/2

## Баланың тамағы ауыра ма?

### Әрбір баланың тамағын шпательмен қараймыз

Егер ауыратын болса немесе қарау кезінде тамағында өзгеріс болса;  
Анасынан сұраймыз  
Бала су іше ала ма?

Баланы қараймыз  
Тамағында ақ жабынды барма?  
Мойындық лимфа түйіндері ұлғайған ба?

Егер жоғарыдағылар бар болса, тамақ ауруымен жіктейміз

●Су іше алмайды

## **Жұтқыншақ абцесі**

- Бициллин-1 беріңіз
- Стационарға тездетіп жіберіңіз
- Амбулаторияда жоғары лихорадка/38,5С немесе ↑/ кезінде парацетамолдың бірреттік дозасын беріңіз

●Мойын лимфа түйіндерінің ұлғаюы

●Тамағында ақ жабынды бар

## **Стрептококкты фарингит**

- Бициллин-1 беріңіз
- Амбулаторияда жоғары лихорадка/38,5С немесе ↑/ кезінде парацетамолдың бірреттік дозасын беріңіз
- Тамағын қауіпсіз зат көмегімен жұмсартыңыз
- Анасына қашан келу керек екенін түсіндіріңіз
- Келесі келу 2күннен кейін

●Сары жолақта көрсетілгеннің біреуі немесе бірде-бірі емес

## **Стрептококкты емес фарингит**

- Тамағын қауіпсіз зат көмегімен жұмсартыңыз
- Ауырсыну кезінде парацетамол беріңіз
- Анасына қашан келу керек екенін түсіндіріңіз
- Келесі келу 2күннен кейін




Баланы құлақ ауруы мазалайды ма?

Егер ия болса, сұраймыз;

•Құлағы ауыра ма?

•Құлағынан бөлінділер бөліне ма?


Егер бөлінетін болса, ұзақтығы қанша?



Баланың құлағын қараймыз;

Құлағында іріңді бөліністер барма?

Құлақтың артында ауырсынбалы ісіну барма?



Егер жоғарыдағылар бар болса, құлақ мәселесімен жіктейміз



<ul style="list-style-type: none"><li>●Құлақтың артында ауырсынбалы ісіну</li></ul>	<h2>Мастоидит</h2>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪Сәйкес келетін антибиотиктің бастапқы дозасын беріңіз</li><li>▪Ауырсыну кезінде парацетамолдың бастапқы дозасын беріңіз</li><li>▪ Жедел стационарға жіберіңіз</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>●Құлақтан іріңді бөліністер болуы. ұзақтығы 14күннен аз емес</li><li>●Құлақтағы ауырсыну</li></ul>	<h2>Жедел құлақ инфекциясы</h2>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Антибактериальды препаратты 5күн аралығында немесе амоксициллинмен құлақ тамшысын беріңіз</li><li>▪ Турундамен құлақты құрғатыңыз</li><li>▪ Ауырсыну кезінде парацетамол</li><li>▪ Келесі келу 5күннен кейін</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>●Құлақтан іріңді бөліністер болуы. ұзақтығы 14күннен көп</li><li>●Құлақтағы ауырсыну</li></ul>	<h2>Созылмалы құлақ инфекциясы</h2>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Турундамен құлақты құрғатыңыз</li><li>▪ Ципрофлоксацинмен құлақ тамшысын ұзақтығы 2аптадан аз емес тамызыңыз</li><li>▪ Поликлиникаға тексеруге жіберіңіз</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>●Құлақта ауырсыну жоқ</li><li>●Іріңді бөліністер бөлінбейді</li></ul>	<h2>Құлақта инфекция жоқ</h2>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Қосымша емдеусіз</li></ul>

Назарларыңызға  
рахмет!!!

