

Гашишная наркомания.
Клиника. Диагностика.
Гашишные психозы.

Лектор: Кусаинов А.А.

Каннабис

Наркотическое действие оказывают психоактивные вещества – каннабиноиды (конопля содержит около 60 каннабиноидов). Наиболее активный - транс-О-9-тетрагидроканнабиол (ТГК)

Виды препаратов каннабиса:

- Марихуана (порт. *mariguango*) - наркотик, приготовленный из стеблей и листьев конопли (содержание ТГК от 0,5% до 4%)
- Гашиш - смолистое вещество, собранное из цветущих верхушек травы каннабиса (содержание ТГК от 2% до 20%)
- Гашишное масло - это концентрированные каннабиноиды, получаемые с помощью экстракции из необработанного материала или смолы (концентрация ТГК - от 15 до 50%)

История и распространенность

- 1810 г. - появление первых статей о каннабисе (Rouger)
- 1838-1860 - работы W.B.O.Shanghnessy, J.Moren de Tours, A.Brigham , J.P.Hay о терапевтических свойствах конопли
- начало 60-х годов – эпидемия злоупотребление марихуаной в США, в европейских странах

- По частоте употребления после алкоголя находиться на 2 месте
- В 80-е годы в СССР гашишная наркомания составляла 20-30% от общего числа наркоманов (Э.А.Бабаян, 1988)
- По данным социологических исследований, производные конопли составляют 62,5% всех наркотиков
- Приобщение к наркотикам в 62% начинается с препаратов конопли (Л.Д.Мирошниченко, В.И.Туманов, 1994)

Действие каннабиса

- Подавляет синтез, освобождение и разрушение ацетилхолина
- Существуют специфические каннабиноидные рецепторы (в базальных ядрах, гиппокампе и коре) (играют роль в процессах познания, запоминания, воспроизведения, восприятия и моторной координации)
- При курении ТГК всасываются быстрее, чем при приеме per os
- Фармакологическое действие наступает немедленно, пик через 30 минут
- Дозировка определяется качеством наркотика, числом затяжек, имеет значение место произрастания конопли

Смены симптомов при гашишной интоксикации (Bouquet, 1950)

Смены симптомов при гашишной интоксикации (Bouquet, 1950)

Смены симптомов при гашишной интоксикации (Bouquet, 1950)

Смены симптомов при гашишной интоксикации (Bouquet, 1950)

Смены симптомов при гашишной интоксикации (Bouquet, 1950)

**Фазность при гашишной
интоксикации (И. Н. Пятницкая,
1994)**

Фазность при гашишной интоксикации (И. Н. Пятницкая, 1994)

Фазность при гашишной интоксикации (И. Н. Пятницкая, 1994)

Фазность при гашишной интоксикации (И. Н. Пятницкая, 1994)

Развитие зависимости (этап эпизодического употребления)

- В течение первого года не развивается привыкания к наркотику; употребления наркотика эпизодическое.
- Толерантность возрастает от 1 до 3-5 сигарет за вечер.
- До появления первых признаков влечения проходит 1-1,5 года.

Развитие зависимости (1 стадия)

- Наркотическое опьянение протекает без первой фазы.
- Снижаются вегетативные проявления.
- Курение становится систематическим, поиск наркотика активный.
- Психическая зависимость представлена obsессивным влечением к наркотику.

Развитие зависимости (2 стадия)

- Появляется синдром физической зависимости.
- Первая и четвертая фазы опьянения исчезают.
- В интоксикации испытывается очень краткое первоначальное расслабление; в дальнейшем работоспособность, активность.
- Опьянение длится теперь 1-1,5 ч, затем снижение тонуса, энергии.
- Толерантность к наркотику возрастает, спиртное не употребляется; интоксикация становится единственным состоянием физического комфорта
- Компulsive влечение выражено, однако не сопровождается вегетативными реакциями и психической напряженностью.
- Абстинентный синдром при гашишизме развивается спустя 2-3 года систематического курения.
- Могут возникать различные психотические состояния.

Развитие зависимости

(3 стадия)

- Падает толерантность, наркотик оказывает лишь тонизирующий аффект, форма потребления систематическая.
- Абстинентный синдром носит затяжной характер.
- Последствием гашишизма являются прогрессирующее снижение энергетических ресурсов, физическое и психическое истощение, нарастание вялости, отупения, потеря социальных связей, появление затяжных психозов.

Признаки и фазность абстинентного синдрома при гашишизме

(И. Н. Пятницкая, 1994)

Последствия и осложнения

психические нарушения:

- "амотивационный синдром" (пассивность, вялость, замкнутость)
- внимание неустойчиво, память снижена
- шизоформные галлюцинаторно-параноидные психозы

соматические нарушения:

- повышенный риск развития хронических бронхитов, рака дыхательных путей, других заболеваний лёгких
- высокий риск рождения ребенка с низким весом (если каннабис употребляется матерью во время беременности)