


ГЕМАТОГЕННЫЕ ИНФЕКЦИИ: СТОЛБНЯК, ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ





Выполнила:
Матюкова
Валерия
1 курс ДО

Столбня

К

Столбняк — острое инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым токсическим поражением нервной системы с тоническими и клоническими судорогами, нарушениями терморегуляции.



Инкубационный период — от 3 до 30 (чаще 7—14) дней.

Симптомы:

- неприятные ощущения в области раны (тянущие боли, подергивание мышц вокруг нее)
- появление судорог
- судорожное сокращение жевательных мышц, а также мимической мускулатуры
- приступы клонических судорог, захватывающие мышцы спины, конечностей
- головные и мышечные боли
- лихорадка
- повышенная потливость
- слабость

Лечение столбняка

Лечение ран, экстренная вакцинация, введение противостолбнячной сыворотки.

Лекарственные препараты:

- противостолбнячный человеческий иммуноглобулин
- антибиотики
- противосудорожные препараты; сульфат магния и некоторые бета-блокаторы, могут быть использованы, чтобы помочь поддержать произвольную мышечную активность
- поддерживающая терапия

ПОМНИТЕ, что даже если вакцины против столбняка вводились вам своевременно, но от последней дозы прошло более пяти лет, следует повторить введение вакцины сразу после получения раны, желательно в тот же день.

Если вы получили незначительные ранения, следующие шаги позволят вам снизить риск заражения столбняком:

- Контролируемое кровотечение
- Держите рану чистой
- Используйте антибиотики
- перевяжите рану

Профилактика

Специфическая профилактика заключается в плановой поэтапной вакцинации детей вакциной АКДС и последующим ревакцинациям каждые 10 лет препаратами АДС, АС и АДС-М.




Вирусные гепатиты

Вирусные гепатиты — распространенные и опасные инфекционные заболевания печени.

Виды:

- Гепатит А
- Гепатит В
- Гепатит С
- Гепатит D
- Гепатит E
- Гепатит G



Гепатит А является наиболее распространенным. От момента заражения до появления первых признаков проходит от 7 до 50 дней.

Симптомы: подъем температуры (может напоминать грипп), головная боль, общее недомогание, ломота в теле. Большинство случаев завершается спонтанным выздоровлением и не требует активного лечения.

Длительность гепатита А составляет в среднем 1 месяц.

Лечение: базисная терапия, постельный режим, соблюдение диеты, при наличии показаний назначается дезинтоксикационная терапия, симптоматическая терапия. Обычно рекомендуют избегать употребления алкоголя.



Гепатит В передается половым путем, при инъекциях нестерильными шприцами у наркоманов, от матери — плоду.



Симптомы: повышение температуры, слабость, боль в суставах, тошнота и рвота, иногда появляются высыпания.


Лечение: Гепатит В часто хронизируется. Хронический гепатит приводит со временем к развитию цирроза и рака печени. Полного излечения хронического гепатита В практически не наступает, но можно добиться благоприятного течения заболевания при условии выполнения определенных рекомендаций, касающихся режима труда и отдыха, питания, психоэмоциональных нагрузок, а также при приеме препаратов, улучшающих обменные процессы в клетках печени. Проводится базисная терапия



Гепатит С - заражение через шприцы у наркоманов, половым путем , от матери — плоду. Хроническая форма этой болезни нередко переходит в цирроз и рак печени.

Симптомы: слабость и снижение аппетита, боли в правом подреберье, тошнота, рвота, темнеет моча и обесцвечивается кал, увеличение печени и реже — селезенки.

Лечение: Основой всех схем лечения является интерферон-альфа. Применение интерферона не может гарантировать полного выздоровления, однако, лечение им предотвращает развитие цирроза или рака печени.



Цирроз печени



Гепатит D — «болезнь-спутник», осложняющая течение гепатита В.

Лечение: Гепатит D протекает только на фоне гепатита В. Лечение гепатита D должно проводиться в стационаре. Требуется как базисная, так и противовирусная терапия.

Гепатит E похож на гепатит А, но начинается постепенно и опаснее для беременных.

Лечение: Гепатит E не лечат, так как организм человека достаточно силен, чтобы избавиться от вируса без помощи лечения. Через месяц-полтора наступает полное выздоровление. Иногда доктора назначают симптоматическую терапию для устранения головной боли, тошноты

Гепатит G, похож на С, но менее опасен

Симптомы: боли в правом подреберье; тошнота и рвота; потеря аппетита; темный цвет мочи и светлый – кала.

Лечение: лекарственная терапия; препараты противовирусной группы (разнообразные интерфероны); постельный режим, применение методов интенсивной терапии, использование витаминных и ферментных препаратов, В редких случаях – лечение кислородом.

Наибольшую опасность представляет хроническое течение гепатитов. Хронизация характерна только для **гепатитов В, С, D**.

Симптомы: недомогание и усиливающаяся к концу дня повышенная утомляемость, невозможность выполнять прежние физические нагрузки. На далеко зашедшей стадии хронического вирусного гепатита обнаруживаются желтуха, потемнение мочи, кожный зуд, кровоточивость, похудание, увеличение печени и селезенки, сосудистые звездочки.



Желтуха



Сосудистые звездочки

Профилактика гепатитов

Чтобы уберечься от заражения гепатитами, необходимо соблюдать несложные правила:

Не следует употреблять некипяченую воду, всегда мыть фрукты и овощи, не пренебрегать термической обработкой продуктов. Так можно предотвратить заражение **гепатитом А**.

Необходимо избегать контакта с биологическими жидкостями других людей (кровью) для предохранения от **гепатитов В и С**, а также **Д и G**.

Не стоит делить бритвы, зубные щетки, ножницы для ногтей с другими людьми. Нельзя делать пирсинг и татуировки нестерильными приборами. Необходимо принимать меры предосторожности при половом контакте.

Профилактика **гепатита Е**: пить исключительно бутилированную или кипяченую; мыть овощи и фрукты только чистой водой.