

*Қ.А. Ясауи атындағы халықаралық
қазақ-түрік университеті*

СӨЖ

*Тақырыбы: Емделуі қиын созылмалы
психикалық ауруларға жүргізетін
әлеуметтік, медициналық және
педагогикалық көмек*

*Қабылдаған: Қонысов Б
Орындаған: Мирзахонжаева З
Тобы: ЖМ-513*

Жоспар:

I Кіріспе

Олигофрения туралы жалпы түсінік

II Негізгі бөлім

1. Олигофренияның профилактикасы және емі.

2. Олигофрения кезіндегі әлеуметтік көмек.

3. Олигофрения кезіндегі педагогикалық көмек

III Қорытынды

IV Пайдаланған әдебиеттер



Кіріспе

Олигофрения (грек. oligos – аз және phren – ақыл) – ақыл – ойдың кемдігі, ітен туа біткен не алғашқы 3 жыл өмірінде дамымай қалған психиканың әр түрлі формалары.





Олигофрения

*Олигофрения терминін
1915 жылы Е.Крепелин
ұсынған*



Э. Крепелин (1856—1926)

Сухарев классификациясы

(Зақымдаушы фактордың әсер ету уақытына және этиопатогенитикалық механизміне байланысты)

- *эндогенді және генетикалық* –
хромосомалық аберрациялар (Даун ауруы), тұқым қуалаушы энзимопатиялар (фенилкетонурия, гомоцистинурия, лейциноз, галактоземия, гаргоилизм).





4 стадии олигофрении по МКБ



Дебильность
{лёгкая}



Имбецильность
{умеренная}



Идиотия
{глубокая}



I ❤️ 🍷

Таблица 23.1. Разделение олигофрений по степени задержки интеллектуального развития

МКБ-10		IQ	Отечественная классификация	Социальная характеристика
Класс	Степень умственной отсталости			
F70	Легкая умственная отсталость	50—69	Дебильность	Воспитуемы, обучаемы, трудоспособны
F71	Умеренная умственная отсталость	35—49	Имбецильность	Воспитуемы, необучаемы, нетрудоспособны
F72	Тяжелая умственная отсталость	20—34	То же	То же
F73	Глубокая умственная отсталость	Ниже 20	Идиотия	Невоспитуемы, необучаемы

Профилактикасы

Медициналық іс – шаралар олигофрения ерте анықтауға және алдын алуға бағытталуы қажет. Диеталық ем энзимопатиялық олигофренияның алдын алады, кейде орын алмастырушы гормональды терапия нәтижелі болады (мысалы гипотериоз кезінде). Инфекцияларды (токсоплазмоз, сифилис, листериоз) ерте анықтау арқылы антимикробты паразиттерге қарсы терапия жүргізуге болады. Олигофренияның негізгі профилактикасы ретінде жүкті әйелді мұқият курациялау және босандыруды дұрыс ұйымдастыру қарастырылады. Олигофренияның тұқым қуалаушылық формаларының жоғарғы жиілігін есепке алсақ, профилактиканың маңызды бөлігі медико-генетикалық кеңес

Медициналық көмек

▣ *Психикалық дамудың артта қалуын ерте анықтау арқылы ОЖЖ дамуына және репарацияға әсер ететін арнайы емес метаболикалық заттарды тағайындауға болады. Олар незізінен ноотроптар (пирацетам, пиридитол), витаминдер (В тобының витаминдері), аминқышқылдар және олардың туындылары (глутамин және янтарь қышқылы, церебролизин).*

*Психоз кезінде кері әсер өте төмен
неролептиктер қолдануға тырысады
(неулептил, сонапакс, терален,
хлорпротиксен), алайда тұрақты
психомоторлық қозу кезінде күшті әсерлі
заттар қолдануға тура келеді (аминазин,
галоперидол).*








Дебильдік кезіндегі әлеуметтік адаптация

Бұл сұрақпен мына бағыттардың мамандары айналысады:

- психиатрия*
 - балалар неврологиясы*
 - педагогика*
 - әлеуметтік психология*
 - педиатрия*
- 

Мақсаты бұл науқастарды өмірге және заманауи ортаға тек қана бейімдеу емес, қылмысты ортаға түсудің алдын алу болып табылады, себебі қаскүнемдер олардың тіл алғыштығы мен сенгітігін заңсыз іс-әрекеттерге пайдаланулары мүмкін



Коррекциялық-педагогикалық жұмыс кезінде ескерген жөн

1. *Өзіндік интеллектуальды, эмоциональды және тұлғалық дамуын*
2. *Әр түрлі психикалық қызметтердәі гетерохронды дамуын.*
3. *Психикалық қызметтің жедел және мазмұнды жақтарының біркелкі емес дамуын.*



Балалардың тапқырлығын дамытуға арналған негізгі бағыттар

1. *Өнер тапқыш қызметтің эмоциональдық қатынасты қалыптастыру (әр түрлі түстер арқылы көңіл-күйін білдіру).*
2. *Қабылдауды дамыту.*
3. *Ұсақ моторика және көру-моторлы координацияны дамыту.*



Назарларыңызға

рахмет!!!

