

§2. Наблюдения - основа астрономии

Телескоп – основной прибор, который используется для наблюдения небесных тел, приёма и анализа происходящего от них излучения.

Слово происходит от греческих слов: tele – далеко и skoréo – смотрю.

Телескоп применяют :

- 1) чтобы собрать как можно больше света, идущего от исследуемого объекта;
- 2) чтобы обеспечить возможность изучать мелкие объекты, недоступные невооруженному глазу.

Проницающая сила телескопа тем больше, чем более слабые объекты он даёт возможность увидеть.

Разрешающая способность телескопа характеризует возможность различать мелкие детали.

Обе эти характеристики зависят от диаметра объектива.



Количество света, собираемого объективом, возрастает пропорционально его площади (квадрату диаметра).

Объектив телескопа может превышать по диаметру зрачок глаза, который даже в полной темноте не превышает 8 мм, в десятки и сотни раз.

Чем меньше размер изображения звезды, которое дает объектив телескопа, тем лучше его разрешающая способность.


Вследствие дифракции изображение звезды будет не точкой, а ярким пятном, дифракционным диском, угловой диаметр которого равен

$$\alpha = 206\,625 \cdot \lambda / D \cdot 2,44,$$

где λ – длина световой волны,

D – диаметр объектива телескопа,

206 265 – число секунд в радиане.




Реальная разрешающая способность телескопа будет меньше расчетной, поскольку на качество изображения существенно влияет состояние атмосферы, движение воздуха.


Рефрактор (от латинского слова refracto – преломляю) – телескоп, у которого в качестве объектива используется линза.

Рефлектор (reflecto – отражаю) – телескоп, у которого в качестве объектива используется вогнутое зеркало.

В настоящее время используются также различные типы **зеркально-линзовых (катадиоптрических)** телескопов.



Изображения Луны, планет, и тем более звезд будут располагаться в фокальной плоскости, так как лучи, приходящие от них, можно считать параллельными.



Фокусное расстояние окуляра меньше, чем фокусное расстояние объектива.

Угол φ заметно больше угла φ_0 .

Окуляр увеличивает угловые размеры объекта.

Если изображение, даваемое объективом, находится вблизи фокальной плоскости окуляра, увеличение, которое обеспечивает телескоп, равно отношению фокусного расстояния объектива (F) к фокусному расстоянию окуляра (f):

$$W = F / f.$$



Имея сменные окуляры, можно с одним и тем же объективом получать различное увеличение. Поэтому возможности телескопа в астрономии принято характеризовать не увеличением, а диаметром его объектива.


БТА (Большой Телескоп Альт-Азимутальный) - телескоп-рефлектор с главным параболическим зеркалом диаметром 6 м.
Установлен в Специальной астрофизической обсерватории на Кавказе.



Большой Канарский Телескоп расположен на пике вулкана Мучачос на высоте около 2400 метров выше уровня моря в обсерватории Ла-Пальма.

В настоящее время он является одним из самых крупных и совершенных телескопов в мире.

Его первичное зеркало, диаметром 10,4 метра, составлено из 36 шестиугольных сегментов, которые объединены в общую структуру.



Астрономы уже давно не ведут визуальных наблюдений.

На смену им в XIX в. пришла фотография, а в настоящее время её заменяют электронные приёмники света.

Запись полученных изображений ведется с помощью компьютера.


Некоторые телескопы используются для того, чтобы полученное изображение через компьютер передавать непосредственно пользователям Интернета.



Комната управления телескопом PS1.


Телескоп «Хаббл»

Космический телескоп «Хаббл» обращается вокруг Земли на высоте около 600 км. Имея зеркало диаметром 2,4 м, обеспечивает разрешающую способность 0,1', позволяющую изучать объекты, которые в 10-15 раз слабее объектов, доступных такому же наземному телескопу.



Всеволоновая астрономия

В настоящее время наблюдения за объектами ведутся не только в оптическом диапазоне, поэтому астрономию называют **всеволоновой**.



Радиотелескопы

Только радиоизлучение из космоса достигает поверхности Земли без значительного поглощения. Для его приема применяют **радиотелескопы**.

В современных радиотелескопах для регистрации сигналов используется компьютер, который сначала запоминает их в цифровой форме, а затем представляет полученные результаты в наглядной форме.



Радиотелескопы

Возможности радиотелескопов существенно возрастают, если их антенны объединить в систему и использовать для изучения одного и того же объекта.

Система, которая состоит из 27 антенн диаметром 25 м каждая, расположенных в определенном порядке, позволяет достичь углового разрешения 0,04".

Это соответствует возможностям радиотелескопа с антенной диаметром 35 км.



Российский радиотелескоп РАТАН-600

Радиоастрономический телескоп Академии наук РАТАН-600 - крупнейший в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом диаметром около 600 м.



Радиотелескоп расположен в Карачаево-Черкесии на высоте 970 м над уровнем моря.

В 2011 г. российские ученые приступили к реализации масштабного международного проекта **«Радиоастрон»**.

Российская космическая обсерватория «Радиоастрон»

Проект «Радиоастрон» позволит увидеть далекие объекты космоса в небывалом разрешении

Параболическая антенна

- Диаметр – 10 м
- Состоит из 27 твердых лепестков из углепластика

Малонаправленные антенны

Фокальный модуль

«Радиоастрон» – первый в истории российский радиотелескоп на орбите
Он будет изучать:

- ядра галактик
- черные дыры
- нейтронные звезды
- облака межзвездной плазмы
- гравитационное поле Земли
- и многие другие объекты и явления Вселенной

Заказчик: Роскосмос
Главной исполнитель проекта: НПО имени Лавочкина
Разработчик научной аппаратуры: Астрономический центр ФИАН
Запуск: 18 июля 2011
Срок активного существования: не менее 5 лет

Служебный модуль «Навигатор»

Высокоинформативный радиокомплекс

Солнечные батареи

Орбита: высокоэллиптическая

- апогей: 330 000 км
- перигей: 600 км
- период обращения: 8,2 суток

Наблюдаемый объект

База интерферометра

600 км

330 000 км

362 000 км

Луна

«Радиоастрон» будет работать совместно с международной сетью наземных радиотелескопов, образуя **гигантский наземно-космический телескоп (т.н. интерферометр)** высочайшего углового разрешения.

Это позволит получить изображения далеких объектов **в тысячу раз более детальные**, чем у орбитального телескопа «Хаббл»

Домашнее задание

Вопросы письменно (с.18)

1. Опишите, как координаты Солнца будут меняться в процессе его движения над горизонтом в течение суток.
2. По своему линейному размеру диаметр Солнца больше диаметра Луны примерно в 400 раз. Почему угловые диаметры почти равны?
3. Почему при наблюдениях в телескоп светила уходят из поля зрения?

Упражнение 1

1. Каково увеличение телескопа, если в качестве объектива используется линза, оптическая сила которой 0,4 дптр, а в качестве окуляра линза с оптической силой 10 дптр?

Домашнее задание

Выполнить проект* (*дополнительное задание - сообщение*).

Темы проектов

- 1. Первые звездные каталоги Древнего мира.*
- 2. Крупнейшие обсерватории Востока.*
- 3. Дотелескопическая наблюдательная астрономия Тихо Браге.*
- 4. Создание первых государственных обсерваторий в Европе.*
- 5. Угломерные инструменты древних вавилонян — секстанты и октанты.*
- 6. Современные космические обсерватории.*