




Альдегиды

Строение молекулы

- Альдегидами называются органические соединения, содержащие карбонильную группу, в которой атом углерода связан с радикалом и одним атомом водорода, то есть общая формула альдегидов:



- Исключение составляет муравьиный альдегид, в котором, как видно, **R=H**.



Модель молекулы
формальдегида

Номенклатура, изомерия

- Название альдегидов образуется от названий соответствующих предельных углеводородов путем добавления суффикса **аль**
- Для альдегидов характерна изомерия углеводородного радикала, который может иметь как нормальную (неразветвленную) цепь, так и разветвленную, а также межклассовая изомерия с кетонами.

Физические свойства




- Простейший альдегид – муравьиный – газ с весьма резким запахом. Другие низшие альдегиды – жидкости, хорошо растворимые в воде.
- Альдегиды обладают удушливым запахом, который при многократном разведении становится приятным, напоминая запах плодов.
- Альдегиды кипят при более низкой температуре, чем спирты с тем же числом углеродных атомов. Это связано с отсутствием в альдегидах водородных связей.
- В то же время температура кипения альдегидов выше, чем у соответствующих по молекулярной массе углеводородов, что связано с высокой полярностью альдегидов.



Получение альдегидов


- Окисление первичных спиртов.



- Уксусный альдегид получают гидратацией ацетилена по реакции Кучерова:




- Альдегиды получают гидролизом дигалогенопроизводных углеводородов, однако только тех, у которых оба атома галогена расположены у одного из концевых атомов углерода.



Химические свойства

- Альдегиды характеризуются высокой реакционной способностью. Большая часть их реакций обусловлена наличием карбонильной группы. Атом углерода в карбонильной группе находится в состоянии sp^2 -гибридизации и образует три σ -связи, которые расположены в одной плоскости под углом 120° друг к другу.




- Ввиду большей электроотрицательности атома кислорода по сравнению с атомом углерода, связь C=O сильно поляризована за счет смещения электронной плотности π -связи к атому кислорода, в результате чего на атоме кислорода возникает частичный отрицательный (δ^-), а на атоме углерода – частичный положительный (δ^+) заряды:




- Благодаря поляризации атом углерода карбонильной группы обладает электрофильными свойствами и способен реагировать с нуклеофильными реагентами.
- Важнейшими реакциями альдегидов являются реакции нуклеофильного присоединения по двойной связи карбонильной группы.

- Присоединение водорода осуществляется в присутствии катализаторов (Ni, Co, Pd и др.)




- Взаимодействие с аммиачным раствором оксида серебра:



это качественная реакция на альдегиды

- Взаимодействие с гидроксидом меди (II)



- ***это качественная реакция на альдегиды***

Применение альдегидов


Производство
лекарств



В сельском хозяйстве
для протравливания
семян




Производство
серной
кислоты



В строительстве



Производство
пластмасс



В кожевенной
промышленности
для дубления кожи