

“Академия “ЛОКОН”

“ПАТОГЕНЕЗ СЕБОРЕИ”

Преподаватель: Давтян Ольга Александровна

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА

СТУДЕНТКА ГРУППЫ

1626

РАЙМЖАН МУХЛИСА

- Причиной себореи, по-видимому, являются функциональные нервные и эндокринные нарушения, возникающие в период полового созревания. Чаще всего себорея развивается в возрасте от 17 до 24 лет.

- **Течение себореи осложняют:**

- заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический колит);
- хронические очаги инфекции (хронический тонзиллит, гайморит, кариозные зубы);
- гиповитаминозы (особенно А и С);
- загрязнение кожи.



- **Себорея усиливается от острой, соленой и сладкой пищи.** Однако количественная и качественная характеристики кожного сала зависят также от состояния нервной и пищеварительной систем, характера питания, сопутствующих заболеваний. При себорее подавляются бактерицидные свойства сального секрета. Он скапливается в протоках сальных желез и на поверхности кожи, создавая условия для развития пиококковой инфекции, что проявляется образованием угрей. Этому способствует также неправильный уход за кожей.



РАЗНОВИДНОСТИ СЕБОРЕИ

- Лицевая себорея у человека бывает трех разновидностей:
- сухая;
- жирная;
- смешанная.
- **Все эти разновидности имеют различные характеристики и симптомы, соответственно, уход за кожей лица требуется разный, отличаться будут и лечебные процедуры.** Чтобы избавиться от себореи и правильно лечить прыщи и раздраженную кожу, стоит посетить врача-дерматолога, который определит, какой тип и стадия заболевания, а также поможет подобрать лучшее лекарство.

Перхоть



Жирная себорея



Сухая себорея




Себорейный дерматит



Жирная себорея + перхоть



Сухая себорея + себорейный дерматит



- Причины, из-за которых появляется сухая или жирная себорея на лице, до сих пор точно не определены, однако врачи с уверенностью могут сказать, что немаловажную роль в развитии заболевания играет грибок *Pitirosporum ovale*. При стечении неблагоприятных факторов жизнедеятельность этого грибка активизируется, к таким факторам относятся:

- неправильное питание;
- злоупотребление вредными привычками;
- эндокринные болезни и сахарный диабет;
- заболевания хронического течения;
- ослабленность иммунитета;
- наследственность;
- беременность;
- неграмотно подобранная косметика по уходу за кожей лица.

