

Лінійка бренду Бруфен®!

Індивідуально для кожного Вашого клієнта



№1
ІБУПРОФЕ
Н
У СВІТІ
(ЗА ОБСЯГАМИ ПРОДАЖІВ)¹



Бруфен® саше - швидкий та виражений ефект проти гострого болю^{3,4}



600 мг ібупрофену в формі розчинних гранул¹



Проти гострого болю¹



2-3 саше на добу 7-14 днів^{1,5}



1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Бруфен®

2. Internal calculation derived from IQVIA MIDAS database, Q1 2021 (внутрішні розрахунки, отримані з бази даних Ай Кью Ві Ай Ей МІДАС, Ку1 2021).

3. Laska E.M. et al. The correlation between blooded levels of ibuprofen and clinical analgetic response. Clin Pharmacol Ther., 1986

4. Sharma NK, et al. *Prim Dent Care* 1994;1:5-8.

5. Рациональне застосування нестероїдних протизапальних препаратів у клінічній практиці (клінічні рекомендації) Журнал Неврології та психіатрії, 4, 2015

Бруфен® Ретард - надійний контроль хронічного болю до 24 годин³



800 мг ібупрофену в таблетках пролонгованої дії¹



Проти хронічного болю¹



2x800 мг одноразово на день¹
(бажано раннім вечором)



1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Бруфен®

2. Internal calculation derived from IQVIA MIDAS database, Q1 2021

3. Underwood LM, White SA, Kirkpatrick CT, Pickup ME, Bratty JR, Hind ID. BRUFEN® retard: Comparative bioavailability with BRUFEN® tablets at steady state. *Scand J Rheumatol* 1990; suppl 85:60.

До вас в аптеку звернувся
типовий клієнт, у нього болить
голова чи підвищена
температура

**Його звичний
ритм життя
порушено**






Чого ж хоче ваш клієнт,
який звертається в
аптеку за допомогою?

- Швидко
- Ефективно
- Безпечно
- Доступно

Рішення є!



Швидко*




Бруфен® Рарід починає діяти з 15 хвилини¹

1. Suthisang C, Poolsup N, Kittikuluth W, et al. Efficacy of low-dose ibuprofen in acute migraine treatment: systematic review and meta-analysis. Ann Pharmacother 2007;41:1782-1791

* Під «швидко» мається на увазі, що ібупрофен швидко абсорбується при пероральному застосуванні вже у шлунку і далі повністю у тонкому кишківнику.

Ще швидше¹...



VS



Бруфен® Рарід у м'яких капсулах діє в 2 рази швидше, ніж таблетки^{1,2}


1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Бруфен® У ході фармакокінетичного дослідження часу до пікових рівнів в плазмі крові (Т_{max} натщесерце для лікарської форми в таблетках становив 90 хвилин, у той час як для лікарської форми у м'яких «капсулах становив 40 хвилин)
2. Рождественський Д.А. Клінічна фармакологія анальгетиків-антипіретиків : особливості сучасних лікарських форм ібупрофена. Лікувальна справа: науково-практичний терапевтичний журнал. 2015. №5 (45). С. 17-20

Безпечно* ...



Ризики розвитку ускладнень у порівнянні з


ЗБАЛАНСОВАНА СЕЛЕКТИВНІСТЬ ІБУПРОФЕНУ МІЖ ЦОГ-1 та ЦОГ-2 ДОПОМАГАЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЙОГО ОПТИМАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ БЕЗПЕКИ



Бруфен® Рарід має найбільш сприятливий профіль безпеки у порівнянні з іншими НПЗЗ

1. Varrassi G, Pergolizzi JV, Dowling P, Paladini A. Ibuprofen Safety at the Golden Anniversary: Are all NSAIDs the Same? A Narrative Review. Adv Ther. 2020 Jan;37(1):61-82. doi: 10.1007/s12325-019-01144-9. Epub 2019 Nov 8. PMID: 31705437.
* «Безпечно» - мається на увазі бажання пацієнта мінімізувати ризики побічних ефектів з боку ШКТ та ССС. Бруфен має оптимальний профіль безпечності по відношенню до ризику розвитку побічних ефектів з боку ШКТ та ССС у порівнянні з іншими НПЗЗ¹ (повний перелік побічних реакцій - див. Інструкцію для медичного застосування лікарського препарату Бруфен Рарід.

Доступно...



Ціна на Бруфен® Рапід приємно здивує ваших клієнтів!

Найкращий вибір для ваших клієнтів зі скаргами на головний біль!



Проти головного болю та підвищеної температури¹



Дорослим та дітям старше 12 років¹



Спосіб застосування: по 1 капсулі 3 рази на добу (за необхідністю)

коли у дитини температура...



...важлива кожна
хвилина

Мама біжить до аптечки...



В аптечці вона знаходить:




чи



В чому ж різниця?

Майже ВСІ рідкі жарознижувальні засоби для дітей у Вашій аптеці представлені у вигляді суспензій




Перед
використанням
збовтати²

У суспензії тверда речовина розподілена у вигляді найдрібніших частинок у рідкому середовищі. При цьому частинки твердої речовини не розчиняються у рідині ¹

1. Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. Суспензії. <https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/9465/3/%D0%A1%D0%A3%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%98%D0%98.pdf> « дата доступа - ноябрь 2021»
2. Інструкція з медичного застосування лікарського засобу, що містить ібупрофен у формі суспензії.

А якщо недостатньо збовтати?




До чого це може призвести¹:

- Недостатній жарознижувальний ефект через недостатню кількість діючої речовини в 1 мл суспензії
- Надалі перевищення дозування діючої речовини в 1 мл суспензії (осад)

1. Ярных Т.Г. Аптечна технологія ліків. Суспензії.
<https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/9465/3/%D0%A1%D0%A3%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%98%D0%98.pdf> «дата доступу - ноябрь 2021»

Засобів від температури для дітей багато, а сироп – один!



Бруфен® – єдиний сироп з ібупрофеном на ринку України



Не потребує збовтування²



Це лікарська форма, що є концентрованим водним розчином сахарози, яка містить лікарську речовину¹

Після відкриття флакона сироп можна використовувати до закінчення строку придатності

1. <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/541/sirop>, дата доступу – ноябрь 2021.
2. Інструкція з медичного застосування лікарського засобу Бруфен® сироп

досить просто обрати потрібне дозування



При використанні сиропу **Бруфен®** при температурі, мама буде впевнена в концентрації, чіткому дозуванні в 1 мл, та в очікуваному результаті жарознижувального ефекту



Бруфен® забезпечує кращий та більш тривалий жарознижувальний ефект, ніж парацетамол¹

Аспект порівняння	БРУФЕН® сироп ¹	Парацетамол, суспензія
Тривалість антипіретичного ефекту ²	6-8-10 годин	4-6 годин
Кратність прийому	3 рази на добу	5-6 разів на добу
Терапевтичні ефекти	жарознижувальний знеболювальний протизапальний	жарознижувальний знеболювальний
Вік застосування	з будь-якого віку, від 7 кг	від 3 місяців, від 6 кг ⁵

Такі побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту, як диспепсія та біль у животі, розвиваються частіше при застосуванні парацетамолу, ніж при прийомі ібупрофену³

1. Інструкція з медичного застосування лікарського засобу Бруфен® сироп
2. Lesko S.M., Mitchell A.A. (1999) The safety of acetaminophen and ibuprofen among children younger than two years of age. *Pediatrics*, 104 (4) e39.
3. Moore N., Vanganse E., LeparсJ.-M., et al. The PAIN Study: Paracetamol, Aspirin and Ibuprofen New Tolerability Study: a large-scale, randomised clinical trial comparing the tolerability of aspirin, ibuprofen and paracetamol for short-term analgesia. *Clinical Drug Investigation* 1999; 18: 89-98.
4. Walson P.D. et al. *Clin Pharmacol Ther.* 1989; 46: 9-17. Дизайн исследования: двойное слепое исследование в параллельных группах по сравнению эффективности, переносимости и безопасности суспензии ибупрофена, ацетоминофена и плацебо у детей (2-11 лет) с лихорадкой.
5. Інструкція з медичного застосування лікарського засобу у формі суспензії, що містить парацетамол.

Бруфен® - 2% сироп з ібупрофеном від болю та температури у дітей¹



Має доступну
ціну*



для дітей від 7 кг¹



В комплекті зручний
шприц для дозування



Європейська якість**



* ціна Бруфен сироп становить від 58,84 грн згідно з даними ресурсу Tabletki.ua.

<https://tabletki.ua/uk/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%84%D0%B5%D0%BD/28165/pharmacy/kiiev/filter/s=price/> дата доступу 13.01.2022.

** вироблено в Італії¹

1. Інструкція з медичного застосування лікарського засобу Бруфен® сироп

Бруфен® - найкраще рішення від температури та головного болю

