



БАБЖ ЖӨТЕЛ НЕМЕСЕ ТЫНЫС АЛУДЫН КИҮНДАУЫ

ТОБЫ: ВОП 615-2

ПАСПОРТТЫҚ БӨЛІМІ

НАУҚАСТЫҢ АТЫ-ЖӨНІ: ТУГЕЛБАЕВ АБАЙ ЕРБОЛҰЛЫ

ТУҒАН УАҚЫТЫ: 29.03.2011 - 6 ЖАС

ТҮСКЕН УАҚЫТЫ: 11.05.2017 13:09

БӨЛІМШЕ: 5 Б ПАЛАТА 7

МЕКЕН-ЖАЙЫ: АЛМАТЫ Қ, КАШГАРСКАЯ 58 КВ 4

ТҮСКЕН КЕЗДЕГІ ДИАГНОЗЫ: ЖРВИ БРОНХИТ, ОРТАША
АУЫР ФОРМАСЫ, ПНЕВМОНИЯ?

Шағымдары

- Жөтел, мұрынынан су ағу,
әлсіздік

Баладан жалпы қауіп белгілерін анықтау?

- Есін анықтау (тежелген ба? немесе ес-түссіз ба?)
- Бала су іше ала ма?
- Тамак, су ішкеннен кейін құсу болма?
- Балада тырысулар болдыма ?

- Есі анық
- Іше алады
- Жок, құспайды
- Жок, болмаған.

- **Anamnesis morbi:** Анасының айтуы бойынша бала 3 күн ауырған. Ауру жетел, мұрынынан су ағудан басталған. иҮйде амбро, АЦЦ таблеткаларын берген, бірақ жағдайы жақсармаған, жетелі күшейген. 11.03.17. күні жедел жәрдем шақыртып, БЖА-на жатқызылған
- **Anamnesis vitae:** Бала 1 жүктілікten, 1 босану. Жүктілік патологиясыз өткен.Босану – 37 аптада,табиғи босану, туылған кездегі салмағы -3500гр,бойы-51см.Жылауы- бірден. Профилактикалық екпелерді жасына сай алған.
- **Эпид анамнез:** Ауруын сүйк тиюмен байланыстырады. Инфекциялық аурулармен контакт болмаған. Венерологиялық, Гепатит В,C , туберкулезben ауырмаған Трансфузия болмаған. Тұқым қуалаушылық аурулары жоқ.
- **Бұрын өткізген аурулары:** ОРВИ

► **Қарап тексеру:** Тұскен кездегі жағдай ауыр, интоксикация және катаральды синдромдар әсерінен. Есі-анық. Менингиальді белгілері жок. Тәбеті төмендеген. Тері түсі бозарған, бөртпелер, цианоз жок. Перифириялық лимфа бездері үлғаймаған. Тамағы қызарған, бадамшалары үлғайған. Мұрнымен тыныс алудың бөлінділер болуына байланысты қындаған. Жөтелі жиі. Перкуссияда – өкпелік дыбыс. Аускультацияда қатаң тыныс, құрғак сырылдар. Жүрек тондары түйікталған, ритмі дұрыс. Пальпацияда іші жұмсақ ауру сезімінсіз. Бауыры мен Көкбауыры үлғаймаған. Үлкен және кіші дәреті қалыпты.

Жөтел

1.Анаманез

- Жөтел
- Ентігу
- Ұзақтығы (күн саны)
- Пароксизмальды жөтел, тырыспалы дем алумен н/е лоқсу н/м орталық цианозбен
- Туберкулез н/е созылмалы жөтелі бар науқаспен қарым-қатынас
- Анамнезде тыныс алу жолдарының кенеттен механикалық обструкциясы
- ЖИТС
- Егу жоспарның орындалуы: Қызылша, АКДС, БЦЖ
- Жанұлық анамнезінде бронх демікпесі

Иә

Жок

4 күн

Жиі пароксизмальды жөтел, азпродуктивті

Теріске шығарады

Теріске шығарады

Теріс

Күнтізбе бойынша егілген

Жок

2. Физикалық зерттеу

Жалпы қарau

- Орталық цианоз
- Сырылды тыныс алу, мұрын қанаттарның керілуі, астмоидты тыныс, стридор
- Бас ию қозғалысы (тыныс алғанда бастың бирге қозғалуы тыныс алу жеткіліксіздігі)
- Мойын вена қысымы жоғарылауы
- Алақанның айқын бозаруы

Жок

Мұрын қанаттарның
керілуі

Жок

Жок

Жок

Кеуде торы

- ТЖ
- Тыныс алғанда төменгі кеуде қуысының тартылуы
- Жүрек тұрткісінің жылжуы/ трахеяның орта сзықтан жылжуы
- Өкпе аускультация – ылғалды сырыл н/е қатаң тыныс
- Жүрек аускультациясы-галоп ритмі
- Перкуссия-плевральды қуыс **тартылу** син(тұйық дыбыс) н/е пневмоторакс(кораптық н/е тимпаникалық дыбыс)

Іш қуысы

- Пальпация- жаңа түзіліс н/е л/т-нің үлкеюі
- Бауыр және көкбауыр үлкеюі

Қосымша тексеру

- Кеуде қуысының рентгенографиясы
- Пульсоксиметрия

32 рет / мин

Жоқ

Жоқ

Катаң тыныс, күргәк сырылдар

Жоқ

Жоқ, ауру сез/сіз

Үлкеймеген

Бронхитке тән белгілер

Жасалынбады

Дифференциалды диагноз

Диагноз	Симптомдар
1. Жалған вирусный круп	<ul style="list-style-type: none">- үрмелі жөтел;- бәсендеген дауыс;- тыныс жеткіліксіздігі;- Егер қызылшамен асқыған болса, қызылша симптомдары
2. Жұтқыншақартқы абсцесс	<ul style="list-style-type: none">- жұмсақ тіндер ісінуі;- жұтынудың қиындауы;- қызба;- бірнеше күннің ішінде біртіндеп жағдай нашарлайды
3. Дифтерия (шынайы круп)	<ul style="list-style-type: none">- мойын лимфа түйіндерінің ұлғаюы және ісінуі салдарынан бұқа мойын симптомы;- аңқа гиперемиясы;- жұтқыншақтың сілемейіндегі сұр жабындылар (пленкалар);- мұрыннан қан аралас шығындылар;- АКДС вакцинациясы жүргізілмеген.
4. Бөгде дене аспирациясы	<ul style="list-style-type: none">- тыныс жолдарының механикалық обструкциясы кенеттен дамиды (баланың «шашалуы»), стридор және ауыр тыныс жеткіліксіздігі дамиды;- тыныс жеткіліксіздігі;- жайылған әлсіздеген тыныс және ысқырмалы сырыйлда
5. Туабіткен аномалия	<ul style="list-style-type: none">- стридор туылғаннан бастап болады

Диагноз**Симптомы**

Пневмония	<ul style="list-style-type: none">— Кашель и учащенное дыхание— Втяжение нижней части грудной клетки— Лихорадка— Влажные хрипы при аускультации— Раздувание крыльев носа— Кряхтящее дыхание— Кивательные движения
Маллярия	<ul style="list-style-type: none">— Учащенное дыхание у лихорадящего ребенка— Обнаружение возбудителей малярии в мазке крови— Проживание на территории, неблагополучной по малярии, или ее посещение— При тяжелой малярии: глубокое (ацидотическое) дыхание/втяжение нижней части грудной клетки— Отсутствие патологических признаков при аускультации легких
Тяжелая анемия	<ul style="list-style-type: none">— Выраженная бледность ладоней— Гемоглобин <60 г/л
Сердечная недостаточность	<ul style="list-style-type: none">— Повышение давления в яремной вене— Смещение верхушечного толчка влево— Ритм галопа— Шумы в сердце— Мелкопузырчатые хрипы в нижних отделах легких— Увеличенная печень при пальпации
Врожденный порок сердца	<ul style="list-style-type: none">— Цианоз— Трудности при кормлении или грудном вскармливании— Увеличенная печень— Шумы в сердце
Туберкулез	<ul style="list-style-type: none">— Хронический кашель (более 30 дней)— Плохое развитие / отставание в весе или потеря веса— Положительная реакция Манту— Контакт с больным туберкулезом в анамнезе— Рентгенологическое исследование грудной клетки может выявить первичный комплекс или миллиарный туберкулез

	<ul style="list-style-type: none"> — Обнаружение микобактерий туберкулеза при исследовании мокроты у детей более старшего возраста
Коклюш	<ul style="list-style-type: none"> — Пароксизмальный кашель, сопровождающийся характерным судорожным вдохом, рвотой, цианозом или апноэ — Хорошее самочувствие между приступами кашля — Отсутствие лихорадки — Отсутствие вакцинации АКДС в анамнезе
Инородное тело	<ul style="list-style-type: none"> — Внезапное развитие механической обструкции дыхательных путей (ребенок «подавился») — Внезапное развитие стридора или дыхательной недостаточности — Очаговые области астмоидного или ослабленного дыхания при аусcultации
Выпот/эмпиема плевры	<ul style="list-style-type: none"> — «Каменная» тупость перкуторного звука — Отсутствие дыхательных шумов
Пневмоторакс	<ul style="list-style-type: none"> — Внезапное начало — Тимпанический звук при перкуссии с одной стороны грудной клетки — Смещение средостения
Пневмоцистная пневмония	<ul style="list-style-type: none"> — 2–6-месячный ребенок с центральным цианозом — Расширение грудной клетки — Учащенное дыхание — Пальцы в виде «барабанных палочек» — Изменения на рентгенограмме при отсутствии аускультативных расстройств — Увеличенные печень, селезенка, лимфоузлы — Положительный ВИЧ-тест у матери или ребенка

Белгілері	Классификациясы	Емі
<p>Орталық цианоз</p> <p>Ауыр тыныс жеткіліксіздігі (кивательное движение)</p> <p>Су іші алмау, дұрыс еме алмау н/е ішкенін құсу</p> <p>Тырысу, тежелген немесе есінің болмауы</p>	Өте ауыр пневмония	<p>1.Госпитализация</p> <p>2.Антибиотикотерапия</p> <p>Ампициллин (50мг/кг в/м әр 6 сағ сайын) +Гентамицин (7,5мг/кг в/м күніне 1 рет) 5 кун</p> <p>Амоксициллин пероральді (25мг/кг күніне 2 рет)+ гентамицин (в/м 1рет) 5 күн</p> <p><i>Басқа вариант: цефтриаксон (80мг/кг б/е н/е т/і күніне 1 рет) 10 күн</i></p> <p>3 Кислородотерапия</p> <p>4.Қосымша күтім (температура көтерілсө, демікпелік тыныс болса, жасына сай сүйықтық көлемін анықтау)</p>
<p>Кеуде қуысының төменгі бөлігіндегі тартылуы</p> <p>Мұрын қанатының үрленуі</p>	Ауыр пневмония	<p>1.Госпитализация</p> <p>2.Антибиотикотерапия</p> <p>Бензилпенициллин (50000 бірлік/кг в/м н/е в/в әр 6 сағ сайын) 3 күн н/е цефалоспориндер (цефтриаксон 80мг/кг б/е н/е т/і күніне 1 рет) →</p> <p>Амоксициллин пероральді (25мг/кг күніне 2 рет) 5 күн</p> <p>3 Кислородотерапия</p> <p>4.Қосымша күтім</p>
<p>•Тыныстың жиілеуі •>2ай – 60/мин< •2-11аілдық - 50/мин< •12аій-5жас - 40/мин<</p> <p>•Аускультация:тыныстың әлсіреуі, ылғалды сырыл</p> <p>•Температура 37,5. жоғ</p>	Ауыр емес Пневмония	<p>Амбулаторно емдеу</p> <p>АБТ:Амоксициллин пероральді (25мг/кг күніне 2 рет) 3 күн</p> <p>Анасына қайта келетін уақытын түсіндіру: 2күн кейін қабылдауға қайта келу:</p> <p>-егер ентігу басылса, темп. төмендесе, бала жақсы тамақтанғанда бастаса Зқұндік АБТ аяқтайды;</p> <p>-егер ауыр н/е өте ауыр пневмония белгілері пайда болса, бірден госпитализация</p> <p>Тамағын жұмсақту және жетелін жеңілдететін заттарды қолдану(жылы су)</p>

Диагностика:

ОАК от 12.05.17 Лейкоцит: 11.3x10⁹, Эрит-4.48x10¹²,
Нв-126г/л, Тром-480 x10⁹, п/я-4%, с/я-65%, эоз-2%,
СОЭ-14мм/ч

ОАМ on 12.05.17 салмағы-1015, рн-6,0, лей-3-4 к\а

Соскоб на я/г от 12.05.17 -отр

Рентген ОГК от 12.05.17: Бронхитке тән белгілер

Клиникалық диагноз: ЖРВИ. Обструктивті бронхит, орташа ауыр формасы, ТЖ 0 дәрежесі

БАБЖ бойынша: Жөтел немесе сұық тию.

Емі:

БАБЖ
бойын
ша

Баланы амбулаторлы емдеу

Қауіпсіз құралдар арқылы тамақты жұмсаарту және жөтелді жеңілдету. Мыс: жылы тәтті сусын

Дене қызыы ≥ 39 С болғанда, баланың жағдайын нашарлатса, парацетамол беру

Баланың анасына қашан қайта келу керегін түсіндіру
Келесі келуі 5 күннен соң.

Стацио-
нардағы
ем

Режим: Палатный
Стол №16

Жылы сүйкіткіш ішу -800 мл
Цефтриаксон-1,0 x2раз в/м

Амбро-1/2 таб x 3раз

Ингаляция минеральды
сумен 3 рет

Тамағын интерферон
майымен сұрту күніне 3рет.