

# Когда следует проводить эрадикацию *Helicobacter pylori*?<sup>1</sup>

Терапия язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки

Перед длительным назначением ИПП

Перед длительным применением НПВП

При синдроме диспепсии

Онкозаболевания ЖКТ в анамнезе у родственников


По желанию пациента



В 1994г Международное агентство по изучению рака включило *H.pylori* в список канцерогенов I группы<sup>9,10</sup>  
84% распространенность *H.pylori* среди взрослого населения РФ<sup>2</sup>


## Почему проведение эрадикации *H.pylori* перед длительным применением ИПП

Феномен «экспансии» *H.pylori*<sup>3</sup>



\*Омепразол 40мл x 7дней

Атрофические изменения СОЖ прогрессируют на фоне терапии ИПП без предварительной эрадикации<sup>4</sup>



Даже кратковременное лечение ИПП может вызвать транслокацию *H.pylori* с преимущественным поражением тела желудка, что ускоряет потерю специализированных желез и ведет к атрофическому гастриту, сохраняющемуся более двух лет после отмены препарата<sup>5</sup>

**Эти изменения могут сохраняться более**

**2 лет**

**Написана фраза**

**ПИЛОБАКТ® АМ**

Простое решение сложной проблемы

