

Клинический диагноз

- **Болезнь Иценко - Кушинга, смешанная форма. Аденома гипофиза. Битемпоральная гемианопсия. Опухоль обоих надпочечников. Вторичный гипотиреоз, средней тяжести, декомпенсация. Вторичная аменорея. Диффузный остеопороз. Дислипидемия. Сахарный диабет 2 типа, средней тяжести, декомпенсация. Артериальная гипертония 3ст., фактор риска 4. Обменная миокардиодистрофия, ХСН IIА. Дисциркуляторная энцефалопатия смешанного генеза. Вторичный Т-клеточный и В-клеточный иммунодефицит, декомпенсированный инфекционным синдромом.**

Анамнез заболевания

- **Болеет в течение 10 лет**
- **(прибавка веса, боли в мышцах, нарушения менструального цикла, явления гирсутизма)**
- **Диагноз установлен в 2000 г. «Аденома гипофиза. Болезнь Иценко-Кушинга». Проведен курс лучевой терапии на область гипофиза.**
- **2002 г. – рентгенэндоваскулярная деструкция левого надпочечника,**
- **2004 г. - рентгенэндоваскулярная деструкция правого надпочечника**

Объективный статус

- «Кушингоидный» тип ожирения
- Лунообразное лицо (матронизм)
- Климактерический горбик, гирсутизм
- Широкие багровые стрии, мраморность кожи, акне
- Мышечная дистрофия

Лабораторные данные

	результат	норма	дата
АКТГ	54,7 пг/мл	0-46 пг/мл	31.01.08
Кортизол	1776 нмоль/л	140-680 нмоль/л	11.06.07
Кортизол	420 нмоль/л	140-680 нмоль/л	30.01.08
ТТГ	0.14 мМЕ/л	0,5-6.0 мМЕ/л	31.01.08
Free T4	6.53 пмоль/л	10.0-35.0 пмоль/л	31.01.08
аТПО	0,84 МЕ/мл	<30 МЕ/мл	31.01.08
ЛГ	3,39 мМЕ/мл		31.01.08
ФСГ	2,47 мМЕ/мл		31.01.08
Тестостерон	1.93 нмоль/л		31.01.08
Пролактин	445,6 мМЕ/л		31.01.08
Эстрадиол	0,20 нмоль/л		31.01.08

Иммунограмма

	результат	Норма	дата
IgA	2.6	1,0-4,5	02.01.08
IgE	890	20-100	02.01.08
IgM	1.3	0,5-2,5	02.01.08
IgG	14.5	8-18	02.01.08

Инструментальное обследование

МРТ головного мозга 16.08.07

Заключение: МРТ-картина характерна для энцефалопатии Смешанного генеза. Более вероятно микроаденома гипофиза.

МРТ надпочечников 17.08.07

Заключение: МРТ-образование обеих надпочечников.

Правый надпочечник: 2,0x1,5 см

Левый надпочечник: 1,67x1,32 см













Лечение

1. Бромокриптин 2.5 мг, по 1 таб х на ночь
2. Кетоконазол 200 мг, по 1 таб х 1 раз в день
3. НовоНорм 1 мг, по 1 таб х 3 раза в день, перед приемом пищи
4. Глюкофаж 1000 мг, по 1 таб х 1 раз в день, вечером перед сном
5. Моноприл 10 мг, по 1 таб х 2 раза в день
6. Верошпирон 100 мг, по 1 капсуле утром натощак
7. Таллитон 6,25 мг, по 1 таб х 2 раз в день
8. Л-тироксин 75 мг, утром натощак
9. Са-никомед-ДЗ, по 2 таб х 3 раза в день
10. Тиогамма 600 мг, в/в капельно
11. Париет 20 мг, 1 таб на ночь
13. Фраксипарин 0.4 мг, в/м 2 раза в день
14. Симгал 20 мг, 1 таб на ночь
15. Имунофан 1,0 мл в/м
16. Ликопид 10мг 1таб Х 2 раза в день