

Алгоритм инструментальной перевязки «гноной» раны

ПО ТЕМЕ «СИНДРОМ ВОСПАЛЕНИЯ»

Цель:

Научить оценивать:

- состояние раны,
- фазу течения раневого процесса.

Осуществлять туалет раны, производить смену повязки, выбирать необходимые антисептические средства и средства фиксации перевязочного материала.

Оснащение:

Стерильные растворы антисептиков:

Для работы в ране: раствор фурациллина 1:5000; раствор перекиси водорода 3%; раствор натрия хлорида 10% и т.п.

для обработки кожи: раствор йода спиртовой 5%⁴ раствор хлоргексидина биглюконата водно-спиртовой 0,5% или водный 1%; йодоната 1%; АХД – 2000 и т.п.

Справка

АХД 2000 – антисептический препарат для наружного применения. АХД 2000 обладает выраженной бактерицидной, фунгицидной, противовирусной и туберкулоцидной активностью. Препарат предназначен для хирургической антисептики кожи, в течение 30 секунд снижает количество микрофлоры кожи в 100000 раз. Раствор АХД 2000 эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных анаэробных и аэробных бактерий, различных видов грибов и вирусов, в том числе вируса иммунодефицита человека и вируса гепатита В.

Справка

Препарат АХД 2000 предназначен для хирургической и гигиенической антисептики кожных покровов (в том числе кожи рук) в различных областях медицины.

Для антисептической обработки кожного покрова пациента на кожу наносят раствор АХД 2000 и высушивают. Раствор должен оставить на коже минимум 15 секунд, на участках кожи, которые содержат большое количество сальных желез, раствор должен находиться 10 минут.

Оснащение:

Стерильный **перевязочный материал**: шарики, салфетки, турунды.

Стерильный **инструментарий**: пинцеты, зонды пуговичные и желобоватые, ножницы.

Резиновые **дренажи** (полоски перчаточной резины, трубки и т.п.).

Оснащение:

Средства фиксации перевязочного материала:
бинты обычные и сетчатые, лейкопластырь, клеол и
т.п.

Перевязочный **стол**.

Перчатки, фартуки, маски, защитные очки для мед.
персонала.

Емкости с дезрастворами для **дезинфекции**
инструментария.

Последовательность действий:

Объясните пациенту смысл манипуляции.

Уложите пациента на перевязочном столе в положении, удобном для перевязки, подстелив под область раны клеенку.

Быстро и безболезненно (осторожно) **удалите** загрязненную повязку с раны, используя инструментарий.

Последовательность действий:

Края раны обработайте «кожным» антисептиком от периферии к центру спиральными движениями, используя шарики или салфетки.

Раневую полость обработайте антисептиком с помощью шарика или турунды, учитывая фазу течения раневого процесса.

Последовательность действий:

Дренируйте рану.

Наложите повязку на рану, учитывая фазу течения раневого процесса.

Фиксируйте повязку на ране.

Использованный материал соберите в отдельную емкость для утилизации, инструментарий поместите в **дезраствор**.

Объясните пациенту правила наблюдения за повязкой и рекомендуйте оптимальное положение тела для лучшего оттока раневого отделяемого.

Перевязка.

ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАВЫКА ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРОСМОТР
ВИДЕОФИЛЬМА