





Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией по Кузнецкому району



«... Если я не употребляю наркотики и не имею много сексуальных партнёров, то СПИД – не моя проблема»





Пути передачи ВИЧ-

Половым путём при любых видах незащищённых сексуальных контактов

Через кровь:
При совместном приготовлении и употреблении инфицированных наркотиков;
При нанесении татуировок, проведении пирсинга нестерильным инстументарием

От инфицированной матери к ребёнку во время беременности, родов и ли кормлении грудью

Какими путями ВИЧ не передаётся?

- Через мокроту при кашле, слюну, слёзы, пот и мочу
- Через укусы насекомых
- При рукопожатиях, поцелуях, объятьях
- •При пользовании общим туалетом, ванной, бассейном

Клиническая

У большинства ВИЧ -инфекция никак не проявляется. У трети людей в первые 3 месяца ВИЧ-инфекция может проявляться гриппоподобными проявлениями, т.е. повышением температуры, чаще субфебрилитет, т.е. не выше 37,5 °С, болями в горле, увеличением лимфоузлов, Головной болью, болью в глазах, в мышцах и суставах, сонливостью, недомоганием, потерей аппетита, похуданием, тошнотой, рвотой, диареей. В редких случаях может развиваться серозный менингит – поражение оболочек головного мозга, что проявляется головной болью, светобоязнью

Диагностика ВИЧ -

В настоящее время существует только один способ диагностики – анализ крови, тест на ВИЧ



Профилактика ВИЧ-

Отказ от рискованного сексуального поведения: использование презервативов, сохранение супружеской верности

Использование одноразовых инструментов для инъекций, пирсинга, маникюра

Для беременных женщин с ВИЧ-инфекцией: как можно более раннее начало лечения, отказ от грудного вскармливания

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом



