



Министерство здравоохранения Свердловской области
Государственное бюджетное профессиональное
Образовательное учреждение
«Свердловский областной медицинский колледж»
Нижнетагильский филиал.



Профилактика ВИЧ и СПИД




Выполнил: Казанцев
Владимир
Студент 301 группы
специальности Лечебное
дело
Преподаватель: Клейнер А.А

Что же такое СПИД?

Синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД) — состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и характеризующееся падением числа CD4- лимфоцитов, множественными оппортунистическими инфекциями, неинфекционными и опухолевыми заболеваниями. СПИД является терминальной стадией ВИЧ-инфекции.


**БОЯТЬСЯ НЕ НУЖНО,
НУЖНО ЗНАТЬ!**




Что же такое ВИЧ?

ВИЧ-инфекция представляет собой заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека, характеризующееся синдромом приобретенного иммунодефицита, способствующего возникновению вторичных инфекций и злокачественных образований в связи с глубоким угнетением защитных свойств организма.






Пути заражения вирусом иммунодефицита человека




- 1) Половой путь;
- 2) Через нестерильные шприцы и иглы, при совместном употреблении наркотиков;
- 3) При использовании колюще-режущих предметов, если они загрязнены кровью человека, у которого есть данный вирус;
- 4) От матери к еще не родившемуся или новорожденному ребенку во время родов или кормления грудью.




Вирус иммунодефицита человека

не передается:




- 1) При дружеских объятиях и поцелуях; рукопожатиях;
- 2) При пользовании столовыми приборами, постельными принадлежностями;
- 3) При пользовании письменными принадлежностями и домашней утварью;
- 4) При пользовании бассейном, душем, общественным туалетом;
- 5) В общественном транспорте;
- 6) Воздушно-капельным путем при общении;

Стадии ВИЧ – инфекции



1 стадия инкубации

Продолжается от трех недель до трех месяцев, клинических проявлений может не быть, антитела к ВИЧ инфекции не выявлены.



2стадия первичных проявлений:

А- Бессимптомная фаза- клинических проявлений нет

Б- Острая ВИЧ инфекция без вторичных заболеваний:

Лихорадка, тошнота, рвота, диарея

В - Острая ВИЧ – инфекция с вторичными заболеваниями: Ангина, пневмония

3 стадия Латентная

Длительность от 2-3 лет, может длиться до 20 лет, в среднем 6-7 лет. Увеличение всех лимфоузлов, кроме паховых в течение 3 месяцев, высыпания.





4 стадия Вторичные заболевания

Приводят к развитию на фоне иммунодефицита инфекционных или онкологических вторичных заболеваний.






5 стадия - терминальная (СПИД)-
характерно: вторичные заболевания
приобретают необратимое течение.


Профилактические мероприятия




- Просвещение в вопросах безопасности половых отношений, лечение заболеваний, передающихся половым путем, пропагандирование культуры половых взаимоотношений;
- Контроль над изготовлением препаратов из донорской крови;
- Ведение беременности ВИЧ-инфицированных женщин, обеспечение их медицинской помощи и предоставление им средств химиопрофилактики;
- Организация психологической и социальной помощи и поддержки ВИЧ-инфицированных граждан, консультирование.



Министерство здравоохранения Свердловской области
Государственное бюджетное профессиональное
Образовательное учреждение
«Свердловский областной медицинский колледж»
Нижнетагильский филиал.



Профилактика ВИЧ и СПИД



Выполнил: Казанцев
Владимир
Студент 301 группы
специальности Лечебное
дело
Преподаватель: Клейнер А.А