



Правила подготовки пациента к ФГДС, Rg, колоноскопии, ирригоскопии, RSS

Подготовила:

Мерецкая Н.Ю

Группа 264-0




Правила подготовки пациента к ФГДС:


- 1. Не есть и не пить перед процедурой
- Необходимо выполнять манипуляцию натощак. Эвакуация пищи из желудка происходит за 8 часов в среднем. Поэтому вечером допускается легкий ужин, после 21.00 кушать не рекомендуется, можно выпить немного воды. Утром (обычно плановое исследование проводят в первую половину дня) категорически запрещается кушать и пить.
- Если проигнорировать данное правило, то врач, вместо слизистой отделов ЖКТ увидит непереваренные частицы съеденной накануне пищи, также излишняя жидкость в желудке мешает полноценному осмотру. Заключение врача будет неточным.

- Кроме того, еда и жидкость, при введении гастроскопа, может спровоцировать рвотные позывы, непереваренные частички или вода могут аспирироваться в дыхательные пути и вызвать нежелательные осложнения (пневмонии, химический ожог лёгкого), особенно если процедура проводится с внутривенным наркозом.
- Если пациент нарушает данное правило, кушает даже небольшое количество пищи менее чем за 8 часов до ФГДС, следует отменить исследование. Его данные будут искажены.
- 2. Если данное обследование проводилось под внутривенной анестезией, не рекомендуется садиться за руль или управлять какими-либо аппаратами, требующими концентрации внимания, в день его проведения.
- Хотя современные средства для внутривенного наркоза обладают кратковременным действием, и выключают сознание пациента на несколько минут, расстройства внимания и концентрации могут наблюдаться еще спустя 10-12 часов. Не следует заниматься важными делами!
- 3. За 4 часа до процедуры отказаться от курения. Компоненты табачного дыма стимулируют повышенную выработку HCL и желудочного сока, раздражают внутреннюю оболочку полых органов, которые будут осматриваться.

Экстренно обследование МОЖЕТ выполняться при:

- подозрении на попадание в отделы инородных предметов
- кровотечения
- язве с прободением
- химических и термических ожогах внутренней оболочки






Перечень лиц, которым противопоказан данный диагностический метод:

- инфаркт миокарда в острой стадии
- свежий инсульт
- декомпенсация хронической недостаточности кровообращения
- острый коронарный синдром
- пароксизмы нарушений ритма
- аортальная аневризма
- острые инфекционные заболевания рта и носоглотки
- кахексия
- крайняя степень ожирения
- острые психозы (при экстренных состояниях возможно проведение при проведении внутривенного наркоза)

Правила подготовки пациента к Rg желудка:

- 1. В течение 2-3 дней перед исследованием - бесшлаковая диета.
- 2. Ужин накануне - не позднее 21.00 часов.
- 3. Исследование производится натощак.
- 4. Вечером и утром за 2 часа до исследования - очистительная клизма





Правила подготовки пациента к КОЛОНОСКОПИИ:

1. Пациенту рекомендуют бесшлаковую диету за 3 - 5 сут до исследования.
2. За 2 сут до исследования пациенту дают масляное слабительное (30 - 50 мл касторового масла).
3. Накануне исследования, если позволяет состояние пациента, отменяют ужин.
4. Накануне вечером с интервалом 1,0-1,5 ч пациенту ставят очистительные клизмы.





5. Утром за 2 ч до исследования пациенту ставят очистительную клизму для полного опорожнения кишечника и вводят газоотводную трубку на 10-15 мин.

6. Историю болезни утром доставляют в эндоскопический кабинет, а после исследования возвращают в отделение.

7. Пациенту в отделении оставляют завтрак (предупреждают об этом раздатчицу).

Примечание. Если во время осмотра была сделана биопсия, то в течение суток ведется наблюдение за самочувствием и состоянием пациента, так как может возникнуть кишечное кровотечение.

КОЛОНОСКОПИЯ






Правила подготовки пациента к ирригоскопии:

1. За 2 - 3 сут до исследований из питания пациента исключают продукты, вызывающие газообразование: черный хлеб, молоко, капусту, бобовые, яблоки, виноград и др.
2. При упорном метеоризме пациенту дают 3 раза в сутки настой ромашки или по 2 - 3 таблетки карболена по назначению врача.
3. Накануне вечером пациенту ставят две очистительные клизмы с интервалом 1 ч.
4. Утром пациенту ставят две очистительные клизмы за 3 и 2 ч до исследования.

5. За 1 ч до исследования паписту ставя г газоотводную трубку на 10 - 15 мин.
6. Историю болезни к началу рабочего дня доставляют в рентгенологический кабинет.
7. Пациента информируют о месторасположении кабинета и времени проведения исследования или провожают в кабинет.
8. Бариевую взвесь вводят сотрудники рентгенологического кабинета.





Правила подготовки пациента к RRS:

1. Специальный режим питания перед процедурой. Из рациона больного полностью исключаются такие продукты: бобовые, свежие овощи и зелень, фрукты, изделия из муки грубого помола и отрубей. Но не следует пропускать завтрак в день обследования. Стоит скушать небольшое количество легкого мясного или рыбного бульона, нежирную молочную кашу, паровую рыбу или творог. Все это поможет снять неприятные ощущения в желудке, которые, возможно, возникнут от волнения.



2. Очистительные клизмы объемом 1,5—2 литра из чистой кипяченой воды без каких-либо примесей и добавок, которые рекомендуются проводить дважды: вечером перед процедурой и за 2 часа до исследования.

3. Прием слабительных препаратов орально.

4. Микроклизмы с интервалом в 40 минут до мероприятия.

5. Непосредственно перед исследованием пациенту рекомендуется опорожнить мочевой пузырь.