

СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ

Выполнила Мишарина Дарья
5 Б класса.

- Белый гриб (боровик)

Он считается одним из наиболее ценных видов грибов.

Шляпка белого гриба – трубчатая, подушковидная, она может достигать 20 см в диаметре.

Ножка толстая, утолщенная внизу, сплошная, с сетчатым рисунком, иногда только в верхней части. Цвет ножки нередко имеет тот же оттенок, что и шляпка гриба, только светлее.


Мякоть плотная, белая, с ореховым вкусом и без особого запаха. На разрезе мякоть окраску не меняет.



- Подберезовик – очень распространенный вид, образует сообщество с различными видами березы.
Ножка цилиндрическая или слегка утолщенная к основанию, сплошная, волокнистая, беловатая, покрытая темными чешуйками (сероватыми, темно-коричневыми или почти черными). Мякоть белая, плотная, на разрезе не меняет цвет или розовеет.



- Подосиновик (осиновик, красноголовик)
Шляпка у подосиновика достигает 20 см, сначала полушаровидная, потом более плоская. Окраска варьирует от красной и красно-коричневой до беловато-коричневой или белой. Трубочки грязно-белые, кремовые или сероватые. Ножка цилиндрическая или расширяющаяся к основанию, покрытая волокнистыми чешуйками. Мякоть на разрезе синеет, позднее чернеет, у некоторых видов она становится красноватого или фиолетового цвета.



○ Рыжик

Съедобные грибы исключительно высокого качества. Некоторые европейские народы отдают ему предпочтение перед белым грибом. Во многих странах рыжик считается деликатесом.

Растут рыжики, в основном, в хвойных лесах, особенно в сосновых и еловых.

Предпочитают освещенные места: поляны, опушки, молодой лес.



- Маслята

Для маслят характерна гладкая, клейкая или слегка слизистая шляпка.

. У него слизистая коричневая, темно-коричневая или шоколадная шляпка. Реже встречаются желто-коричневая или буровато-оливковая шляпка. Хорошо развитое частное покрывало, трубочки желтые. Ножка у этого масленка цилиндрическая, короткая, с пленчатым кольцом. Плодоносит он в июле — сентябре, часто большими группами.



Спасибо за внимание.