



***Редкие и исчезающие
виды животных нашего
края***

Воликова Татьяна

Автор заглавного фото – Воликова Татьяна



Медянка

Медянка – неядовитая массивная и сильная змея. Своё название получила из-за рыжеватой окраски. Попадается в лесах на открытых опушках и полянах. Медянки ведут дневной образ жизни, а ночью скрываются. Медянка очень сильная и прожорливая. Свою добычу обхватывает кольцами, чаще всего это ящерицы. При опасности она сворачивается в клубок, внутри которого прячет голову. Из такого положения с резким шипением бросается на врага. Взятая на руки медянка яростно кусается и может прокусить кожу до крови.

Корсак



Своим видом корсак схож с лисицей, однако имеет меньшие размеры туловища.

Средняя длина тела животного 50-60 см. Масса тела не превышает 6 кг. Хвост обычно имеет длину – 20-40 см. Морда короткая, к низу заостренная, но с широкими скулами. Ушки расширенные у основания, слегка округлые, на кончиках заостренные.

Окрас и густота шерсти варьируется от сезона: летом шубка короткая и окрашена в серые, с некоторыми вкраплениями желтого и красного тона, или песчаные цвета; зимой же мех густой и пушистый, имеет желтовато-серый цвет с небольшой сединой возле хребта.

Хвост к зиме такой же пушистый, как и вся шубка. По цвету мало чем отличается от шерсти на туловище, но кончик окрашен в черный цвет

крапчатый



Оседлый, колониальный зверь. На зиму впадает в спячку. Травоядный и семеноедный суслик, который однако не брезгует крупными насекомыми. Ежегодно в апреле самка рождает от 3 до 8 детей. Беременность длится около 3 недель. Половозрелость наступает на втором году жизни. Местами пребывания служат прежде всего, целинные участки, нетронутые пустоты, пастбища. Вид, снижает численность на всем ареале. В Украине численность вида упала в тысячи раз. На начало XXI века в Украине осталось не более тысячи взрослых особей, рассеянные по нескольким

Сизоворонка



Гнездовая перелетная птица. Прилетает в конце апреля - начале мая. В лесной полосе гнезда устраивает в дуплах, у степной - заселяет норы на склонах обрывов, нередко наряду с щуркой обычной. Гнездится отдельными парами или колониями до 5 пар. Кладка в мае-июне, с 3-6 яиц. Насиживают самка и самец в течение 18-19 дней. Имеет один гнездовой цикл. Птенцы вылетают из гнезда в возрасте 26-28 дней, в июле. Осенний отлет в августе-сентябре. Питается крупными насекомыми и мелкими позвоночными.