

Прощай, дисбактериоз!

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ

Дети 1-3 года

Ахиллан: 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой

Витамикс: 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой

Токсидонт-май: 1/8 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Флорента: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Дети 4-6 лет

Ахиллан: 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой

Витамикс: 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой

Токсидонт-май: 1/6 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Флорента: развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Дети 7-12 лет

Ахиллан: 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Витамикс: 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Токсидонт-май: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день

Флорента: развести 1 десерт. л. в 3 стол. л. воды, 3 раза в день во время еды

Дети с 13 лет

Ахиллан: 1 ч. л. 3 раза в день перед едой

Витамикс: 1 ч. л. 3 раза в день перед едой

Токсидонт-май: 1/2 ч. л. на 100 мл воды, 3 раза в день во время еды

Флорента: развести 1 стол. л. в 1/4 стак. воды, 3 раза в день во время еды



Лечим простуду

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ГРИППА, ОРВИ

Дети до года

Флорента: развести 1:5 в грудном молоке, смеси или 10 мл воды, по 1-2 капли 3 раза в день

Дети 1-3 года

Экорсол: 1/4 ч. л. 3 раза в день после еды

Витамикс: 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой

Токсидонт-май: 1/8 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Флорента: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Дети 4-6 лет

Экорсол: 1 ч.л. 3 раза в день после еды

Витамикс: 1/2 ч.л. 3 раза в день перед едой

Токсидонт-май: 1/8 ч.л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Флорента: развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Дети 7-12 лет

Экорсол: 1-2 ч. л. 3 раза в день после еды

Витамикс: 2/3 ч. л. 3 раза в день перед едой

Токсидонт-май: 1/8 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Флорента: развести 1 десерт. л. в 3 стол. л. воды, 3 раза в день во время еды

НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Флорента крем

Наносить на грудную клетку, воротниковую зону 1 раз в день

Флорента спрей

Орошать слизистые носа, миндалин, задней стенки глотки 2-3 раза в день.



Эплир 1% масляный раствор

Синусит: по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день. Новорожденным рекомендуется оставлять в носовых ходах турунды, пропитанные масляным раствором, процедуру повторить 3-4 раза в день

Отит: подогреть до температуры 37 – 38 градусов, взболтать. В каждый слуховой проход ввести по 1-4 капли.

Здоровые ушки и носик

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОТИТОВ И СИНУСИТОВ

Флорента спрей

Распылять в помещении 2 – 3 раза в день для профилактики распространения инфекции.
Орошать спреем слизистую носа, миндалин, задней стенки глотки 2–3 раза в день

Флорента крем

В подострый и восстановительный период наносить крем на грудную клетку, воротниковую зону

Эплир 1% масляный раствор

Синусит

По 2-3 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в день. Новорожденным рекомендуется оставлять в носовых ходах турунды, пропитанные масляным раствором, процедуру повторить 3-4 раза в день

Отит

Подогреть до температуры 37 – 38 градусов, взболтать. В каждый слуховой проход ввести по 1-4 капли. Повторять 3-4 раза в день при катаральном, 4-6 раз в день при гнойных процессах.



Детство без описторхоза

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИ ОПИСТОРХОЗЕ

Подготовительный этап

Гепатосол

С 1 до 3 лет – 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 4 до 6 лет – 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 7 до 12 лет – 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Ахиλλан

С 1 до 3 лет – 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 4 до 6 лет – 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 7 до 12 лет – 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Этап воздействия на паразита

Экорсол*

С 1 до 3 лет по 1/2 ч. л. 3 раза в день через 40 минут после еды,
С 4 до 6 лет по 2/3 ч. л. 3 раза в день через 40 минут после еды,
С 7 до 9 лет по 1 ч. л. 3 раза в день через 40 минут после еды,
С 10 до 12 лет по 2 ч. л. 3 раза в день через 40 минут после еды,
С 12 лет по 3 ч. л. 3 раза в день через 40 минут после еды

Гепатосол

С 1 до 3 лет – 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 4 до 6 лет – 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 7 до 12 лет – 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Токсидонт-май

С 1 до 6 лет – 1/4 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи
С 7 до 12 лет – 1/2 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

Восстановительный этап

Гепатосол

С 1 до 3 лет – 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 4 до 6 лет – 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 7 до 12 лет – 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Флорента

С 1 года до 3 лет - развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды
С 4 до 6 лет - развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды, 3 раза в день во время еды
С 7 до 12 лет - развести 1 десерт. л. в 3 стол. л. воды, 3 раза в день во время еды
с 13 лет - развести 1 стол. л. в 1/4 стак. воды, 3 раза в день во время еды

*Вместо Экорсола детям с 7 до 12 лет можно давать Популин 1/2 ч. л. 3 раза в день через 40 минут после еды



Ширлайн

*Тюбажи 1 – 2 раза в неделю

Витамикс

С 1 года до 3 лет – 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 4 до 6 лет – 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 7 до 12 лет – 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Зоркие глазки

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Дети 1-3 года

Гепатосол: 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой

Флавигран-очанка: 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой

Флорентина: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды,
3 раза в день во время еды

Дети 4-6 лет

Гепатосол: 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой

Флавигран-очанка: 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой

Флорентина: развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды,
3 раза в день во время еды

Дети 7-12 лет

Гепатосол: 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Флавигран-очанка: 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Флорентина: развести 1 десерт. л. в 3 стол. л. воды, 3 раза в день
во время еды



Мой животик не болит

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРИТОВ И ГАСТРОДУОДЕНИТОВ У ДЕТЕЙ

Дети 1-3 года

Ахиллан: 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой

Токсидонт-май: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Флорента: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Экстракт подорожника: 1/8 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Дети 4-6 лет

Ахиллан: 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой

Токсидонт-май: 1/3 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Флорента: развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Экстракт подорожника: 1/6 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Дети 7-12 лет

Ахиллан: 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Токсидонт-май: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Флорента: развести 1 десерт. л. в 3 стол. л. воды, 3 раза в день во время еды

Экстракт подорожника: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Экстракт подорожника: 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Дети с 13 лет

Ахиллан: 1 ч. л. 3 раза в день перед едой

Токсидонт-май: 1 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

Флорента: развести 1 стол. л. в 1/4 стак. воды, 3 раза в день во время еды

Экстракт подорожника: 1/2 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды



Лето без травм

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

НАРУЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ТРАВМАХ

Раны, порезы, ожоги

Эплир масляный 1% р-р, Эплир гель: при ожогах, отморожениях, травмах, ушибах, растяжениях, трофических язвах, гнойных ранах, панарициях, фурункулах, карбункулах, отитах, стоматитах, герпесе применять местно на пораженную область. Можно использовать смоченные раствором тампоны, салфетки, дренажи и т.д. 1 раз в сутки.

Ушибы и растяжения, переломы

Арктика гель: при ушибах, вывихах и растяжениях небольшое количество геля наносить на кожу в области травмы и втирать легкими массирующими движениями. При переломах - **Эсобел крем**.
Курс — 10–15 процедур.

Применение «Арктики» и «Эсобела» сочетается со всеми видами домашнего физиолечения (аппарат Дюна и др.).

Дерматиты и дерматозы

Солхинол крем

Укусы насекомых

Арктика гель, Флорента крем



Скажи лямблиозу «Нет!»

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИ ЛЯМБЛИОЗЕ

Подготовительный этап

Гепатосол

С 1 до 2 лет – 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 3 до 5 лет – 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 6 до 12 лет – 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Ахиллан

С 1 до 2 лет – 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 3 до 6 лет – 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 7 до 12 лет – 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Этап воздействия на паразита

Танаксол плюс

В 1 год – 1/8 ч. л. 3 раза в день через 20 минут после еды
С 2 до 3 лет – 1/4 ч. л. 3 раза в день через 20 минут после еды
С 4 до 7 лет – 1/3 ч. л. 3 раза в день через 20 минут после еды
С 8 до 12 лет – 2/3 ч. л. 3 раза в день через 20 минут после еды
С 13 лет – 1 ч. л. 3 раза в день через 20 минут после еды

Токсидонт-май

С 1 до 6 лет – 1/4 ч. л. на 100 мл воды между приемами пищи 2 раза в день
С 7 до 12 лет – 1/2 ч. л. на 100 мл воды 2 раза в день между приемами пищи

Восстановительный этап

Гепатосол

С 1 до 3 лет – 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 4 до 6 лет – 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 7 до 12 лет – 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Флорента

С 1 года до 3 лет – развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды
С 4 до 6 лет – развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды, 3 раза в день во время еды
С 7 до 12 лет – развести 1 десерт. л. в 3 стол. л. воды, 3 раза в день во время еды
С 13 лет – развести 1 стол. л. в 1/4 стак. воды, 3 раза в день во время еды

Ширлайн

*Тюбажи 1 – 2 раза в неделю



Витамикс

С 1 года до 3 лет – 1/4 ч. л.
3 раза в день перед едой
С 4 до 6 лет – 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой
С 7 до 12 лет – 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Во время этапа воздействия на паразита исключить сладкое из рациона ребенка.

NB!!! Желательно провести курс для всех членов семьи, проживающих с ребенком!

Готовимся к школе, саду...

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Дети 1-3 лет

Витамикс: 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Флавигран: 1/4 ч.л. 3 раза в день перед едой

Дети 4-6 лет

Витамикс: 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой.

Флорента: развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Флавигран: 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой.

Дети 7-12 лет

Витамикс: 2/3 ч. л. 3 раза в день перед едой.

Флорента: развести 1 десерт. л. в 3 стол. л. воды, 3 раза в день во время еды

Флавигран: 2/3 ч. л. 3 раза в день перед едой.



Без ОРВИ и гриппа

ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА РЕБЕНКА

ПРОФИЛАКТИКА ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Дети 1-3 лет

Гепатосол: 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой

Витамикс: 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Дети 4-6 лет

Гепатосол: 1/3 ч.л. 3 раза в день перед едой

Витамикс: 1/3 ч.л. 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

Дети 7-12 лет

Гепатосол: 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Витамикс: 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1 десерт. л. в 3 стол. л. воды, 3 раза в день во время еды

Дети с 13 лет

Гепатосол: 1 ч. л. 3 раза в день перед едой

Витамикс: 1 ч. л. 3 раза в день перед едой

Флорента: развести 1 стол. л. в 1/4 стак. воды, 3 раза в день во время еды



Нагружать все больше нас стали почему-то...

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ПРИ ПОВЫШЕННЫХ УМСТВЕННЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

Дети 1-3 года

- Витамикс: 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой
- Флорента: развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды
- Флавигран: 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой
- Ширлайн крем: массаж воротниковой зоны и стоп на ночь

Дети 4-6 лет

- Витамикс: 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой
- Флорента: развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды, 3 раза в день во время еды
- Флавигран: 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой
- Ширлайн крем: массаж воротниковой зоны и стоп на ночь

Дети 7-12 лет

- Витамикс: 2/3 ч. л. 3 раза в день перед едой
- Флорента: развести 1 десерт. л. в 3 стол. л. воды, 3 раза в день во время еды
- Флавигран: 2/3 ч. л. 3 раза в день перед едой
- Ширлайн крем: массаж воротниковой зоны и стоп на ночь



Неотложные состояния

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Обморожения, ожоги

Эплир гель, Эплир крем, Флорента крем
При ожогах, отморожениях, травмах, ушибах, растяжениях, трофических язвах, гнойных ранах, панарициях, фурункулах, карбункулах, отитах, стоматитах, герпесе применять местно на пораженную область. Можно использовать смоченные раствором тампоны, салфетки, дренажи и т. д. 1 раз в сутки.

Отравления, интоксикации

Токсидонт-май

с 3 до 6 лет – 1/6 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день во время еды

с 7 до 12 лет – 1/4 ч. л. на 100 мл воды 3 раза в день

с 13 лет – 1/2 ч. л. на 100 мл воды,
3 раза в день во время еды

Гепатосол

с 1 до 3 лет – 1/4 ч. л. 3 раза в день перед едой

с 4 до 6 лет – 1/3 ч. л. 3 раза в день перед едой

с 7 до 12 лет – 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой

Ушибы, растяжения

Арктика гель, Эсобел крем

При ушибах, вывихах и растяжениях небольшое количество геля наносить на кожу в области травмы и втирать легкими массирующими движениями.

Курс — 10–15 процедур.

Применение геля «Арктика» сочетается со всеми видами домашнего физиолечения (аппарат Дюна и др.).

Переохлаждение

Флорента крем

Витамикс

с 1 года до 3 лет – 1/4 ч. л. 3 раза в день до еды

с 4 до 6 лет – 1/2 ч. л. 3 раза в день до еды

с 7 до 12 лет – 2/3 ч. л. 3 раза в день до еды

с 13 лет – 1 ч. л. 3 раза в день до еды

Флорента

с 1 года до 3 лет – развести 1/2 ч. л. в 1 ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

с 4 до 6 лет – развести 1 ч. л. в 2-х ст. л. воды, 3 раза в день во время еды

с 7 до 12 лет – развести 1 десерт. л.

в 3 стол. л. воды, 3 раза в день во время еды

с 13 лет – развести 1 стол. л. в 1/4 стак.

воды, 3 раза в день во время еды

